

**2017 年全国卫生专业技术资格考试护理学(中级)
考前压轴密卷**

外科护理学

模拟试卷(一)

金英杰国家医学考试研究中心 编



答题须知

- 1.考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。
- 2.在开始答题前,请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。
- 3.在开始答题前,请考生检查试卷有无缺损、重印、错印,发现上述情况应立即报告监考员。
- 4.答题卡上的考生信息和答案的所有信息点,必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂,如需要作修改,应用橡皮将原涂黑的地方擦净。
- 5.答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写,考生不得自行填写。
- 6.答题卡将采用计算机阅卷,请考生注意保持答题卡平整、干净。
- 7.考试开始后半小时内,考生不得交卷离开考场。
- 8.考试结束后,请把试卷和答题卡分别翻放在桌上,不得带出考场。
- 9.监考员验收试卷和答题卡后,经监考员允许,考生方可离开考场。
- 10.考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”,其一切后果由本人承担。

模拟试卷(一)

基础知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

- 关于巨幼细胞贫血的实验室检查结果,不妥的是
 - 属大细胞性贫血
 - 白细胞、血小板增生显著
 - 骨髓检查见红系增生活跃,可见各阶段巨幼红细胞
 - 血清维生素 B 低于正常
 - 血清叶酸低于正常值
- 欲衡量小儿营养状况,首先应做下列哪项检查
 - 头围
 - 测体重
 - 身长的测量
 - 上、下部量
 - 坐高
- 我国流行性乙脑的流行季节主要是
 - 春季
 - 春夏季
 - 夏秋季
 - 秋冬季
 - 冬季
- 用农历计算预产期,应如何推算
 - 月份减 3 或加 9,日期加 7
 - 月份减 3 或加 9,日期加 8
 - 月份减 3 或加 9,日期加 10
 - 月份减 3 或加 9,日期加 13
 - 月份减 3 或加 9,日期加 15
- 初乳具有下列特点,但除外
 - 是产后 5~7 天分泌的乳汁
 - 量足
 - 含蛋白质多,脂肪少
 - 富含免疫物质
 - 有生长发育调节因子
- 支气管自哪级开始参与气体交换
 - 支气管
 - 终末细支气管
 - 呼吸性细支气管
 - 肺泡管
 - 肺泡囊
- 中央型肺癌一般是指发生在
 - 主支气管
 - 叶支气管
 - 段支气管
 - 段支气管以下主支气管
 - 段支气管以上主支气管
- 高钾血症的原因不包括
 - 静脉补钾过快
 - 急性肾功能衰竭
 - 输入大量库存血
 - 持续胃肠减压
 - 代谢性酸中毒
- 下列不属于冠心病危险因素的是
 - 高血压
 - 血脂异常
 - 女性绝经期前
 - 40 岁以上
 - 吸烟
- 对胰腺癌有定性诊断意义的是
 - 超声波
 - CT

- C. 癌胚抗原测定
 D. 细胞学检查
 E. X 线造影
11. 慢性胃炎的确诊依据是
 A. 胃液分析
 B. X 线钡餐
 C. 胃镜检查
 D. 腹部 B 超
 E. 腹部 CT
12. 新生儿出生后, 开始喂哺母乳时间是
 A. 15~30 分钟
 B. 3~4 小时
 C. 6~8 小时
 D. 12 小时
 E. 24 小时
13. 下列属于临产标志的是
 A. 见红, 规律宫缩, 胎头下降
 B. 规律宫缩, 破膜, 胎头下降
 C. 见红, 破膜, 宫口扩张
 D. 见红, 破膜, 规律宫缩
 E. 规律宫缩, 胎头下降, 宫口扩张
14. 新生儿胎粪的特点是
 A. 褐色、干厚
 B. 金黄色、糊状
 C. 陶土色、软膏状
 D. 淡黄色水样便
 E. 墨绿色、黏稠状
15. 结肠癌最常见的组织学类型是
 A. 黏液癌
 B. 腺癌
 C. 未分化癌
 D. 黏液腺癌
 E. 类癌
16. 引起再生障碍性贫血最多见的药物是
 A. 阿司匹林
 B. 柔红霉素
 C. 氯霉素
 D. 保泰松
 E. 环磷酰胺
17. 麻疹的主要传播途径是
 A. 血液传播
 B. 呼吸道传播
 C. 消化道传播
 D. 皮肤接触传播
 E. 间接传播
18. 好发于儿童的卵巢肿瘤是
 A. 无性细胞瘤
 B. 内胚窦瘤
 C. 畸胎瘤
 D. 颗粒细胞瘤
 E. 勃勒纳瘤
19. 乳腺淋巴结转移的常见部位是
 A. 锁骨上淋巴结
 B. 锁骨下淋巴结
 C. 患侧腋下淋巴结
 D. 健侧腋下淋巴结
 E. 胸骨旁淋巴结
20. 大便潜血持续阳性多提示
 A. 浅表性胃炎
 B. 萎缩性胃炎
 C. 胃溃疡
 D. 十二指肠壶腹部溃疡
 E. 胃癌
21. 属于特异性感染的是
 A. 金黄色葡萄球菌感染
 B. 大肠埃希菌感染
 C. 铜绿假单胞菌感染
 D. 乙型溶血性链球菌感染
 E. 破伤风芽胞梭菌感染
22. 女性生命中可发育成熟的卵泡数目是
 A. 200 个或以下
 B. 200~300 个
 C. 300~400 个
 D. 400~500 个
 E. 500 个以上
23. 心肺复苏后, 最常见的继发性病理改

变是

- A. 心肌缺氧性损伤
- B. 肺透明膜形成
- C. 脑缺氧性损伤
- D. 急性胃黏膜糜烂
- E. 肾小管上皮细胞大量坏死

24. 诊断外伤性血气胸最简便可靠的依据是

- A. 病人出现呼吸困难及低血容量症状
- B. 胸腔穿刺抽出血液和气体
- C. X线检查患侧大片密度增高阴影
- D. 叩诊患侧为浊音,呼吸音减弱
- E. 胸部超声探查见有液平面

25. 颅内压的正常范围是

- A. 0.4~0.6 kPa (40~60 mmH₂O)
- B. 0.7~2.0 kPa (70~200 mmH₂O)
- C. 2.1~2.8 kPa (210~280 mmH₂O)
- D. 2.8~3.6 kPa (280~360 mmH₂O)
- E. 3.7~4.6 kPa (370~460 mmH₂O)

26. 属于高渗性脱水病理生理特点的是

- A. 失钠>失水
- B. 失水>失钠
- C. 失水=失钾
- D. 失钾<失水
- E. 失钠>失钾

27. 肠梗阻时,肠腔积液主要来自

- A. 经口饮入尚未被吸收的水
- B. 梗阻近端的胃肠分泌物
- C. 肠腔渗出液
- D. 肠壁血管漏出液
- E. 肠壁炎症渗出液

28. 肝癌特异性的血清标志物是

- A. 谷氨酰转肽酶
- B. 甲胎蛋白
- C. 谷丙转氨酶
- D. 乳酸脱氢酶同工酶
- E. α-抗胰蛋白酶

29. 有家族史的卵巢癌患者为

- A. 8%~12%

- B. 15%~20%

- C. 20%~25%

- D. 25%~30%

- E. 35%以上

30. 卵巢良性肿瘤中临床最常见的是

- A. 脂肪瘤
- B. 黏液性囊腺瘤
- C. 纤维瘤
- D. 浆液性囊腺瘤
- E. 成熟畸胎瘤

31. 与胆道蛔虫病发病无关的是

- A. 胃肠道功能紊乱
- B. 恶心、呕吐
- C. 体温升高
- D. 运动
- E. 驱虫不当

32. 主动脉瓣狭窄引起心功能代偿最主要的是

- A. 心脏节律改变
- B. 左心室肥厚
- C. 回心血容量增加
- D. 左心室腔扩大
- E. 右心房扩张

33. 引起左心室后负荷增加的主要因素是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 静脉回流增加
- C. 相对性主动脉瓣狭窄
- D. 外周血管阻力增加
- E. 动脉血容量增加

34. 急性胃炎按病因及病理变化的不同,分为不同类型,其中最常见的是

- A. 溃疡型
- B. 糜烂型
- C. 单纯型
- D. 出血型
- E. 感染型

35. 慢性支气管炎病情加剧的重要因素是

- A.大气污染
 B.粉尘刺激
 C.吸烟
 D.反复感染
 E.过敏
- 36.临床诊断新生儿低血糖标准为:血糖<
- A.1.2 mmol/L
 B.1.67 mmol/L
 C.2.2 mmol/L
 D.3.2 mmol/L
 E.3.67 mmol/L
- 37.引起上呼吸道感染的最常见病原体是
- A.革兰阳性细菌
 B.病毒
 C.肺炎支原体
 D.肺炎衣原体
 E.真菌
- 38.常见引起胃泌素升高的疾病是
- A.十二指肠球部溃疡
 B.单纯型胃炎
 C.胃溃疡
 D.糜烂型胃炎
 E.慢性萎缩性胃体胃炎
- 39.典型心绞痛的诱因中,应该除外
- A.情绪激动
 B.贫血
 C.体力劳动
 D.睡眠
 E.甲亢
- 40.患者被诊断为子痫前期轻度,其 24 小时尿蛋白定量超过
- A.0.15 g
 B.0.3 g
 C.0.4 g
 D.0.5 g
 E.0.7 g
- 41.先天性巨结肠的发病机制主要由于
- A.结肠的平滑肌发育不良
 B.结肠交感神经丛发育不良
 C.扩张结肠部分的平滑肌和弹力纤维发育不良
 D.结肠肠壁的肌间神经节细胞缺失
 E.病变发生在结肠近端
- 42.对判断新生儿缺血缺氧性脑病的预后有一定参考价值的检查是
- A.神经元特异性烯醇化酶
 B.脑电图
 C.头颅 B 超
 D.CT 扫描
 E.核磁共振
- 43.妊娠期 B 超监护不能显示的项目是
- A.胎肺成熟度
 B.胎方位
 C.有无胎心搏动
 D.胎头双顶径
 E.胎盘位置
- 44.可提示功血的发生是由于黄体功能不足的检查为
- A.基础体温呈单相型
 B.基础体温呈双相型,但上升缓慢,高温相 10 天
 C.经前宫颈黏液结晶检查出现羊齿植物叶状结晶
 D.经前血清孕酮值处在卵泡期水平
 E.经前阴道脱落细胞涂片表现为中高度雌激素作用
- 45.关于复方短效口服避孕药避孕机制的说法,错误的是
- A.抑制排卵
 B.通过异物的局部效应发挥作用
 C.改变子宫内膜形态与功能,不适于受精卵着床
 D.改变宫颈黏液性状使黏液量变少、黏度增高,不利精子穿透
 E.受持续的雌、孕激素作用,输卵管的正常分泌和蠕动频率发生改变,从而改变受

精卵正常的运行速度

46.患者,女性,47岁。因子宫内膜癌行全子宫、双附件切除术及盆腔淋巴清扫术,术后48小时拔除尿管后自行排尿,第3天起阴道有尿液流出,同时仍可自行排尿,临床诊断为尿瘘,为明确瘘孔,不需做的辅助检查是

- A.宫腔镜检查
- B.靛胭脂试验
- C.输尿管镜检查
- D.排泄性尿路造影
- E.肾显像

47.吸气性呼吸困难严重者可出现三凹征,三凹征是指

A.胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙在吸气时明显下陷

B.胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙在呼气时明显下陷

C.胸骨上窝、锁骨下窝和肋间隙在吸气时明显下陷

D.胸骨下窝、锁骨上窝和肋间隙在吸气时明显下陷

E.胸骨上窝、锁骨下窝和肋间隙在呼气时明显下陷

48.形成慢性阻塞性肺气肿最常见的病因是

- A.慢性支气管炎
- B.支气管哮喘
- C.支气管扩张
- D.肺结核
- E.肺间质纤维化

49.抗结核化学药物治疗的治疗原则是

- A.早期、联合、足量、规律、全程
- B.早期、联合、足量、规律、长期
- C.早期、联合、适量、规律、全程
- D.早期、联合、适量、规律
- E.早期、联合、适量、全程

50.诊断呼吸衰竭的正确依据是

- A.发绀,呼吸困难

B.肺通气功能明显减退

C.呼吸的节律、频率和幅度发生改变

D.结膜充血、水肿和精神、神经症状

E. $\text{PaCO}_2 > 6.6 \text{ kPa}$ (50 mmHg)、 $\text{PaO}_2 <$

8.0 kPa(60 mmHg)

51.干性支气管扩张的唯一症状是

- A.慢性咳嗽
- B.大量脓痰
- C.咯血
- D.咳痰与体位变化有关
- E.呼吸困难

52.可以导致心脏压力负荷加重的疾病是

- A.主动脉瓣关闭不全
- B.室间隔缺损
- C.甲状腺功能亢进
- D.肺动脉高压
- E.慢性贫血

53.室性期前收缩的心电图特征不包括

- A.提前出现的QRS波群
- B.QRS波群时限超过0.12秒
- C.QRS波宽大畸形
- D.QRS前有P波
- E.代偿间歇完全

54.急性心肌梗死最基本的病因是

- A.体力活动
- B.情绪激动
- C.血压剧升
- D.冠状动脉张力增高
- E.冠状动脉粥样硬化

55.目前最佳的系统性红斑狼疮筛选试验是

- A.狼疮细胞检查
- B.皮肤狼疮带试验
- C.抗核抗体检查
- D.血清补体测定
- E.毛细血管镜检查

56.有机磷农药中毒后,血液中胆碱酯酶活性

- A. 不变
 B. 升至正常人的 70% 以上
 C. 降至正常人的 70% 以下
 D. 升至正常人的 90% 以上
 E. 降至正常人的 90% 以下
57. 患者, 男性, 被汽车撞伤右胸部, 呼吸 20 次/分, 胸部 X 线检查示: 右侧气胸, 肺受压 20%, 处理原则是
- A. 胸穿排气
 B. 观察病情
 C. 胸腔闭式引流
 D. 牵引固定
 E. 手术治疗
58. 诊断膀胱肿瘤最重要、不可或缺的方法是
- A. 膀胱镜检查
 B. 膀胱造影
 C. 双合诊检查
 D. 尿脱落细胞检查
 E. 尿道超声检查
59. 骨巨细胞瘤属于
- A. 骨瘤样病损
 B. 良性肿瘤
 C. 继发性肿瘤
 D. 恶性肿瘤
 E. 潜在恶性肿瘤
60. 擦伤的特点是
- A. 皮下淤血、肿胀
 B. 皮肤水肿
 C. 表皮破损
 D. 皮肤呈多数小裂口及浆液渗出
 E. 创缘较平整, 出血可渗可涌
61. 供移植器官的保存原则是
- A. 常温保存
 B. 低温原则
 C. 延长热缺血时间
 D. 变冷缺血为热缺血
 E. 中断血流后不应立即降温
62. 乳腺癌最常见的病理类型是
- A. 非浸润性癌
 B. 早期浸润性癌
 C. 浸润性特殊癌
 D. 浸润性非特殊癌
 E. 其他罕见癌
63. 腺病毒肺炎的发病年龄多见于
- A. 新生儿
 B. 2~6 个月婴儿
 C. 6~12 个月婴儿
 D. 6~24 个月婴儿
 E. 任何年龄
64. 猩红热治疗首选抗生素是
- A. 红霉素
 B. 青霉素
 C. 新霉素
 D. 庆大霉素
 E. 四环素
65. 符合正常卵巢临床特征的是
- A. 成年女性卵巢约 4 cm × 3 cm × 1 cm 大小
 B. 卵巢由骨盆漏斗韧带与子宫相连
 C. 卵巢髓质内有数以万计的原始卵泡
 D. 位于阔韧带内
 E. 卵巢白膜是一层立方上皮
66. 胎儿纵轴与母体纵轴的关系称为
- A. 胎姿势
 B. 胎儿位置
 C. 胎产式
 D. 胎先露
 E. 胎方位
67. 软产道裂伤多见于
- A. 阴道手术操作不当
 B. 胎盘植入
 C. 凝血功能障碍
 D. 软产道充分扩张
 E. 产程延长
68. 可以早期鉴别葡萄胎和侵蚀性葡萄胎的检查是
- A. 胸部 X 线摄片

- B.刮宫葡萄胎标本
C.B超及彩色多普勒
D.子宫输卵管造影术或宫腔镜
E.血清 β -hCG检测
- 69.引起支气管扩张的最常见病因是
A.支气管先天性发育缺陷
B.支气管外部纤维的牵拉
C.支气管-肺组织感染和阻塞
D.遗传因素
E.机体免疫功能失调
- 70.不属于非特异性感染病原体的是
A.大肠杆菌
B.结核杆菌
C.金黄色葡萄球菌
D.乙型溶血性链球菌
E.铜绿假单胞菌
- 71.患者,男性,77岁。高血压数年,近月来睡眠不佳,排尿困难,体重下降,且有腹部不适感,左侧腹股沟区出现肿块并逐渐增大,可进入阴囊,考虑该患者可能是腹股沟疝,与发病有关的因素是
A.高血压数年
B.睡眠不佳
C.排尿困难
D.腹部不适
E.体重下降
- 72.肾病综合征最根本的病理生理特点是
A.水肿
B.蛋白尿
C.低蛋白血症
D.血清胆固醇增高
E.低密度脂蛋白增高
- 73.膀胱炎的特征性表现不包括
A.尿频
B.尿急
C.尿痛
D.排尿困难
E.晨尿有氨臭味
- 74.患者,女性,55岁。行ECG检查示:P波消失,代之是400次/分左右的f波,QRS波形态正常,QRS波群间隔绝对不规则,心室率通常在每分钟110次,从心电图可诊断
A.房扑
B.室扑
C.房颤
D.室上速
E.室速
- 75.患者,男性,56岁。半年前因原发性肝癌行右半肝切除术,手术后建议其门诊定期随访。最能早期预测癌肿复发的检查是
A.ALT
B.GGT
C.B型超声检查
D.选择性肝动脉造影
E.动态监测AFP的变化
- 76.我国引起慢性肾衰竭的最常见疾病是
A.慢性肾盂肾炎
B.慢性肾小球肾炎
C.狼疮性肾炎
D.高血压肾病
E.糖尿病肾病
- 77.诊断贫血时血红蛋白含量正确的是
A.男性 <160 g/L,女性 <150 g/L
B.男性 <150 g/L,女性 <140 g/L
C.男性 <140 g/L,女性 <130 g/L
D.男性 <130 g/L,女性 <120 g/L
E.男性 <120 g/L,女性 <110 g/L
- 78.确诊CO中毒最主要的依据是
A.CO接触史
B.口唇颜色
C.血液中碳氧血红蛋白含量
D.昏迷的深度
E.缺氧的程度
- 79.对休克的认识正确的是
A.休克就是动脉血压下降的情况
B.休克就是心排出量减少的情况

C. 休克就是各种原因引起的组织灌注不足和细胞缺氧的结果

D. 休克就是心力衰竭

E. 休克是遭受打击后意识丧失

80. 应用复苏药物的目的不包括

A. 防治感染

B. 防治心律失常

C. 纠正急性酸中毒

D. 补充血容量和电解质

E. 防治脑水肿

81. 判断甲状腺功能亢进患者病情程度的主要指标是

A. 食欲亢进程度

B. 脉率增快和脉压增大的程度

C. 突眼程度

D. 甲状腺肿大程度

E. 体重减轻程度

82. 腹膜刺激征是指

A. 压痛、反跳痛、肌紧张

B. 肠鸣音亢进、压痛、反跳痛

C. 肠鸣音消失、腹痛、腹泻

D. 板状腹、压痛、腹泻

E. 反射性呕吐、恶心、腹泻

83. X 线检查可见气液平面及胀气肠袢的时间在肠梗阻发生后

A. 1~2 小时

B. 2~4 小时

C. 4~6 小时

D. 6~8 小时

E. 8~10 小时

84. 不符合肺炎克雷伯杆菌肺炎临床特点的是

A. 白红细胞正常或增加

B. 咳嗽, 咳红棕色胶冻状痰

C. 青壮年多见, 预后良好

D. 起病急、胸痛、畏寒

E. 对庆大霉素及第三代头孢菌素敏感

85. 患者, 男性, 54 岁。于晚餐后突发上腹持续性剧痛。考虑急性胰腺炎, 其血清淀粉酶升高的规律是

A. 发病后 2 小时开始升高, 12 小时达高峰

B. 发病后 1~2 小时开始升高, 24 小时达高峰

C. 发病后 24 小时开始升高, 48 小时达高峰

D. 发病后 12 小时开始升高, 72 小时达高峰

E. 发病后 48 小时开始升高, 72 小时达高峰

二、以下提供若干组考题, 每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(86~87 题共用备选答案)

A. 脐部

B. 呼吸道

C. 消化道

D. 皮肤

E. 胎盘

86. 新生儿感染性肺炎出生前的常见感染途径是

87. 新生儿感染性肺炎出生后的常见感染途径是

(88~90 题共用备选答案)

A. 游离移植

B. 带蒂移植

C. 吻合移植

D. 输注移植

E. 联合移植

88. 游离皮片移植属于

89. 肾移植属于

90. 骨髓移植属于

(91~92 题共用备选答案)

- A.尿培养
B.痰培养
C.血培养
D.粪便培养
E.骨髓培养
- 91.确诊伤寒最常用的方法是
92.细菌性痢疾的确诊依据是
(93~95 题共用备选答案)
- A.窦前
B.窦后
C.窦内
D.肝前
E.肝后
- 93.肝炎后肝硬化所致门静脉高压症的主要阻塞部位在
94.血吸虫肝硬化所致门静脉高压症的主要阻塞部位在
95.肝静脉阻塞综合征所致门静脉高压症的主要阻塞部位在
(96~97 题共用备选答案)
- A.血红蛋白 30~60 g/L
B.血红蛋白<120 g/L
C.血红蛋白<110 g/L
D.血红蛋白 90~120 g/L
E.血红蛋白 145 g/L
- 96.6 个月至 6 岁小儿贫血的诊断标准是
97.6~14 岁小儿贫血的诊断标准是
(98~100 题共用备选答案)
- A.圆韧带
B.主韧带
C.阔韧带
D.宫骶韧带
E.骨盆漏斗韧带
- 98.固定子宫颈于正常位置的韧带是
99.间接保持子宫呈前倾位置的韧带是
100.维持子宫在盆腔正中央的韧带是



相关专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 不属于艾滋病传播途径的是
 - A. 同性性接触
 - B. 异性性接触
 - C. 同桌进餐
 - D. 输血
 - E. 分娩
2. 移位菌群失调的原因不包括
 - A. 使用抗菌药物不恰当
 - B. 外科手术
 - C. 插管或介入治疗
 - D. 免疫功能降低
 - E. 细菌结构变化
3. 治疗鹅口疮错误的是
 - A. 2% 碳酸氢钠液擦洗口腔
 - B. 积极治疗原发病
 - C. 局部涂甲紫
 - D. 加大抗生素剂量
 - E. 局部应用抗真菌药物
4. 无菌物品的保存方法不当的是
 - A. 储物架及运送车要保持干净
 - B. 无菌物品应有合格标志,并标明灭菌日期
 - C. 快速压力蒸汽灭菌物品不论是否潮湿,均可保存 7~14 天
 - D. 储藏房间要保持湿式清扫,避免扬尘
 - E. 无菌物品应与未无菌物品分开存放
5. 下列沟通障碍的原因中不属于发送者障碍的有
 - A. 目的不明,导致信息内容的不确定性
 - B. 表达模糊,导致信息传递错误
 - C. 选择失误,导致信息误解的可能性增大
 - D. 言行不当,导致信息理解错误
 - E. 过度加工,导致信息的模糊或失真
6. 传染病区设置隔离室的主要目的是
 - A. 为病人提供良好的休息环境
 - B. 便于对病人进行监护
 - C. 将感染源与传播的途径分开
 - D. 将感染源与易感宿主从空间上分开
 - E. 方便家属探视
7. 医院感染暴发中流行病学处理的基本步骤,前三步是
 - A. 证实流行或暴发→查找感染源→查找引起感染的因素
 - B. 证实流行或暴发→组织落实有效的控制措施→写出调查报告
 - C. 查找感染源→证实流行或暴发→查找引起感染的因素
 - D. 查找引起感染的因素→证实流行或暴发→查找感染源
 - E. 查找感染源→查找引起感染的因素→证实流行或暴发
8. 口腔科的牙钻属于
 - A. 高度危险性物品
 - B. 中度危险性物品
 - C. 低度危险性物品
 - D. 高度水平消毒物品
 - E. 中度水平消毒物品
9. 当为某冠心病病人进行健康教育时,病人向你表达了他认为吸烟对他的健康不会产生影响,所以即使在患病期间,他仍然不想戒烟,病人的这种行为受到了哪类因素的影响
 - A. 倾向因素
 - B. 促成因素
 - C. 强化因素
 - D. 环境因素
 - E. 学习因素
10. 资源评估属于
 - A. 管理与政策诊断

- B.组织诊断
C.环境诊断
D.社会诊断
E.行为诊断
- 11.下列化学消毒剂中,可用于空气消毒的是
- A.2%戊二醛
B.75%乙醇
C.2%过氧乙酸
D.3%过氧化氢
E.0.5%氯己定
- 12.不耐热、不耐湿的物品消毒宜选用
- A.环氧乙烷气体熏蒸
B.紫外线照射法
C.高压蒸汽法
D.消毒液浸泡法
E.电离辐射法
- 13.关于控制的叙述,错误的是
- A.监视各项活动以保证它们按计划进行并纠正各种重要偏差的过程
B.控制的重要性包括在执行组织计划中的保障作用和和管理职能中的关键作用
C.控制的类型包括前馈控制、同期控制和反馈控制
D.控制的基本过程包括建立标准、衡量绩效和纠正偏差
E.控制的基本方法包括预算控制、质量控制、进度控制和数据控制
- 14.对病人最后的护理结果的质量评价属于
- A.基础质量管理
B.成效管理
C.环节质量管理
D.过程质量管理
E.终末质量管理
- 15.近中期效果评价是指
- A.形成评价
B.过程评价
C.效应评价
D.结局评价
E.总结评价
- 16.注射后处理针头的方法错误的是
- A.用过的针头采用双手“复帽”
B.不将针尖指向身体任何部位
C.使用后不用手去除针头
D.将针头放入防水耐刺穿的容器内
E.用过的针头不再重复使用
- 17.属于原位菌群二度失调的是
- A.正常菌群在原有部位发生了数量的暂时性变化
B.正常菌群在原有部位发生了种类结构的暂时性变化
C.正常菌群在原有部位比例发生了病理性波动
D.正常菌群转移到另一部位定植或定居
E.可逆性失调
- 18.连续使用的氧气湿化瓶应
- A.每周消毒 2 次,用后终末消毒,干燥保存
B.每日清洁,用后消毒,干燥保存
C.每日消毒,用后终末消毒,干燥保存
D.每周 1 次消毒,用后终末消毒,干燥保存
E.专人专用,用后进行终末消毒
- 19.护理管理的实践性下列哪句不妥
- A.护理工作时间性强,要按时完成护理服务
B.护理工作面广量大,护士常处于劳累状态
C.护理工作要保证 24 小时连续不间断
D.护理工作责任性强,护士常处于紧张状态
E.护士为护理对象提供健康服务就是管理过程
- 20.微生物从外界环境落到人体,并在一定部位不断生长、繁殖后代,这种现象称为
- A.植入
B.转移
C.定植

- D.定居
E.易位
- 21.根据标准预防的概念,下列不被看作具有传染性的物质是
- A.粪便和尿液
B.体液
C.分泌物
D.血液
E.汗液
- 22.科学管理理论的基本出发点为
- A.提高劳动生产率
B.实行科学化管理
C.调动人的积极性
D.体现公平的分配制度
E.建立健全的管理系统
- 23.护理部根据护理专业的发展变化及时调整工作模式,遵循的动态管理原则是
- A.系统原则
B.效益原则
C.弹性原则
D.人本原则
E.价值原则
- 24.感染病人使用后的器械,正确的处理程序是
- A.消毒、去污、清洗、灭菌
B.去污、清洗、消毒、灭菌
C.清洗、去污、消毒、灭菌
D.去污、消毒、清洗、灭菌
E.清洗、灭菌、消毒、去污
- 25.在确定健康教育的计划目标时错误的是
- A.总体目标必须最终得以实现
B.具体目标是由三个“W”和两个“H”组成
C.总体目标是宏观的,较为笼统的
D.总体目标可分解为多个具体目标
E.具体目标是一些具体的量化的指标
- 26.危害健康的行为不包括
- A.高脂高糖低纤维素饮食
B.A型行为
C.不良生活习惯
D.戒烟
E.C型行为
- 27.除下列哪项外,均是采用观察法收集的资料
- A.测量患者的体温
B.听右下肺有无湿啰音
C.触摸皮肤温度、湿度
D.阅读患者的查体记录
E.查看患者尿液的颜色
- 28.可达到高水平消毒法的是
- A.聚维酮碘
B.苯扎溴铵
C.过氧化氢
D.氯己定
E.乙醇
- 29.喹诺酮类抗菌药的主要作用机制是
- A.干扰细菌细胞壁合成
B.损伤细胞膜
C.影响细菌蛋白质的合成
D.抑制细菌核酸的形成
E.抑制固醇类药物的合成
- 30.真菌引起的医院感染中,最常见的致病菌是
- A.毛霉菌
B.隐球菌
C.光滑念珠菌
D.白色念珠菌
E.李斯特菌
- 31.社交距离通常是指
- A.1.2~4 m
B.4 m 以外
C.50~120 cm
D.50 cm 以内
E.100 cm 以内
- 32.基础护理合格率的评价属于
- A.基础质量评价
B.服务质量评价
C.环节质量评价
D.过程质量评价

- E.终末质量评价
- 33.下列属于高度危险物品的是
- A.胃镜
B.体温表
C.便盆
D.导尿管
E.压舌板
- 34.经粪-口途径传播的肝炎病毒有
- A.甲型、丙型肝炎病毒
B.甲型、戊型肝炎病毒
C.乙型、丙型肝炎病毒
D.丙型、戊型肝炎病毒
E.甲型、乙型肝炎病毒
- 35.下列区域物体表面消毒不合格的是
- A.普通手术室,细菌总数 ≤ 5 cfu/cm²,未检出致病菌
B.急诊抢救室,细菌总数 ≤ 10 cfu/cm²,未检出致病菌
C.肝炎病房,细菌总数 ≤ 15 cfu/cm²,未检出致病菌
D.注射室,细菌总数 ≤ 15 cfu/cm²,未检出致病菌
E.新生儿室的工作人员,细菌总数 ≤ 5 cfu/cm²,未检出致病菌
- 36.手术前需预防性使用抗生素的是
- A.经阴道子宫切除术
B.甲状腺手术
C.疝修补术
D.子宫肌瘤切除术
E.扁桃体摘除术
- 37.我国护理管理标准规定一级医院医师与护理人员之比为
- A.1:2
B.1:3
C.1:4
D.1:1
E.2:3
- 38.被公认为“科学管理之父”的管理学家是
- A.卢因
B.泰勒
C.韦伯
D.亚当斯
E.梅奥
- 39.医疗用品污染后的危害程度可分为几类
- A.1类
B.3类
C.5类
D.7类
E.9类
- 40.“爱探究、好攻击、易激惹、喜欢自我表现”属于哪一行为发展阶段的主要表现
- A.被动发展阶段
B.主动发展阶段
C.自主发展阶段
D.巩固发展阶段
E.自我发展阶段
- 41.不属于目标管理局限性的是
- A.目标制定有难度
B.限制管理者能力发挥
C.缺乏灵活性
D.常忽视成本估计
E.缺乏连续性
- 42.随着计算机技术的日益成熟和广泛应用,管理幅度管理层的理论也发生着革命性的变化,不符合目前变化的是
- A.中层管理功能正逐渐由计算机完成
B.组织管理幅度变宽
C.组织管理层级变少
D.组织日益由扁平化走向高耸型
E.信息传递加快
- 43.组织图不能提供的信息是
- A.指挥关系
B.人、财、物的流向
C.管理幅度
D.集中与分散
E.组织规模
- 44.护理人才结构的群体结构不包括
- A.专业结构

- B.能级结构
C.年龄结构
D.知识结构
E.智能结构
- 45.“条条大路通罗马”描述的有效沟通的策略是
- A.避免一味说教
B.使用恰当的沟通方式
C.考虑接受者的观点和立场
D.以行动强化语言
E.充分利用反馈机制
- 46.不属于协调基本要求的是
- A.及时协调与连续协调相结合
B.从根本上解决问题
C.调动当事者的积极性
D.以大多数人的利益为主
E.相互尊重
- 47.病房护士长最有效的监督方法是
- A.听取所有护士的汇报
B.直接观察
C.指派专人监督
D.护士之间相互尊重
E.护士之间相互监督
- 48.质量观的演变过程中,提出“全面顾客满意”概念的阶段是
- A.“符合性质量”阶段
B.“适用性质量”阶段
C.“满意性质量”阶段
D.“卓越性质量”阶段
E.“全面质量满意”阶段
- 49.在护理质量管理中树立“第一次把事情做对”观念的护理质量管理基本原则是
- A.以患者为中心原则
B.预防为主原则
C.工作标准“零缺陷”原则
D.全员参与原则
E.基于事实的决策方法原则
- 50.按教育目的或内容进行分类,不属于健康教育研究领域范畴的是
- A.学校健康教育
B.防治疾病健康教育
C.营养健康教育
D.环境保护健康教育
E.生殖健康教育
- 51.对信息和讯息的界定不正确的是
- A.讯息是一种信息
B.信息泛指人类社会传播的一切内容
C.讯息传播产生传、受双方有意义的交换
D.讯息传播产生传、受双方之间的互动
E.讯息是由信息符号构成的抽象信息
- 52.小组讨论时,一般适宜的小组人数为
- A.2~5人
B.3~6人
C.6~10人
D.10~15人以上
E.15~20人
- 53.患者在门诊诊疗过程中接受的健康教育称为
- A.住院教育
B.病房教育
C.随访教育
D.门诊教育
E.入院教育
- 54.在实施患者健康教育时,首先要进行的是
- A.确定患者教育目标
B.分析患者的需求
C.制订患者教育计划
D.考虑患者教育的形式
E.评价教育需求
- 55.属于医院获得性感染的是
- A.新生儿呕吐
B.新生儿水痘
C.新生儿红斑
D.新生儿黄疸
E.新生儿脐红
- 56.影响人体微生态平衡的因素不包括
- A.免疫系统疾病
B.腰穿

- C.长期服用抗生素
D.慢性咽炎
E.长期静脉输液
- 57.紫外线灯照射强度监测至少应
- A.每月一次
B.每季度一次
C.每半年一次
D.每年一次
E.每一年半一次
- 58.医务人员应立即洗手的条件是
- A.接触患者的分泌物前
B.接触患者的血液前
C.脱去污染手套后
D.接触同一个患者身体的同一部位时
E.接触污染器械前
- 59.甲型肝炎传播途径不包括
- A.粪-口途径
B.密切接触
C.垂直传播
D.粪便污染食物
E.粪便污染水源
- 60.乙型肝炎的传播途径是
- A.通过共同就餐传播
B.通过拥抱传播
C.通过共用牙刷和剃刀
D.通过空气传播
E.通过握手传播
- 61.系统的特性不包括
- A.整体性
B.目的性
C.相关性
D.内部适应性
E.层次性
- 62.护理仪器设备的维护计划是
- A.战略性计划
B.战术性计划
C.综合性计划
D.长期计划
E.短期计划
- 63.目标管理的基本精神是

- A.以自我管理为中心
B.员工参与管理
C.重视成果
D.强调自我评价
E.以共同制定的目标为依据
- 64.沟通障碍中属于接受者障碍的是
- A.目的不明
B.表达模糊
C.选择失误
D.过度加工
E.言行不当
- 65.有效沟通策略中不正确的是
- A.使用正式沟通的方式
B.考虑接受者的观点和立场
C.充分利用反馈机制
D.以行动强化语言
E.避免一味说教
- 66.正确的谈话技巧是
- A.善于掌控下属发言内容
B.善于启发下属聆听,控制情绪
C.善于启发下属讲真情实话
D.善于抓住所有问题
E.善于规避敏感话题
- 67.医疗护理所用材料及药品购买控制,其控制的对象类型是
- A.作业
B.人员
C.信息
D.财务
E.组织绩效
- 68.不属于护理管理控制关键点的是
- A.高危时间
B.高危患者
C.高危护士
D.关键制度
E.所有科室
- 69.获取患者满意程度的最佳方式是
- A.问卷调查
B.电话随访
C.患者投诉

- D.与患者直接沟通
E.第三方调查
- 70.健康促进的三个基本策略是
A.提倡、协调、控制
B.提倡、赋权、协助
C.控制、赋权、协调
D.控制、赋权、倡导
E.倡导、赋权、协调
- 71.不属于健康促进活动领域的是
A.制定促进健康的公共政策
B.描述人群的健康状况
C.发展个人技能
D.加强社区行动
E.调整卫生服务方向
- 72.人的行为的基本构成要素有行为主体、行为客体、行为环境、行为手段和
A.行为动机
B.行为目的
C.行为计划
D.行为过程
E.行为结果
- 73.人类的行为因遗传、环境以及学习经历的不同而千差万别,丰富多彩,表现出较大的
A.目的性
B.可塑性
C.一致性
D.差异性
E.规律性
- 74.危害健康行为的主要特点是危害性、明显和稳定性以及
A.连续性
B.单一性
C.危险性
D.多样性
E.习得性
- 75.健康信息应具有的特点中,针对性是指
A.健康信息的选择、制作、传递必须针对传播者的需求和特点
B.健康信息的选择、制作、传递必须针对传播媒介的特点
C.健康信息的选择、制作、传递必须针对受者的需求和特点
D.健康信息的选择、制作、传递必须针对传播环境的特点
E.健康信息的选择、制作、传递必须针对主管部门的需求和特点
- 76.健康传播中受者在接触信息时普遍存在的心理特点不包括
A.求异
B.求真
C.求短
D.求新
E.求近

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

- (77~78 题共用备选答案)
- A.胃炎
B.痰中培养大肠埃希杆菌
C.阑尾炎
D.新生儿腹泻
E.产后乳腺炎
- 77.通过消毒、灭菌、隔离、无菌技术等措施可有效地预防和控制的是
- 78.通过合理使用抗菌药物和免疫抑制类药物降低感染风险的是
- (79~81 题共用备选答案)
- A.高压蒸汽灭菌
B.干热灭菌
C.滤过除菌
D.紫外线
E.煮沸消毒
- 79.空气的消毒宜采用
- 80.动物免疫血清的除菌宜采用

- 81.手术用金属器械宜采用
(82~83题共用备选答案)
- A.戴清洁手套
B.戴一次性手套
C.戴医用口罩
D.戴口罩
E.穿隔离衣
- 82.医务人员接触血液及污染物品时应
- 83.进行手术等无菌操作时应
(84~86题共用备选答案)
- A.信息源
B.编码
C.传递信息
D.解码
E.反馈
- 84.信息被译成能理解的一系列符号的过程属于沟通步骤中
- 85.包括接受、译码和理解三个环节的沟通步骤是
- 86.信息沟通属于沟通步骤中的
(87~89题共用备选答案)
- A.目标控制
B.进度控制
C.预算控制
D.质量控制
E.技术控制
- 87.将实际情况与预算计划对比检查,及时发现问题、纠正偏差的控制方法是
- 88.对生产和工作的进程在时间上进行控制的方法是
- 89.把执行结果与预期目标及标准进行对照检查,以发现问题,采取纠偏措施的控制
(90~91题共用备选答案)
- A.呼吸机相关性肺炎
B.呼吸衰竭
C.肺癌
D.新生儿腹泻
E.结肠癌
- 90.属于医院感染的是
- 91.不属于医院感染的是
(92~94题共用备选答案)
- A.碘伏消毒液原液局部擦拭2遍
B.碘伏消毒液原液局部擦拭
C.20 000 mg/mL 葡萄糖酸氯己定擦拭
D.有效含量>1 g/L 氯己定乙醇溶液局部擦拭2~3遍
E.3%过氧化氢冲洗
- 92.适用于穿刺部位的皮肤消毒的方法为
- 93.适用于手术切口部位的皮肤清洁方法为
- 94.适用于伤口创面消毒的冲洗方法为
(95~97题共用备选答案)
- A.管理的科学性
B.管理的自然属性
C.管理的广泛性
D.人和时间
E.能源和信息
- 95.管理的基本特征
- 96.护理管理的特点
- 97.管理二重性的体现
(98~100题共用备选答案)
- A.倒放
B.竖放
C.平放
D.斜放
E.侧放
- 98.手术器械包、硬式容器应
- 99.盆、盘、碗类物品应
- 100.纸袋、纸塑包装应

专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 小儿符合中度等渗性脱水的是
 - A. 失水量占体重的 3%,血清钠 135 mmol/L
 - B. 失水量占体重的 6%,血清钠 155 mmol/L
 - C. 失水量占体重的 7%,血清钠 120 mmol/L
 - D. 失水量占体重的 8%,血清钠 140 mmol/L
 - E. 失水量占体重的 11%,血清钠 140 mmol/L
2. 慢性水中毒的临床表现正确的是
 - A. 头痛
 - B. 躁动
 - C. 精神症状
 - D. 昏迷
 - E. 软弱无力
3. 休克患者使用血管扩张药,必须具备的条件是
 - A. 纠正酸中毒
 - B. 心功能正常
 - C. 补足血容量
 - D. 先用血管收缩药
 - E. 与皮质激素同用
4. 胸外除颤时,电极板放置位置正确的是
 - A. 左侧置于第 5 肋间腋前线交点,右侧置于胸骨右缘第 2~3 肋间
 - B. 左侧置于胸骨左缘第 2~3 肋间,右侧置于第 5 肋间腋前线交点
 - C. 左侧置于心尖部,右侧置于第 5 肋间腋中线交点
 - D. 左侧置于第 5 肋间腋中线交点,右侧置于胸骨右缘 2~3 肋间
 - E. 左侧置于胸骨左缘 2~3 肋间,右侧置于第 5 肋间腋中线交点
5. 革兰阴性杆菌导致脓毒症常见的症状不包括
 - A. 低温
 - B. 低白细胞
 - C. 低血压
 - D. 高热
 - E. 休克
6. 急性化脓性腹膜炎早期出现呕吐的原因是
 - A. 麻痹性肠梗阻
 - B. 中枢性呕吐
 - C. 腹膜受刺激引起反射性呕吐
 - D. 胃肠道痉挛
 - E. 膈肌受刺激
7. 胃十二指肠溃疡外科手术的绝对适应证是
 - A. 溃疡病穿孔
 - B. 应激性溃疡
 - C. 溃疡瘢痕性幽门梗阻
 - D. 胃后壁溃疡
 - E. 溃疡病出血
8. 肛裂患者肛门疼痛的特点是
 - A. 疼痛为隐痛
 - B. 排便前出现括约肌挛缩痛
 - C. 排便后出现肛门隐痛可延续到数小时
 - D. 排便时与排便后疼痛之间有间歇期
 - E. 疼痛无规律
9. 当结石阻塞胆管并继发感染时,不属于 Charcot 三联征的是
 - A. 腹痛
 - B. 呃逆
 - C. 寒战
 - D. 高热
 - E. 黄疸
10. 颅脑损伤患者取床头抬高卧位的主要作用是
 - A. 减轻脑水肿
 - B. 防止呕吐物误吸
 - C. 防止颅内压增高
 - D. 防止窒息
 - E. 防止休克

- A.减轻颅内出血
B.防止呕吐误吸
C.减轻头痛
D.减轻脑水肿
E.改善呼吸状态
- 11.患者每次排尿开始时有血尿,而后尿液正常,提示病变位于
- A.肾盂内
B.输尿管壁
C.膀胱底部
D.膀胱颈及三角区
E.前尿道
- 12.易发生外周循环衰竭的是
- A.低渗性脱水
B.等渗性脱水
C.高渗性脱水
D.水中毒
E.水肿
- 13.脑症状出现最早而且突出的水钠代谢紊乱类型是
- A.低渗性脱水
B.等渗性脱水
C.高渗性脱水
D.急性水中毒
E.水肿
- 14.肠外营养置管的并发症不包括
- A.气胸
B.血管损伤
C.导管移位
D.空气栓塞
E.感染
- 15.面部“危险三角区”的疔最危险的并发症是
- A.眼球感染
B.毒血症
C.面部蜂窝织炎
D.海绵状静脉窦炎
E.窒息
- 16.容易引起急性肾衰竭的损伤是
- A.挫伤
B.扭伤
C.挤压伤
D.裂伤
E.刺伤
- 17.胃十二指肠溃疡穿孔的特征表现是
- A.腹痛
B.膈下游离气体
C.肠鸣音增强
D.疼痛向腰背部呈束带放射
E.腹胀明显
- 18.严重肝胆疾病患者术前最需要补充的是
- A.维生素 B
B.维生素 C
C.维生素 K
D.维生素 A
E.维生素 E
- 19.闭合多根多处肋骨骨折,若骨折范围较小,治疗时纠正反常呼吸最合适的方法是
- A.牵引固定法
B.肋骨内固定法
C.压力包扎固定
D.胶布肋骨固定法
E.用呼吸器行辅助呼吸
- 20.恶性骨肿瘤患者的一般护理措施中不包括
- A.给予安慰和心理护理
B.补充足够的营养和水分
C.可采取用三级止痛方案止痛
D.化疗患者密切观察血液变化
E.髋关节外旋位
- 21.骨折患者功能锻炼的一般原则是
- A.早期以患肢肌肉等张收缩运动为主
B.中期以患肢肌肉等长收缩运动为主
C.中期以患肢持重或负重活动为主
D.后期避免抗阻力运动
E.后期以重点关节为主行全面功能锻炼

22.经静脉输入5%葡萄糖溶液可以治疗的水钠代谢紊乱类型是

- A.高渗性脱水
- B.低渗性脱水
- C.等渗性脱水
- D.急性水中毒
- E.慢性水中毒

23.类风湿关节炎关节病变的特点是

- A.大关节
- B.游走性疼痛
- C.关节畸形
- D.对称性改变
- E.关节肿胀

24.外科感染抗菌治疗中错误的是

A.根据原发感染灶的性质,尽早、足量、联合应用抗生素

- B.做细菌培养和药敏试验
- C.所有感染者都应使用广谱抗生素
- D.抗生素的使用应足量、全程
- E.真菌感染应使用抗真菌药物

25.破伤风患者注射大量破伤风抗毒素的目的是

- A.抑制破伤风杆菌的生长
- B.控制和解除痉挛
- C.中和游离的毒素
- D.减少毒素的产生
- E.中和游离与结合的毒素

26.甲亢患者服碘剂准备后的最佳手术时期是

- A.开始服碘剂3天以后
- B.开始服碘剂1周左右
- C.开始服碘剂2~3周
- D.开始服碘剂1~2周
- E.开始服碘剂3~4周

27.消化道穿孔的患者禁食、胃肠减压的目的是

- A.减轻腹胀
- B.减轻腹痛
- C.减轻腹胀和腹痛

D.有利于穿孔闭合

E.避免消化液和食物残渣继续流入腹腔

28.门静脉高压症患者,施行分流术,说法正确的是

A.适用于有明显黄疸的患者
 B.血清白蛋白低于50 g/L时禁忌手术
 C.适用于食管、胃底静脉曲张破裂出血的患者

D.适用于严重腹水患者

E.术后不会再发生胃底、食管静脉曲张

29.一般颅脑损伤后或术后无昏迷者最适宜的体位是

- A.平卧位
- B.头低足高位
- C.俯卧位
- D.斜坡卧位
- E.侧卧位

30.张力性气胸主要的病理生理改变是

- A.纵隔向健侧移位
- B.纵隔扑动
- C.胸壁反常呼吸运动
- D.肺内气体对流
- E.皮下气肿

31.前尿道损伤时的典型表现是

- A.终末血尿
- B.尿道口滴血
- C.全程肉眼血尿
- D.腹膜外血肿
- E.腹膜内血肿

32.患者,男性,45岁。2小时前抬重物时突然出现左下腹剧烈疼痛,伴恶心,停止排气。查体:左下腹股沟处5cm×6cm质韧肿物,活动差,压痛明显,判断其目前最可能的情况是

- A.难复性腹股沟直疝
- B.难复性腹股沟斜疝
- C.嵌顿性腹股沟直疝
- D.嵌顿性腹股沟斜疝

- E.绞窄性腹股沟直痛
- 33.患者,女性,58岁。近日出现无痛性黄疸。考虑诊断为
- A.胆管结石
 - B.急性胰腺炎
 - C.壶腹部癌
 - D.急性胆囊炎
 - E.胆囊结石
- 34.患者,男性,58岁。步行100米后感右小腿疼痛、间歇跛行,休息后症状消失。平日右足发凉、有麻木感。查体:右足背动脉搏动减弱。依据上述症状及体征,初步诊断为
- A.深静脉血栓形成
 - B.血栓闭塞性脉管炎(营养障碍期)
 - C.血栓性静脉炎
 - D.血栓闭塞性脉管炎(局部缺血期)
 - E.下肢动脉粥样硬化
- 35.患者,女性,62岁。风湿病史20年,近日常感乏力、眩晕,心绞痛。入院诊断为主动脉瓣狭窄。该患者的治疗原则叙述正确的是
- A.需尽早施行人工主动脉瓣膜替换术
 - B.皮穿刺气囊导管扩张分离术
 - C.二尖瓣修复成形术
 - D.二尖瓣置换术
 - E.抗心律失常治疗
- 36.患者,男性,20岁。1个月前偶然发现右髋关节内侧深部有一鸡蛋大小硬性肿块,无压痛,不活动,边界清楚,右髋关节活动轻度受限,最可能的诊断是
- A.骨瘤
 - B.骨软骨瘤
 - C.骨巨细胞瘤
 - D.骨肉瘤
 - E.骨内生软骨瘤
- 37.患者,女性,56岁。风湿病史10年,近日常出现乏力、眩晕,偶有心绞痛、劳累后气促的表现。心电图检查示电轴左偏、左心

- 室肥大、劳损、T波倒置,超声,心动图检查示主动脉瓣叶开放振幅减小,瓣叶曲线增宽,舒张期可呈多线。该患者的诊断为
- A.二尖瓣狭窄
 - B.二尖瓣关闭不全
 - C.主动脉瓣狭窄
 - D.主动脉瓣关闭不全
 - E.先天性心脏病
- 38.患者,男性,50岁。今晨车祸,左上腹撞伤伴腹痛1小时。撞伤后呕吐2次,无血液。体检:神志清,血压80/50 mmHg,脉搏120次/分,上腹部有轻度压痛,腹腔穿刺抽出血性液体,考虑可能为
- A.脾破裂
 - B.肝包膜下血肿
 - C.胰腺损伤
 - D.腹腔内空腔器官破裂
 - E.肝损伤
- 39.患者,女性,55岁。无意中发现右侧腋窝淋巴结肿块2个月。查体:双侧乳房、锁骨上及颈部均未发现异常,活检证实为淋巴结转移癌,最可能的组织来源是
- A.甲状腺
 - B.乳腺
 - C.肝
 - D.肺
 - E.脊椎
- 40.患者,男性,25岁。因“急性阑尾炎”收入院,行阑尾切除术,术后患者主诉疼痛,护士对其进行生命体征的评估,评估内容不恰当的是
- A.有无脉搏加快
 - B.有无血压上升
 - C.有无呼吸延长
 - D.有无呼吸短促
 - E.有无出汗
- 41.患者,女性,52岁。乳癌根治术后1周。患者锻炼方法错误的是
- A.握拳

- B. 屈腕
C. 屈肘
D. 上臂外展
E. 上举
42. 患者, 男性, 26 岁。患有高钙血症, 有头痛、肌痛、口渴、多尿的症状。对该患者的治疗正确的是
- A. 积极治疗原发病
B. 静脉滴注生理盐水
C. 可行手术治疗
D. 纠正碱中毒
E. 增加尿钙排泄
43. 患者, 男性, 69 岁。右上腹胀痛进行性加重 5 个月并向腰背部放射, 消瘦、乏力, 伴黄疸 7 天。体检: 肝脏肿大, 触痛, B 超示胆囊缩小。考虑该患者的诊断为
- A. 胆结石
B. 胆囊癌
C. 胆管癌
D. 胆囊息肉
E. 胆囊炎
44. 患者, 男性, 50 岁。右下肢静脉曲张 10 余年, 近日突然右小腿肿胀、疼痛, 尤以踝关节肿胀明显并伴肌肉疼痛。目前比较好的治疗手段是
- A. 大隐静脉剥脱术
B. 卧床、抬高患肢
C. 抗凝治疗
D. 弹力绷带加压治疗
E. 溶栓治疗
45. 患者, 男性, 50 岁。高热、脉速、食欲缺乏、呼吸急促、全身乏力, 既往患有肺炎久治不愈, 胸膜腔穿刺可抽出脓液。正确的诊断是
- A. 血胸
B. 气胸
C. 血气胸
D. 急性脓胸
E. 慢性脓胸
46. 患者, 女性, 55 岁。1 年前诊断为细菌性心内膜炎, 经治疗病愈。近日常感乏力、心悸, 劳累后气促。入院做心电图检查, 出现电轴左偏、二尖瓣型 P 波、左心室肥大和劳损。该患者的诊断为
- A. 二尖瓣狭窄
B. 二尖瓣关闭不全
C. 主动脉瓣狭窄
D. 主动脉瓣关闭不全
E. 先天性心脏病
47. 患者, 男性, 58 岁。因尿路梗阻入院, 诊断为前列腺增生, 经导尿检查测得残余尿量 60 mL, 推荐采取的治疗措施是
- A. 激光治疗
B. 抗雄激素
C. 抗雌激素
D. 手术切除
E. 膀胱造瘘
48. 患者, 男性, 42 岁。骨盆骨折合并后尿道损伤, 术后 3 个月出现排尿困难, 此时应
- A. 少饮水
B. 留置尿管
C. 扩张尿道
D. 膀胱造瘘
E. 应用抗生素
49. 患者, 女性, 44 岁。近日常感乏力、心悸、劳累后气促。入院做心电图检查, 也现电轴左偏、二尖瓣型 P 波、左心室肥大和劳损, 诊断为二尖瓣关闭不全。以下治疗原则中不恰当的是
- A. 予以强心、利尿治疗
B. 纠正水、电解质失衡治疗
C. 抗心律失常治疗
D. 改善全身及心功能状况
E. 二尖瓣关闭不全症状不明显, 予以二尖瓣置换术治疗
50. 患者, 男性, 27 岁。被汽车撞伤头部, 行 CT 示: 脑干出血。患者自入院体温持

续在 39~41℃,化验检查无感染征象,考虑为中枢性高热。分析其原因是

- A. 颅高压
- B. 脑出血
- C. 丘脑下部或脑干受损
- D. 脑炎
- E. 脑水肿

51. 患者,男性,46岁。因车祸左上腹撞伤伴腹痛5小时。撞伤后呕吐2次,为少量胃内容物,无血液。体检:神志清,血压100/80 mmHg,脉搏92次/分,上腹部有压痛、反跳痛及肌紧张,移动性浊音(-),腹腔穿刺(-)。腹部平片示:两侧膈下游离气体。考虑可能为

- A. 脾包膜下血肿
- B. 肝破裂
- C. 胰腺损伤
- D. 腹腔内空腔器官破裂
- E. 肝损伤

52. 患者,女性,27岁。体检发现右侧乳房外上象限有一直径5 cm大小肿块,质硬、界限不清、不光滑,尚可推动;同侧腋窝有2个淋巴结肿大,质硬,能推动。细针穿刺细胞学检查发现有癌细胞,诊断为右侧乳腺癌,行乳腺癌根治术后,预防患侧上肢水肿的主要护理措施是

- A. 抬高患侧上肢
- B. 半卧位
- C. 局部沙袋压迫
- D. 加压包扎伤口
- E. 引流管持续负压吸引

53. 患者,男性,55岁。右腹股沟肿块2个月余,肿块常于咳嗽、用力时出现,平卧休息可消失。查体:回纳后压住疝环,肿物不突出,目前最适当的治疗是

- A. 无需治疗暂观察
- B. 医用绷带压迫并休息
- C. 单纯性囊高位结扎术
- D. 传统疝修补术

E. 无张力疝修补术

54. 患者,男性,60岁。胃溃疡病史3年,1年来上腹痛发作频繁,无规律,体重减轻。该患者最有意义的检查为

- A. 粪便隐血试验
- B. 胃酸测定
- C. 胃镜检查
- D. 腹部B超
- E. 血癌胚抗原测定

55. 患者,女性,30岁。阿米巴痢疾1个月,近1周轻度发热,无寒战、黄疸。B超检查提示肝单个较大液体暗区。被确诊为阿米巴肝脓肿,脓肿位于肝右叶,未合并细菌感染,应选择的治疗方法为

- A. 全身应用抗阿米巴药物,切开引流
- B. 全身应用抗阿米巴药物,穿刺抽吸
- C. 全身应用抗阿米巴药物,肝叶切除
- D. 脓肿内注射抗阿米巴药物,切开引流
- E. 脓肿内注射抗阿米巴药物,穿刺抽吸

56. 患者,男性,66岁。近日出现皮肤黄染,高热,伴腹部疼痛,考虑诊断为

- A. 胆总管下端结石
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性肠梗阻
- D. 阑尾穿孔
- E. 胰腺癌

57. 患者,男性,43岁。4天前发生车祸,撞伤左上腹,当时左上腹有胀痛和局部压痛,暂留院观察。今晨起后突然昏倒,查体见患者面色苍白、出冷汗,血压80/50 mmHg,脉细速,无明显腹膜刺激征。首先考虑的诊断为

- A. 肝破裂
- B. 脾破裂
- C. 胰腺损伤
- D. 左肾破裂
- E. 肝损伤

58. 患者,男性,27岁。车祸致头外伤,鼻腔有血性脑脊液,诊断为颅前窝骨折。指

导脑脊液鼻漏的患者禁忌对鼻腔冲洗、堵塞、滴药的目的是为了预防

- A. 颅内感染
- B. 头痛
- C. 颅内压增高
- D. 颅内压降低
- E. 颅内积气

59. 患者, 男性, 48岁。15年前曾患肺结核, 近3个月来出现刺激性咳嗽, 痰中带血丝, 伴右胸痛、发热, X线片示右上肺3.5 cm×3 cm大小的阴影, 边缘模糊, 周围毛刺。应考虑的诊断是

- A. 肺癌
- B. 肺囊肿
- C. 肺炎
- D. 肺结核
- E. 非良性肿瘤

60. 患者, 男性, 55岁。近半年出现刺激性咳嗽, 痰中带血丝, 伴右胸痛、发热, X线片示有上肺3 cm×3 cm大小的阴影, 边缘模糊, 周围毛刺。病理学检查诊断为小细胞肺癌Ⅲ期, 应考虑的治疗方法为

- A. 手术治疗
- B. 免疫治疗
- C. 生物治疗
- D. 中医治疗
- E. 同步放化疗

61. 患者, 男性, 46岁。风湿病史10年, 近日出现乏力、心悸, 劳累后气促等症状。入院检查发现患者心尖搏动增强并向左下移位、心尖区可听到全收缩期杂音, 向左侧腋中线传导; 肺动脉瓣区第二音亢进, 第一音减弱或消失。该患者的诊断为

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 先天性心脏病

62. 患者, 男性, 20岁。右膝内侧肿块7

年, 生长缓慢, 无明显疼痛。X线片显示股骨下端内侧干骺端杵状肿块, 边缘清楚, 应首先考虑为

- A. 骨肉瘤
- B. 骨巨细胞瘤
- C. 软骨肉瘤
- D. 骨软骨瘤
- E. 骨样骨瘤

(63~66题共用题干)

患者, 女性, 25岁。右足癣并感染1周, 2天前开始出现右小腿有片状红疹, 颜色鲜红, 中间较淡, 边缘清楚, 右腹股沟淋巴结肿大。

63. 该患者可能的诊断是

- A. 疔
- B. 痈
- C. 急性蜂窝织炎
- D. 丹毒
- E. 急性管状淋巴管炎

64. 该病的致病菌最常见的是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 溶血性链球菌
- C. 大肠杆菌
- D. 变形杆菌
- E. 铜绿假单胞菌

65. 该患者首选的抗生素是

- A. 青霉素
- B. 链霉素
- C. 环丙沙星
- D. 甲硝唑
- E. 庆大霉素

66. 为预防复发, 在全身和局部症状消失后仍需继续使用抗生素

- A. 1~2天
- B. 3~5天
- C. 6~9天
- D. 10~12天
- E. 13~15天

(67~68题共用题干)

患者,男性,33岁。既往体健,现颅脑术后7天,呈嗜睡状态,GCS 12分。排出柏油样稀便约300 mL,BP 100/55 mmHg,Hb 105 g/L,大便潜血(+++)。

67.患者目前可能的情况是

- A.消化性胃溃疡出血
- B.消化性十二指肠球部溃疡出血
- C.应激性溃疡出血
- D.食道静脉曲张破裂出血
- E.痔疮出血

68.颅脑手术后患者的常见并发症不包括

- A.呼吸道感染
- B.压疮
- C.颅内出血
- D.腹胀
- E.癫痫

(69~70题共用题干)

患者,男性,65岁。体形较胖,因行脊柱手术卧床2周后,自诉右侧小腿疼痛,体检发现右腿指凹性水肿。

69.根据以上病情,考虑患者最可能的原因是出现了

- A.水中毒
- B.下肢静脉血栓
- C.肌肉退行性病变
- D.关节炎
- E.心力衰竭

70.在护理此患者时,应注意禁止

- A.抬高患肢
- B.患肢制动
- C.理疗
- D.按摩右侧小腿
- E.给予抗凝药

(71~73题共用题干)

患者,男性,29岁。因四肢乏力4小时就诊。急查血生化示:血清钾2.45 mmol/L,双上肢肌力3级,双下肢肌力2级,立即给予心电监护,静脉补钾6g,口服补钾5g。

经过积极治疗,患者肌力恢复4级,复查血清钾4.33 mmol/L。

71.治疗过程中的注意事项错误的是

- A.见尿补钾
- B.首选静脉补钾
- C.钾浓度不宜过高
- D.补钾速度不宜过快
- E.补钾总量不宜过大

72.补钾的速度应

- A.≤60滴/分
- B.≤50滴/分
- C.≤40滴/分
- D.≥60滴/分
- E.≥50滴/分

73.补钾措施不当,容易导致的最严重并发症是

- A.心律失常
- B.呼吸肌麻痹
- C.心室纤维颤动
- D.麻痹性肠梗阻
- E.肌无力

(74~76题共用题干)

患者,男性,28岁。8年来站立或腹压增高时反复出现右腹股沟肿物,平卧安静时肿块明显缩小或消失。10小时前因提重物肿块又出现,伴腹痛、呕吐,肛门停止排气和排便。体检示右阴囊红肿,可见一梨状肿块,平卧后肿块不消失。

74.最有可能的诊断是

- A.嵌顿性腹股沟斜疝
- B.嵌顿性腹股沟直疝
- C.绞窄性股疝
- D.睾丸鞘膜积液
- E.睾丸扭转

75.本例患者最有效的治疗措施是

- A.试行手法复位
- B.应用止痛剂
- C.静脉补液纠正酸碱失衡
- D.紧急手术

E.热敷、抗生素治疗

76.腹外疝术后,对患者正确的要求是

- A.24 小时后可床边活动
 - B.2 天后可户外散步
 - C.半个月后可恢复轻体力工作
 - D.不从事体力劳动
 - E.3 个月内不宜从事重体力活动
- (77~79 题共用题干)

某肺心病患者,因肺部感染入院,血气分析结果:pH 7.33, PaCO₂ 9.3 kPa(70 mmHg), HCO₃⁻ 36 mmol/L

77.该患者患有的酸碱失衡类型是

- A.代谢性酸中毒
- B.代谢性碱中毒
- C.急性呼吸性酸中毒
- D.慢性呼吸性酸中毒
- E.慢性呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒

78.对该疾病主要的治疗方式描述不正确的是

- A.积极治疗肺部感染
- B.吸入含 5%CO₂的 O₂
- C.保持呼吸道通畅
- D.使用呼吸机辅助呼吸
- E.鼓励患者深呼吸

79.由于治疗不当而使疾病加重时,可应用

- A.氨基丁三醇
- B.氨基丁二醇
- C.羟基丁三醇
- D.羟基丁二醇
- E.羧基丁醇

(80~82 题共用题干)

患者,男性,35 岁。饱餐后突然发生上腹剧痛,蔓延至全腹 8 小时,腹痛呈持续性。体检:全腹压痛、反跳痛,肝浊音界缩小,移动性浊音阳性,肠鸣音消失。

80.此患者最可能的诊断为

- A.急性胆囊穿孔致急性腹膜炎
- B.肠坏死伴急性腹膜炎
- C.急性阑尾穿孔伴急性腹膜炎
- D.消化性溃疡穿孔伴急性腹膜炎
- E.急性肠扭转

81.此患者最有效的处理是

- A.禁食,胃肠减压
- B.补充血容量
- C.穿刺引流
- D.手术治疗
- E.先抗感染,再手术治疗

82.监测生命体征,发现患者血压 70/40 mmHg,经积极抗休克治疗后仍不好转,此时应

- A.快速输血
- B.继续抗休克治疗
- C.大剂量抗生素治疗
- D.尽快手术探查
- E.抗休克同时行手术治疗

(83~84 题共用题干)

患者,男性,75 岁。左下肢麻木、发凉 1 年,局部皮肤苍白,近日疼痛难耐,尤以夜间加重不能入睡,左侧 2、3 足趾溃疡。

83.为了进一步明确诊断,建议患者实施的检查手段是

- A.彩色多普勒
- B.静脉造影
- C.动脉造影
- D.X 线
- E.强化 CT

84.考虑患者患肢动脉闭塞,治疗方法不正确的是

- A.严禁吸烟
- B.防止受冷、受潮
- C.热疗,促进血液循环
- D.止痛
- E.嘱患肢进行锻炼,尽早建立侧支循环

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(85~86 题共用备选答案)

- A. 排便习惯及粪便性状改变
- B. 腹痛
- C. 腹部包块
- D. 肠梗阻症状
- E. 全身中毒症状

85. 结肠癌最早出现的症状是

86. 左半结肠癌的主要症状是

(87~88 题共用备选答案)

- A. 腹胀
- B. 腹痛
- C. 恶心呕吐
- D. 进行性黄疸
- E. 血尿酸酶升高

87. 急性胰腺炎的主要临床表现是

88. 胰腺癌的主要临床表现是

(89~90 题共用备选答案)

- A. 胆囊息肉样变
- B. 胆管癌
- C. 急性胆囊炎, 胆囊结石
- D. 急性化脓性梗阻性胆囊炎
- E. 胆道蛔虫病

89. 上腹部出现“钻顶样疼痛”且持续性加重的疾病为

90. 剑突下或上腹部胀痛、绞痛, 寒战高热、黄疸、休克、精神神经症状的疾病为

(91~92 题共用备选答案)

- A. 会阴部
- B. 阴囊内
- C. 腹腔内
- D. 耻骨前间隙
- E. 膀胱周围组织

91. 腹膜内型膀胱破裂, 尿液外渗主要分布于

92. 腹膜外型膀胱破裂, 尿液外渗主要分布于

(93~96 题共用备选答案)

- A. 逆行性健忘
- B. 中间清醒期
- C. 突然呼吸停止
- D. 脑脊液漏
- E. 伤后癫痫

93. 硬脑膜外血肿的典型表现是

94. 颅底骨折常可发生

95. 枕骨大孔疝致延髓受压时常发生

96. 脑震荡的临床特征是

(97~98 题共用备选答案)

- A. 氮质血症
- B. 呼吸性酸中毒
- C. 全身广泛性出血
- D. 进行性呼吸困难
- E. 低氧血症

97. ARF 的主要临床表现为

98. DIC 的主要临床表现为

(99~100 题共用备选答案)

- A. 左侧第 5 肋间腋前线交点
- B. 心尖部
- C. 胸骨下段
- D. 胸骨中段
- E. 胸骨中点

99. 对成人心肺复苏, 胸外心脏按压部位为

100. 对小儿心肺复苏, 胸外心脏按压部位为

专业实践能力

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

- 1.呼吸性碱中毒描述正确的是
 - A.CO₂CP 增高,PaCO₂增高
 - B.CO₂CP 增高,PaCO₂降低
 - C.CO₂CP 降低,PaCO₂降
 - D.CO₂CP 降低,PaCO₂升高
 - E.CO₂CP 不变,PaCO₂升高
- 2.使用肝素过程中,凝血时间测定与肝素的关系为
 - A.凝血时间大于 12 分钟,提示肝素剂量不足
 - B.凝血时间小于 12 分钟,提示肝素剂量不足
 - C.凝血时间小于 30 分钟,提示肝素剂量不足
 - D.凝血时间小于 20 分钟,提示肝素剂量小足
 - E.凝血时间大于 20 分钟,提示肝素剂量过量
- 3.胸外按压有效的指征说法不正确的是
 - A.可见瞳孔由散大开始回缩
 - B.可见面色由发绀转势红润
 - C.可见患者有眼球活动睫毛反射与对光反射出现,甚至手脚开始抽动
 - D.大动脉出现搏动,收缩压在 60 mmHg 以上
 - E.自主呼吸出现,可以停止人工呼吸
- 4.拔除中心静脉测压留置管后,不妥的措施是
 - A.局部无菌敷料覆盖
 - B.禁忌沙袋加压固定
 - C.拔管后 24 小时内,注意观察有无穿刺处渗血和肢体肿胀等
 - D.保持置管处的清洁、干燥
 - E.抬高置管的肢体
- 5.肿瘤的三级预防中属于二级预防的内容是
 - A.病因预防
 - B.早发现,早治疗
 - C.康复预防
 - D.减少癌症的发病率
 - E.提高生存质量,减少痛苦
- 6.喉上神经内侧支损伤出现
 - A.呼吸困难
 - B.声调降低
 - C.饮水呛咳
 - D.声音嘶哑
 - E.吞咽困难
- 7.乳腺癌根治术后护理重点不包括
 - A.早期进行康复功能锻炼
 - B.注意伤口的护理
 - C.预防并发症
 - D.术后血压平稳后取平卧位
 - E.注意心理护理
- 8.预防腹部术后肠梗阻的有效护理措施是
 - A.早期半卧位
 - B.早期下床活动
 - C.尽早进食、水
 - D.早期腹部按摩
 - E.早期腹部加压
- 9.对于处在营养障碍期的血栓性脉管炎患者,为了减轻患者疼痛,优先使用的止痛药为
 - A.安乃近
 - B.吗啡
 - C.杜冷丁
 - D.止痛片
 - E.杜非合剂

- 10.慢性脓胸严重者可出现
- A.胸廓内陷
 - B.呼吸运动减弱
 - C.肋间隙变窄
 - D.呼吸音减弱或消失
 - E.脊柱侧凹
- 11.尿石症患者出现肾绞痛时,最有效的方法是
- A.跳跃活动
 - B.热敷理疗
 - C.大量饮水
 - D.服解痉止痛药
 - E.手术切开取石
- 12.患者,男性,长跑后出现腰部绞痛,而后出现肉眼血尿,最可能的病因是
- A.上尿路结石
 - B.下尿路结石
 - C.肾肿瘤
 - D.输尿管肿瘤
 - E.膀胱肿瘤
- 13.肾癌最常见的转移部位是
- A.脑
 - B.骨
 - C.肺
 - D.心包
 - E.膀胱
- 14.预防 ARDS 发生措施正确的是
- A.保证高浓度氧气吸入
 - B.大量输血
 - C.积极治疗原发病
 - D.大量补液
 - E.保证营养
- 15.小儿术前应
- A.禁食(奶)4~6小时,禁饮2~3小时
 - B.禁食4~8小时,禁饮4~6小时
 - C.禁食8~12小时,禁饮2~3小时
 - D.禁食8~12小时,禁饮4小时
 - E.禁食4~8小时,禁饮2~3小时
- 16.监测左心功能的最重要指标是
- A.中心静脉压
 - B.血氧饱和度
 - C.心排血量
 - D.体循环阻力指数
 - E.肺循环阻力指数
- 17.内脏器官成为疝囊壁的一部分,此种疝称为
- A.腹外疝
 - B.股疝
 - C.滑动疝
 - D.脐疝
 - E.白线疝
- 18.冲洗肠痿瘘口每天需要的等渗盐水量约为
- A.1 000~2 000 mL
 - B.2 000~3 000 mL
 - C.3 000~5 000 mL
 - D.5 000~6 000 mL
 - E.6 000~8 000 mL
- 19.细菌性肝脓肿叙述正确的是
- A.大部分为胆源性肝脓肿
 - B.肝大常显著,多有局限性隆起
 - C.脓液多为棕褐色,涂片检查可无细菌
 - D.多见于肝右叶,常单发
 - E.手术引流是其唯一治疗方法
- 20.创伤性窒息的临床特征是
- A.双侧呼吸音减弱或消失
 - B.皮下及纵隔气肿
 - C.头、颈、上肢毛细血管出血
 - D.双侧湿啰音及血痰
 - E.呼吸困难
- 21.患者,男性,被打伤4小时,诊断右侧闭合性血胸,已作闭式胸膜腔引流术,第1次引出血性液900 mL,快速输血补液后,第1小时又引流出220 mL,第2小时120 mL。对该患者较好的治疗选择应是
- A.输血补液,继续观察
 - B.应用抗生素
 - C.应用血管活性药物

- D.气管切开或气管插管,人工辅助呼吸
E.紧急剖胸探查
- 22.绞窄性肠梗阻的呕吐物呈
- A.血性或棕褐色液体
B.粪样
C.黄绿色液体
D.豆渣样
E.暗绿色液体
- 23.甲状腺腺瘤的叙述错误的是
- A.多为单发
B.圆形或椭圆形,表面光滑
C.中等硬度,无压痛
D.随吞咽而上下移动
E.不会发生甲亢或恶变
- 24.预防发生甲亢危象的关键是
- A.术中彻底止血
B.术中操作轻柔
C.术后加强护理
D.术后继续服用碘剂
E.术前充分准备,使基础代谢率降至正常
- 25.关于术前患者消化系统准备说法错误的是
- A.非胃肠道手术者成人术前常规禁食12小时,禁饮4小时
B.术前肠道准备包括口服肠道抗生素2~3天
C.术前胃肠道准备可防止麻醉中呕吐造成窒息
D.幽门梗阻患者,术前不可洗胃
E.术前胃肠道准备可以降低肠道手术的感染率
- 26.对代谢性碱中毒的临床表现描述不正确的是
- A.呼吸浅慢
B.血压轻度下降
C.心跳减弱
D.头晕嗜睡
E.面部肌肉抽动
- 27.慢性肺心病患者,其血气分析和电解质测定结果如下:pH 7.4, PaCO₂ 67 mmHg (8.9 kPa), HCO₃⁻ 40 mmol/L, 血 Na⁺ 140 mmol/L, Cl⁻ 90 mmol/L, 此患者患有的酸碱平衡紊乱的类型是
- A.呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒
B.呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒
C.呼吸性碱中毒合并代谢性碱中毒
D.呼吸性碱中毒合并代谢性酸中毒
E.呼吸性酸中毒
- 28.DIC病人早期进行抗凝治疗的常用药物不包括
- A.肝素
B.双嘧达莫
C.右旋糖酐
D.阿司匹林
E.羟乙基淀粉
- 29.放射治疗患者的护理措施中错误的是
- A.每次照射后患者需静卧半小时
B.选择宽松柔软的内衣
C.保持口腔清洁
D.上腹部照射较胸部照射全身反应小
E.全腹照射密切观察有无腹痛、腹泻症状
- 30.肠痿的腹膜炎期多发生于创伤或手术后
- A.1~2日
B.3~5日
C.5~7日
D.7~14日
E.14日
- 31.肠痿瘘口负压引流管的负压应维持在
- A.1.6~2.2 kPa
B.2.3~3.2 kPa
C.3.3~4.2 kPa
D.4~6 kPa
E.7~8.9 kPa

32.T 管试闭管期间,护士主要观察内容有

- A.体温、血压、脉搏、腹胀
- B.体温、血压、腹痛、黄疸
- C.体温、引流液颜色腹胀少
- D.体温、腹痛、黄疸
- E.腹胀、黄疸、引流量

33.开放性胸部损伤概念正确的是

- A.胸壁有开放创口
- B.胸壁有裂口,深达肌层
- C.胸壁和肺都有裂口
- D.脏层胸膜损伤,胸膜腔与外界相通
- E.冲破壁层胸膜,胸膜腔与外界相通

34.X 中诊断心脏挫伤意义不大的检查是

- A.心脏听诊
- B.X 线片
- C.心电图
- D.超声心动图
- E.酶学检查

35.脓胸患者的护理不正确的为

- A.鼓励患者战胜疾病的信心
- B.脓胸患者应取健侧卧位
- C.减轻疼痛,指导患者做胸式深呼吸
- D.注意观察体温、痰液的变化
- E.加强营养,鼓励患者多进食高蛋白、

高热和富含维生素的食物

36.提示可能出现膀胱破裂的情况是

- A.假性尿失禁
- B.急性尿潴留
- C.排尿突然中断
- D.导尿管不易插入
- E.有尿意但不能排尿

37.为了利于尿道损伤的修复,尿道损伤患者术后留置导尿管时间为

- A.1~7 天
- B.7~14 天
- C.14~21 天
- D.21~28 天

E.30~40 天

38.儿茶酚胺术前护理的关键措施是

- A.降低代谢率
- B.心理护理
- C.限制饮食
- D.控制血糖
- E.遵医嘱服用受体阻滞剂降血压

39.断肢再植术后 24 小时内护理叙述不正确的是

- A.再植肢体高于心脏水平
- B.保持再植肢体血管扩张
- C.皮肤颜色呈暗紫色提示静脉栓塞
- D.遵医嘱使用低分子右旋糖酐
- E.患侧肢体温度应稍低于正常

40.女性,32 岁。患急性乳腺炎并发败血症,体温 38.8℃,血压 80/60 mmHg,白细胞高,诊断为感染性休克。护理措施不正确的是

- A.观察尿量
- B.补充血容量
- C.取半卧位
- D.应用抗生素
- E.必要时输血浆或全血

41.女性,53 岁。椎管内阻滞下行“腹腔镜胆囊切除术”。术中患者出现血压下降的主要原因是

- A.肾上腺阻滞
- B.脊神经根损伤
- C.交感神经阻滞
- D.副交感神经阻滞
- E.中枢神经介质释放减少

42.男性,42 岁。Ⅱ度烧伤面积 35%,该患者属于

- A.轻度烧伤
- B.中度烧伤
- C.重度烧伤
- D.特重烧伤
- E.小面积烧伤

43.男性,54 岁。腹部外伤手术 2 周后,

出现腹部疼痛、压痛、反跳痛阳性,寒战、高热、腹部出现瘘口,伴有水、电解质紊乱,入院初步诊断为肠痿。最简单实用的确诊方法为

- A.血常规检查
- B.口服染料或药用炭检查
- C.肝酶谱升高
- D.病理学检查
- E.影响学检查

44.患者,女性,36岁。昨起体温升高到41℃伴恶心、呕吐,持续性腹痛体检:神志清,两肺呼吸音粗,全腹膨隆、压痛,伴轻度反跳痛及肌紧张,肠鸣音减弱,白细计数 $23 \times 10^9/L$,中性粒细胞比例升高。急腹症病因未明确前,治疗措施不正确的是

- A.对症处理
- B.密切观察病情变化,进行抗休克
- C.可灌肠和使用泻药
- D.疑有腹腔肉出血不止,积极剖腹探查
- E.慎用止痛药

45.患者,女性,42岁。2小时前突发尿频、尿急和尿痛,伴下腹疼痛。首先应考虑的检查方法是

- A.尿常规检查
- B.膀胱镜检查
- C.尿路平片检查
- D.导尿测试残余尿
- E.排泄性尿路造影

46.女性,40岁。车祸致左腕部位疼痛、活动受限,X线显示:左腕关节脱位。麻醉下复位,固定的位置为

- A.伸直中立位
- B.伸直外展位
- C.伸直内收位
- D.屈曲内收位
- E.屈曲外展位

47.男性,70岁。脑出血后进行气管切开手术,呼吸机辅助呼吸。为保持呼吸道通畅,给予抽吸呼吸道分泌物的指征是

- A.患者频繁咳嗽
- B.呼吸机低气压报警
- C.肺部听诊呼吸音粗
- D.患者心率增快
- E.患者血压升高

48.女性,30岁。行硬膜外麻醉腹腔镜胆囊切除术,术后患者出现剧烈背痛,进行性脊髓压迫症状,伴肌无力、尿潴留、括约肌功能障碍,继而出现完全性截瘫。首先应考虑为

- A.硬膜外血肿
- B.麻醉药中毒反应
- C.药物过敏反应
- D.全脊髓麻醉
- E.麻醉平面过高

49.男性,37岁。在家劳动时被锄头弄伤,伤口小而深,未做清创处理。近日,感头痛、咬肌紧张酸胀,诊断为破伤风其发病机制中错误的是

- A.破伤风杆菌产生的内毒素引起症状
- B.痉挛毒素是引起症状的主要毒素
- C.溶血毒素引起组织局部坏死和心肌损害
- D.破伤风是一种毒血症
- E.毒素也可影响交感神经

50.女性,56岁。主因胆管癌行胆管空肠吻合术,术后怀疑胆痿发生的指征为

- A.腹痛、体温高、血压低
- B.腹痛、体温高、腹引出淡黄色胆汁样液体
- C.腹痛、血压低、腹引出淡红色液体
- D.体温高、血压低、腹引量突然增多
- E.体温高、心率快、腹引量突然减少

51.患者,男性,60岁。经检查诊断颅内占位性病变、颅内压增高,拟行开颅手术。入院后第3天,患者出现剧烈头痛、呕吐频繁,烦躁不安,右侧瞳孔散大,左侧肢体肌力减退,病理征阳性。首要的处理措施是

- A.使用脱水剂

- B.吸氧
C.镇静
D.止吐
E.核磁检查
- 52.男性,40岁。主诉:颈肩部疼痛及僵硬,向上肢放射,单侧或双侧上肢麻木、感觉过敏、无力或有放电样电痛,当咳嗽、喷嚏、颈部活动时加重该患者所患颈椎病分型为
- A.神经根型颈椎病
B.脊髓型颈椎病
C.椎动脉型颈椎病
D.交感神经型颈椎病
E.颈型颈椎病
- 53.患者,男性,35岁。突发上腹部疼痛,伴恶心、呕吐,查尿常规:红细胞满视野,白细胞6~13个/HP血常规正常,考虑为左输尿管结石。目前最恰当的急救处理措施是
- A.适当跳跃活动
B.嘱患者大量饮水
C.体外冲击波碎石
D.消炎、解疼、止痛
E.迅速行手术探查
- 54.患者,男性,56岁。因肠梗阻行胃肠减压时出现血性引流液,该患者可能进展为
- A.粘连性肠梗阻
B.肠套叠
C.绞窄性肠梗阻
D.麻痹性肠梗阻
E.痉挛性肠梗阻
- 55.女性,60岁。诊断为原发性肝癌行肝叶切除术后1周出现嗜睡、烦躁不安、迅速陷入深昏迷、黄疸等,应考虑
- A.肝断面出血
B.肝性脑病
C.休克
D.败血症
E.胆汁性腹膜炎
- 56.男性,46岁。因脑肿瘤颅内压增高,行脑室引流术后3小时,引流管无脑脊液流出,不正确的处理是
- A.将引流管(袋)放低
B.通知医生及时处理
C.将引流管轻轻旋转
D.生理盐水冲洗
E.必要时换管
- 57.男性,49岁。诊断为肺结核,行全肺叶切除术后麻醉清醒且生命体征平稳,术后正确的卧位是
- A.患侧卧位
B.头低足高仰卧位
C.1/4侧卧位
D.半坐卧位
E.俯卧位
- 58.男性,60岁。发现无痛性、间歇性肉眼血尿2周,尿检发现癌细胞,为求进一步诊断,最有意义的检查方法是
- A.腹部平片
B.膀胱镜检查
C.膀胱镜检查+逆行肾盂造影
D.静脉尿路造影
E.肾动脉造影
- 59.患者,女性,66岁。胫腓骨骨折1周后更换为长腿石膏管型固定,约4小时主诉石膏管型内肢体疼痛。错误的处理是
- A.疼痛处石膏型开窗
B.抬高肢高
C.调整肢体体位
D.向疼痛处填塞棉花
E.可更换石膏
- 60.男性,56岁。主诉尿流缓慢、尿频、尿急、排尿不尽2个月余,近期加重入院。为明确诊断进行血清前列腺特异性抗原(PSA)检查,怀疑其患有前列腺癌的PSA临界值是
- A.0.16 ng/mL
B.2.0 ng/mL
C.3.0 ng/mL

D.4.0 ng/mL

E.5.0 ng/mL

(61~64 题共用题干)

患者,女性,15 岁。右足底被铁锈钉刺伤 7 天,突然出现张口困难,继之出现苦笑面容,角弓反张,声响及触碰患者可诱发上述症状,患者神志清楚,体温正常。

61.该病致病菌属于

A.革兰染色阴性大肠埃希菌

B.革兰染色阴性厌氧拟杆菌

C.草兰染色阴性变形杆菌

D.革兰染色阳性梭形芽胞杆菌

E.革兰染色阳性厌氧芽胞杆菌

62.该病属于

A.毒血症

B.菌血症

C.败血症

D.脓血症

E.脓毒血症

63.机体威胁最大的是

A.肌肉断裂

B.骨折

C.尿潴留

D.持续的呼吸肌痉挛

E.营养障碍

64.若该患者已经作过破伤风自动免疫,伤后为预防破伤风需要

A.再注射破伤风类毒素 2 mL

B.再注射破伤风类毒素 0.5 mL

C.再注射免疫球蛋白 3 000 IU

D.再注射破伤风抗毒素 1 500 IU

E.再注射 TAT 2 万单位

(65~66 题共用题干)

患者,男性,17 岁。由货车上跌下 3 小时,出现呼吸困难,并逐渐加重。入院后面发绀,吸气性呼吸困难,颈上胸部有皮下气肿,气管向左移位,右侧呼吸音消失。

65.诊断首先考虑

A.多根多处肋骨骨折

B.血胸

C.心包积血

D.开放性气胸

E.张力性气胸

66.急救措施是

A.立即输血补液抗休克

B.抗休克同时开胸探查

C.胸腔闭式引流排气减压

D.大量吸氧

E.呼吸机辅助呼吸

(67~68 题共用题干)

患者,女性,68 岁。胃溃疡病史 3 年,1 年来上腹痛发作频繁,无规律,体重减轻。

67.该患者最有意义的检查为

A.粪便隐血试验

B.胃酸测定

C.胃镜检查

D.血癌胚抗原测定

E.腹部 B 超

68.患者粪便隐血试验(+),胃酸 pH 6.0。腹部 B 超示:肝脏实质均匀。胃镜示:胃窦部直径 5.5 cm 溃疡边缘隆起。此时最适宜的治疗为

A.胃癌根治术

B.胃大部切除术

C.腹腔动脉栓塞化疗

D.胃空肠吻合术

E.全身静脉化疗

(69~71 题共用题干)

患者,男性,45 岁。3 天前施工时被石板砸伤,X 线片未见骨折,行清创缝合。现突然出现烦躁不安,伴恐惧感,大汗淋漓,自述右下肢伤处疼痛加重,胀裂感。体温 38.5℃,脉搏 128 次/分,血压 146/92 mmHg,右小腿肿胀明显,大量浆液血性渗出物自切口渗出,皮肤表面呈大理石样花纹,渗出物有恶臭味。

69.本病可诊断为

A.芽胞菌性蜂窝织炎

- B. 厌氧性链球菌性蜂窝织炎
- C. 大肠杆菌伴蜂窝织炎
- D. 梭状芽胞杆菌感染
- E. 变形杆菌感染

70. 以下不恰当的是

- A. 右下肢广泛、多处切开
- B. 800 万 U 青霉素静脉注射
- C. 输 200 mL 同型新鲜血
- D. 右下肢截肢
- E. 高压氧疗法

71. 现本病的可能原因为

- A. 清创不彻底
- B. 患者有复合创伤
- C. 未注射 TAT
- D. 患者低蛋白血症
- E. 切口包扎过紧

(72~74 题共用题干)

患者, 女性, 57 岁。阵发性右上腹绞痛伴高热, 体温 38.5℃, 诊断为急性化脓性胆管炎, 急诊行胆囊切除术, 胆总管探查, T 管引流术。

72. 术后 T 管引流和腹腔引流护理措施不同的是

- A. 保持引流管通畅
- B. 密切观察引流液的量、颜色、性质
- C. 拔管前需试行闭管 1~2 天
- D. 固定好引流管引流管应低于引流口
- E. 严格执行无菌操作

73. 术后故置 T 管的目的不包括

- A. 预防胆汁性腹膜炎
- B. 防止胆管狭窄、梗阻等并发症
- C. 支撑胆道
- D. 防止胆道出血
- E. 引流胆汁

74. 患者拟带管回家, 护士给予的指导不正确的是

- A. 保护好引流管, 防止脱落
- B. 定期到医院更换引流袋
- C. 保证充足睡眠

D. 进食高蛋白、低脂饮食

E. 备好止痛药防止腹痛

(75~76 题共用题干)

患儿, 男, 9 岁。玩耍时跌倒, 手掌着地, 伤后 15 小时就诊, 查体: 左前臂及左肘关节肿胀明显, 压痛, 半屈状畸形, 手部皮肤苍白, 发凉, 麻木, 桡动脉搏动消失, 被动伸指疼痛剧烈。

75. X 线拍片前应首先考虑是

A. 左尺桡骨双骨折合并前臂骨筋膜室综合征

B. 左肘关节脱位

C. 左肱骨干骨折合并软组织损伤

D. 左肱骨髁上骨折合并前臂骨筋膜室综合征

E. 左 Colles 骨折合并神经损伤

76. 病程特点首选的处理是

A. 患肢石膏托外固定

B. 持续骨牵引

C. 静脉输入脱水消炎药物

D. 手术切开复位

E. 切开减压+血管探查+骨折内固定术

(77~78 题共用题干)

患者, 男性, 58 岁。肺癌术后行化学药物治疗, 经中心静脉行肠外营养支持 5 天, 患者出现不明原因的发热、寒战、烦躁不安。

77. 患者可能的诊断是

A. 气胸

B. 空气栓塞

C. 低血糖

D. 血栓性静脉炎

E. 感染

78. 患者肠外营养中心静脉导管护理措施不正确的是

A. 插管部位每日消毒更换敷料

B. 观察记录有无红肿热痛

C. 保持导管通畅

D. 定时更换导管

E. 输注结束后用肝素液封管

(79~80题共用题干)

患者,女性,38岁。已婚,2年来常感下腹部隐痛不适,12小时前突起转移性右下腹痛,伴恶心、呕吐、发热,查右下腹明显压痛、反跳痛、肌紧张。血常规:WBC $16 \times 10^9/L$ 。尿常规无特殊异常。

79.患者诊断为急性化脓性阑尾炎并腹膜炎,手术后第4天出现下腹坠胀不适、大便次数增多、里急后重、排尿困难等现象。首先考虑可能的原因为

- A.急性肠胃炎
- B.盆腔脓肿
- C.急性附件炎
- D.直肠癌
- E.泌尿系感染

80.可采用的最恰当治疗方法是

- A.大剂量抗生素
- B.热水坐浴,会阴部理疗
- C.经直肠脓肿切开引流术
- D.经腹腔脓肿切开引流术
- E.经后穹隆切开引流术

(81~82题共用题干)

患者,女性,44岁。2小时前遭人殴打,腹痛渐加剧,来院急诊。查体:神志淡漠, P 11次/分, BP 95/50 mmHg,腹部压痛、反跳痛,以下腹部明显,移动性浊音(+),导尿仅为少量血尿。

81.患者应首先考虑为

- A.腹膜外型膀胱破裂致腹膜炎
- B.腹膜外型膀胱破裂致盆腔炎
- C.腹膜内型膀胱破裂致腹膜炎
- D.腹膜内型膀胱破裂致盆腔炎
- E.肾全层裂伤伴输尿管断裂

82.处理措施是

- A.迅速止血
- B.应用抗生素
- C.膀胱造瘘
- D.手术探查
- E.导尿管持续引流

(83~84题共用题干)

患者,男性,47岁。头痛发病,病程4个月,入院前出现左侧肢体无力和呕吐。入院检查:意识清,眼底视乳头水肿;左侧上、下肢肌力Ⅳ级,腱反射活跃,病理征(+).

83.目前能确定的诊断是

- A.脑梗死
- B.脑出血
- C.蛛网膜下腔出血
- D.脑水肿
- E.颅内压增高

84.首选的检查是

- A.X线颅片
- B.脑电图
- C.脑血管造影
- D.CT
- E.ECT

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(85~86题共用备选答案)

- A.禁用含钾食物及含钾药物,不输库存血
- B.合理补液,也要补充生理需要量
- C.摄入易于消化和吸收的高蛋白饮食
- D.避免与各种危害肾脏的物质接触
- E.特别提醒病人防止疲劳和定期复查

85.肾衰竭少尿及无尿期的护理要点是

86.肾衰竭多尿期的护理要点是

(87~88题共用备选答案)

- A.平卧位
- B.患侧卧位
- C.术侧向下卧位
- D.半卧位

- E.健侧卧位
- 87.气胸有效引流时采取
- 88.支气管胸膜瘘者采用
(89~91 题共用备选答案)
- A.骨牵引
B.皮肤牵引
C.骨盆带牵引
D.骨盆悬吊牵引
E.枕颌带牵引
- 89.适用于腰椎间盘突出症的牵引是
- 90.适用于股骨干骨折的牵引是
- 91.适用于老年肢体骨折的牵引是
(92~94 题共用备选答案)
- A.血运转移
B.医源性转移
C.直接蔓延
D.种植性转移
E.淋巴转移
- 92.腹部肿瘤经门脉系统转移到肝脏,转移方式属于
- 93.乳房癌的“橘皮样变”、卫星结节,转移方式属于
- 94.子宫颈癌侵及骨盆底,转移方式属于
(95~96 题共用备选答案)
- A.平卧位
B.侧卧位
C.俯卧位
D.半卧位
E.中凹位
- 95.甲亢手术患者麻醉清醒后应取
- 96.急性化脓性腹膜炎患者若病因诊断不明,在病情观察期间应取
(97~98 题共备选答案)
- A.术后 1~2 天
B.术后 3~6 天
C.术后 5~7 天
D.术后 7~10 天
E.术后 10~14 天
- 97.排空延迟好发于
- 98.十二指肠残端破裂好发于
(99~100 题共用备选答案)
- A.60~100 mL
B.60~100 cm
C.100 cm 以上
D.100 mL 以上
E.1 000 mL 或以上
- 99.大量血胸指出血量在
- 100.引流瓶应低于胸壁引流口平面



考前点睛班