

## 专业知识

题型：A1 型选择题

题目：

横断面研究可以

选项：

- A.了解疾病的患病情况
- B.证实病因
- C.分析病因
- D.排除危险因子
- E.动态观察疾病的演变情况

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

有关妊娠期妇女口腔保健的描述中，正确的是

选项：

- A.孕妇营养缺乏可导致婴儿牙发育不可逆的改变
- B.妊娠期龈炎主要由孕妇偏好甜食引起
- C.妊娠期前3个月是治疗口腔疾病的适宜时期
- D.婴儿口腔护理及喂养知识的健康教育应在妇女分娩后进行
- E.孕妇可在医生指导下服用苯二氮卓类镇静安眠药

答案：A

解析：

题型：A1 型选择题

题目：

窝沟封闭成功的关键是

选项：

- A.酸蚀时间长
- B.酸蚀面积大
- C.光固化时间适宜
- D.涂布封闭剂气泡
- E.酸蚀后不被唾液污染

答案：E

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

无致龋性的甜味剂是

选项：

- A.蔗糖
- B.果糖

- C.半乳糖
- D.双糖
- E.甜菊糖

答案： E

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

戊二醛一酚溶液使用的稀释度是

选项：

- A.1 : 32
- B.1 : 16
- C.1 : 8
- D.1 : 4
- E.1 : 2

答案： A

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

洗必泰是一种

选项：

- A.一价的阳离子表面活性剂
- B.二价的阳离子表面活性剂
- C.一价的阴离子表面活性剂
- D.二价的阴离子表面活性剂
- E.中性离子表面活性剂

答案： B

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

牙周病一级预防的确切内容是

选项：

- A.义齿修复，防止功能丧失
- B.早发现、早治疗，减少牙周病的严重程度
- C.以药物与牙周手术治愈牙周病损
- D.控制牙菌斑，减轻牙龈出血
- E.健康教育、定期保健、保持牙周健康

答案： E

解析： 无

题型： A1 型选择题

题目：

急性根尖周炎疼痛缓解时的病理特点是脓肿

选项：

- A.位于牙槽窝内
- B.达黏膜下
- C.达骨膜下
- D.位于牙槽窝和牙槽骨
- E.位于牙周膜内

答案： B

解析：急性根尖周炎分为3个阶段，即根尖周脓肿、骨膜下脓肿、黏膜下脓肿。形成黏膜下脓肿时，因黏膜下组织疏松、张力小，脓肿内压力比骨膜下脓肿大大降低，故疼痛明显减轻，所以B正确。脓肿位于牙槽窝内，炎症局限，得不到引流，所以疼痛明显，因此A、D错误。脓肿达骨膜下，因骨膜致密、坚韧，脓液聚集不易引流，疼痛明显，所以C错误。位于牙周膜内，范围局限，疼痛也无法缓解，所以E错误。故此题选B。

题型： A1 型选择题

题目：

急性根尖周脓肿时，医生建立最佳的引流通道是

选项：

- A.根尖孔—根管—龋洞
- B.根尖部—牙周袋
- C.根尖部—牙槽骨—黏膜下
- D.根尖部—牙槽骨—皮肤下
- E.根尖部—牙周间隙—龈袋

答案： A

解析：急性根尖周脓肿的引流通道有3条：经龋洞、由牙周袋或龈袋、经黏膜或皮肤。其中经龋洞排脓，对根周膜破坏少，患者痛苦小，预后良好，为最佳排脓途径，所以A正确。其他2个途径会破坏根周膜、骨板、皮肤黏膜等，患者痛苦大，故此题选A。

题型： A1 型选择题

题目：

临床上乳牙根管治疗术常用药物是

选项：

- A.氧化锌丁香油糊剂
- B.聚羧酸水门汀
- C.磷酸水门汀
- D.樟脑酚
- E.甲醛甲酚

答案： A

解析：乳牙根管治疗术常用药物是可吸收且不影响乳恒牙交替的糊剂填充，氧化锌丁香油糊剂符合要求，临床最常用，所以A正确。

题型： A1 型选择题

题目：

青少年根尖周炎最好选用哪种治疗方法

选项:

- A.干髓术
- B.根管治疗
- C.塑化治疗
- D.空管治疗
- E.安抚治疗

答案: D

解析: 空管药物疗法是根管预备消毒后, 在根管口覆盖药物, 不进行根管充填塑化而促使根尖周病变愈合的一种方法。恒磨牙急慢性根尖周炎均可采用空管药物治疗, 其主要优点是操作比较简单, 不需要完善的根管充填, 减少操作时间及治疗次数, 其远期疗效也较理想, 所以 D 正确。

题型: A1 型选择题

题目:

临床上年轻恒牙异常松动的原因多为

选项:

- A.牙根未发育完全
- B.根尖周病
- C.牙髓炎
- D.牙龈炎
- E.外伤

答案: B

解析: 牙齿松动常说明牙根周围组织处于充血、炎症状态, 在没有其他非龋因素存在时, 说明牙髓存在感染, 且通过根尖孔扩散到牙根周围组织。牙根未发育完全是一个生理现象, 不会造成过大动度, 排除 A。牙髓炎及牙龈炎都没有侵及根尖周组织, 所以不会造成牙体松动, 排除 C、D。外伤不是最常见原因, 排除 E。所以此题选 B。

题型: A1 型选择题

题目:

恒牙根尖发育完成的时间是

选项:

- A.萌出时
- B.萌出后半年
- C.萌出后 1~2 年
- D.萌出后 3~5 年
- E.萌出后 6~8 个月

答案: D

解析: 恒牙根尖发育完成的时间为在牙齿萌出后, 前牙还需要 2~3 年, 后牙还需要 3~5 年, D 正确。

题型: A1 型选择题

题目:

前磨牙楔状缺损应选用的最佳充填材料是

选项:

- A.树脂改良的玻璃离子粘固粉
- B.化学固化复合树脂
- C.磷酸锌粘固粉
- D.银汞合金
- E.聚羧酸锌粘固粉

答案：A

解析：临床上充填楔状缺损时，选用何种材料应遵循以下原则：①重视美观：前牙颜色接近于正常牙色，修复后的牙齿能增加美的感觉。②注重职业、工种要求：最好选用较理想的复合树脂充填缺损。③注意耐磨性：抗压耐磨性好的材料是银汞合金，适用于磨牙颈部、面洞的充填。如果口内牙齿上有义齿支托或卡环通过缺损区，应该考虑选用耐磨损材料，如前牙使用光固化复合树脂，后牙应用银汞合金材料充填。故最佳的材料是树脂改性的玻璃离子粘固粉。选A。

题型：A1型选择题

题目：

嵌入性牙脱位多见于

选项：

- A.错位牙
- B.松动牙
- C.牙周病患牙
- D.乳牙和年轻恒牙
- E.牙冠较短的恒牙

答案：A

解析：嵌入性牙脱位是指牙齿向深部嵌入时临床牙冠变短，面或切缘低于正常邻牙；多见于乳牙和年轻恒牙；在复位后2周内应行根管治疗术，但对年轻恒牙，不可强行拉出复位，可随访观察，任其自然萌出。

题型：A1型选择题

题目：

牙隐裂好发于

选项：

- A.下颌第一磨牙
- B.上颌第一磨牙
- C.下颌第二磨牙
- D.上颌第二磨牙
- E.上颌前磨牙

答案：B

解析：牙隐裂好发于中老年患者的后牙咬合面，以上颌第一磨牙最常见，因此B正确。下颌第一磨牙、下颌第二磨牙、上颌第二磨牙及上颌前磨牙也可发生隐裂，但不如上颌第一磨牙常见，因此本题应选B。

题型：A1型选择题

题目：

在临床上，发生楔状缺损的常见频率顺序是

选项:

- A.中切牙、侧切牙、尖牙、双尖牙、磨牙
- B.双尖牙、尖牙、磨牙、侧切牙、中切牙
- C.尖牙、中切牙、侧切牙、双尖牙、磨牙
- D.尖牙、双尖牙、磨牙、中切牙、侧切牙
- E.侧切牙、中切牙、尖牙、双尖牙、磨牙

答案: B

解析: 楔状缺损多见于中年以上患者, 由于其不恰当的刷牙方法、特殊牙弓形酸蚀等原因造成, 所以最常发生于前磨牙, 其次为尖牙、第一恒磨牙, 有时范围涉及第二恒磨牙以前的全部牙齿, 侧切牙、中切牙也可发生, 故 B 正确。

题型: A1 型选择题

题目:

急性牙髓炎患牙疼痛部位的特点是

选项:

- A.患者能指出患牙部位
- B.下颌疼痛患牙为下牙
- C.上颌疼痛患牙为上牙
- D.患牙疼痛多无放散性
- E.上颌疼痛患牙可为下牙

答案: E

解析: 急性牙髓炎的临床表现: 自发性阵发性痛、夜间痛、温度刺激加剧疼痛、疼痛不能自行定位, 不能指明患牙所在, 且疼痛呈放射性或牵涉性, 常常沿三叉神经第三支分布区域放射至患牙同侧上、下颌牙或头、颞、面部。但这种放射痛不会发生到患牙的对侧区域。故 E 项说的是放射性疼痛特点。

题型: A1 型选择题

题目:

逆行性牙髓炎不同于其他牙髓炎的临床表现特点是

选项:

- A.冷测缓解疼痛
- B.有阵发性自发病
- C.热测引起迟缓痛
- D.深及根尖的牙周袋
- E.III 度松动, 叩痛 (++)

答案: D

解析: 逆行性牙髓炎感染来源于患牙牙周病所致的深牙周袋。临床表现为自发性阵发性痛, 冷热刺激痛, 放射痛, 夜间痛等急性牙髓炎症状, 也可表现为慢性牙髓炎的表现, 即冷、热刺激敏感或激发痛, 以及不典型的自发痛或胀痛, 这些表现与牙髓炎的表现类似, 但逆行性牙髓炎临床检查可见深达根尖部牙周袋或较为严重的根分叉病变, 无引发牙髓炎的深龋或其他牙体硬组织疾病, 故本题选 D。

题型: A1 型选择题

题目:

各型牙内陷中最严重的是

选项:

- A.畸形根面沟
- B.畸形舌侧窝
- C.畸形舌侧尖
- D.牙中牙
- E.釉珠

答案: B

解析: 根尖 1/3 处根折的患牙, 如牙髓状况良好, 可调后观察。故选 B。

题型: A1 型选择题

题目:

根尖 1/3 处折断的患牙处理为

选项:

- A.固定并定期观察
- B.牙髓状况良好, 可调, 观察
- C.不治疗
- D.牙髓治疗
- E.定期观察

答案: B

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

头影测量 Y 轴角小说明

选项:

- A.上颌后缩
- B.上颌前突
- C.下颌前突
- D.下颌后缩
- E.双颌前突

答案: C

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

面中部发育不良易导致哪种错畸形

选项:

- A.安氏 II 类 1 分类错
- B.安氏 II 类 2 分类错
- C.安氏 III 类错
- D.安氏 I 类错
- E.以上都不对

答案: C

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

先天缺牙的最常见病因是

选项：

- A.遗传因素
- B.内分泌功能障碍
- C.间隙不足
- D.钙磷代谢异常
- E.以上都不对

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

可以使不锈钢正畸弓丝变硬的方法是

选项：

- A.退火
- B.冷加工硬化
- C.老化变硬
- D.沉积变硬
- E.以上均不可以

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

下列各项测量属于人体测量法的是

选项：

- A.利用分规、尺等工具度量面部宽度
- B.在组织切片上观察胚胎颅面部的生长发育特点
- C.在 X 线头影侧位片上测量上颌骨的大小和位置
- D.利用放射性核素作为体内标记物，再用放射线自显影方式显微照相分析骨的生长发育情况
- E.将金属钉植入颌骨内，然后结合系列 X 线头颅定位片来研究颌骨生长量和方向

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

有关颅部的生长发育，以下描述错误的是

选项：

- A.颅骨的生长发育始于结缔组织性质的膜性颅
- B.头部开始形成的时间大约是胚胎第 3 周



- C. 颅部由含脑的颅脑和含面的颅面所组成
- D. 胚胎第 8 周时，颅底软骨开始骨化
- E. 颅基底软骨生长发育，以满足脑量扩大的需要

答案：D

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

涎腺造影检查的禁忌证为

选项：

- A. 急性化脓性腮腺炎
- B. 外伤性涎痿
- C. 阴性涎石症
- D. 腮腺恶性肿瘤
- E. 腮腺慢性反复肿胀

答案：A

解析：对涎腺造影检查禁忌证的掌握程度。涎腺造影技术用于检查涎腺的慢性炎症、肿瘤、涎痿以及涎腺周围组织病变是否已侵入腺体与导管，并决定病变位置和性质。就目前观点来说涎腺造影技术用于涎腺慢性炎症、涎痿、舍格伦综合征最好。涎腺肿瘤用 B 超或 CT 检查与诊断更准确。

题型：A1 型选择题

题目：

腮腺区肿块如要做穿刺检查，可能会损伤其他的结构，其中最不可能损伤的是

选项：

- A. 颞浅动静脉
- B. 下颌后静脉
- C. 面神经颊支
- D. 舌下神经
- E. 耳颞神经

答案：D

解析：腮腺咬肌区有许多重要的血管通过，可分为纵行和横行两组：纵形组为颞浅动静脉、耳颞神经、下颌后静脉及颈外静脉；横行组为面神经、上颌动静脉及面横动脉。而舌下神经行走于下颌角水平时，即弯曲向前，行于二腹肌、茎突舌骨肌与舌骨舌肌之间。因此，行走过程中与腮腺区没有任何关系。腮腺区穿刺是不会损伤舌下神经的，而 A、B、C、E 选项中的任何一个都是有可能损伤的。

题型：A1 型选择题

题目：

干槽症出现在拔牙术后几天

选项：

- A. 3~5 天
- B. 3~6 天
- C. 3~4 天

D.3~7天

E.1~4天

答案：C

解析：干槽症主要为拔牙术后常见的并发症。病因可能与损伤、感染、牙槽窝过大、血液供应不良以及患者身体抵抗力下降所致。主要症状是在拔牙后3~4天，感觉局部有持续性剧烈疼痛，并且牵涉到耳颞部痛。局部牙槽窝内凝血块呈暗灰色，坏死组织逐渐脱落，使牙槽骨暴露。

题型：A1型选择题

题目：

上颌骨骨折首选

选项：

A.华特位片

B.CT

C.核磁

D.平片

E.造影

答案：A

解析：华特位片主要用于观察上颌窦、额窦、筛窦、鼻腔、上颌骨、颧骨、颧弓、下颌喙突及颌间间隙等部位的病变，包括肿瘤、炎症、外伤、发育畸形等。

题型：A1型选择题

题目：

普鲁卡因不适合

选项：

A.表面麻醉

B.阻滞麻醉

C.局部麻醉

D.静脉麻醉

E.椎管麻醉

答案：A

解析：普鲁卡因穿透力弱，不适合表面麻醉。

题型：A1型选择题

题目：

哪个乳牙过早缺失影响最大

选项：

A.第二乳磨牙

B.乳尖牙

C.第一乳磨牙

D.第三乳磨牙

E.乳切牙

答案：A

解析：第二乳磨牙过早缺失影响最大。乳尖牙早失造成恒尖牙异位萌出，常见唇侧萌出。

题型：A1 型选择题

题目：

不能使用旋转力拔除的牙是

选项：

- A. 下切牙
- B. 上中切牙
- C. 下前磨牙
- D. 下尖牙
- E. 上尖牙

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

治疗三叉神经痛首选

选项：

- A. 卡马西平
- B. 苯妥英钠
- C. 布洛芬
- D. 氯丙嗪
- E. 阿托品

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

口腔颌面颈部大手术后引流常用

选项：

- A. 片状引流
- B. 纱条引流
- C. 管状引流
- D. 正压引流
- E. 负压引流

答案：E

解析：口腔颌面外科常用的引流物有以下几种：片状引流、纱条引流、管状引流、负压引流。其中负压引流优点较多，具有较强的引流作用，而且不需加压包扎伤口，患者感觉舒适；因创口内是负压，组织间贴合紧密，利于创口愈合，也不易继发感染。

题型：A1 型选择题

题目：

皮样囊肿好发于

选项：

- A. 眼睑

- B.额
- C.鼻
- D.耳下
- E.口底颈部

答案：E

解析：皮样或表皮样囊肿多见于儿童及青年，皮样囊肿好发于口底、颌下，表皮样囊肿好发于眼睑、额、鼻、眶外侧、耳下等部位。

题型：A1型选择题

题目：

中央有一小色素点是

选项：

- A.腺样囊肿
- B.黑痣
- C.表皮样囊肿
- D.皮样囊肿
- E.皮脂腺囊肿

答案：E

解析：皮脂腺囊肿常见于皮脂腺丰富的颜面部，小的如豆，大则可至小柑橘样。囊肿呈圆形，位于皮内，并向皮肤表面突出，囊壁与皮肤紧密粘连，中央可有一小色素点。临床上可以根据这个主要特征与表皮样囊肿作鉴别。灰白色凝乳状、有臭味的内容物偶可流出。

题型：A1型选择题

题目：

毒性最强的局麻药是

选项：

- A.普鲁卡因
- B.卡波卡因
- C.利多卡因
- D.丁卡因
- E.布比卡因

答案：D

解析：丁卡因麻醉效能和毒性较大，常用于表面麻醉。

题型：A1型选择题

题目：

布比卡因麻醉时间可达

选项：

- A.1 h
- B.2 h
- C.4 h
- D.5 h
- E.6 h

答案：E

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

肾上腺素可引起的不适中，不包括

选项：

A.心悸

B.恐惧

C.颤抖

D.头痛

E.麻木

答案：E

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

上颌尖牙腭侧有下列神经吻合

选项：

A.上牙槽前神经与上牙槽中神经

B.鼻腭神经与腭中神经

C.腭前神经与腭中神经

D.腭中神经与腭后神经

E.腭前神经与鼻腭神经

答案：E

解析：腭前神经与鼻腭神经在左右尖牙处有吻合。

题型：A1 型选择题

题目：

髁状突骨折患者应重视张口训练，其原因是

选项：

A.防止关节内纤维增生，避免以后发生颞下颌关节强直

B.使髁状突保持在功能位，促进髁状突复位

C.使髁状突处于功能状态，促进骨折早期愈合

D.张口时髁状突与下骨折段之间的距离增加，避免下颌支向上方移位引起颌骨畸形

E.张口时髁状突所受应力较小，使骨折免受不良应力干扰

答案：A

解析：髁状骨折应早期进行张口训练以免发生颞下颌关节强直。

题型：A1 型选择题

题目：

单侧下颌颌孔部垂直骨折，后段骨折片常向前上方移位并稍偏健侧是由于

选项：

A.前段骨折片所附升颌肌群牵引

B.后段骨折片所附升颌肌群牵引

- C.前段骨折片所附降颌肌群牵引
- D.后段骨折片所附降颌肌群牵引
- E.后段骨折片所附翼外肌牵引

答案： B

解析： 根据肌肉附着和牵拉方向选择。

题型： A1 型选择题

题目：

髁状突颈部骨折后髁状突常被拉向前内方是由于患侧

选项：

- A.颞肌的作用
- B.咬肌的作用
- C.翼内肌的作用
- D.翼外肌的作用
- E.关节韧带的作用

答案： D

解析： 根据肌肉附着和牵拉方向选择。

题型： A1 型选择题

题目：

下颌骨体部骨折固定的时间为

选项：

- A.3 周
- B.4 周
- C.2 个月
- D.3 个月
- E.半年

答案： B

解析： 单纯颌间固定， 下颌骨一般固定 4-6 周， 上颌骨 3-4 周。

题型： A1 型选择题

题目：

描述上颌骨血供特点及临床意义哪项是错误的

选项：

- A.血运较下颌骨丰富
- B.抗感染能力强
- C.骨折愈合较下颌骨迅速
- D.具有单源性血供特点
- E.外伤后出血较多

答案： D

解析： 上颌骨血供丰富。

题型： A1 型选择题

题目：

最易并发颅脑损伤的颌骨骨折是

选项:

- A. LeFort I 型骨折
- B. LeFort II 型骨折
- C. LeFort III 型骨折
- D. 髁状突骨折
- E. 下颌骨正中骨折

答案: C

解析: LeFort III 型骨折为上颌骨高位骨折或颅面分离骨折, 易伴有颅底骨折或颅脑损伤, 出现耳、鼻出血或脑脊液漏。

题型: A1 型选择题

题目:

颌骨骨折伴发脑脊液鼻漏时不应

选项:

- A. 应用抗生素
- B. 局部保持清洁
- C. 进行鼻腔冲洗, 协助引流
- D. 观察脑脊液量及色泽
- E. 脑脊液停止一定时间后处理颅骨骨折

答案: C

解析: 颌骨骨折伴发脑脊液鼻漏进行鼻腔冲洗, 协助引流易引发颅内感染。

题型: A1 型选择题

题目:

唇、舌、耳、鼻及眼睑断裂伤, 离体组织尚完好, 应尽量将离体组织缝回原处, 但一般不宜超过

选项:

- A. 1 h
- B. 2 h
- C. 4 h
- D. 6 h
- E. 8 h

答案: D

解析: 游离的组织一般不应离体超过 6 h。

题型: A1 型选择题

题目:

①髁突; ②颞孔; ③正中联合部; ④下颌角; ⑤下颌升支。下颌骨骨折多发的位置是

选项:

- A. ①③④
- B. ①②③
- C. ③④
- D. ①②③④

E.①②③④⑤

答案：D

解析：髁突、颞孔、正中联合部、下颌角都为下颌骨较薄弱的部位，受外力时骨折的多发部位也位于这些部位。

题型：A1 型选择题

题目：

牙槽突骨折牙弓夹板和正畸托槽应跨过骨折线的牙位数至少为

选项：

A.1 个

B.2 个

C.3 个

D.4 个

E.5 个

答案：C

解析：必须跨过至少 3 个牙位方可固定牙槽突骨折。

题型：A1 型选择题

题目：

关于接触式桥体的描述错误的是

选项：

A.自洁作用好

B.美观

C.有利于发音

D.对牙槽嵴黏膜有生理性按摩作用

E.可加速牙槽骨的吸收

答案：E

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

影响冠修复体粘着力大小的因素不包括

选项：

A.粘着力与粘固剂的厚度成正比

B.粘着力与粘着面积成正比

C.粘固剂过稀影响粘着力

D.粘固剂过稠影响粘着力

E.粘着面上有水分影响粘着力

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

设计修复体龈缘的位置时不必考虑



选项:

- A.患牙的形态
- B.修复体的固位
- C.患牙的牙周状况
- D.患者的口腔卫生状况
- E.咬合力的大小

答案: E

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

牙体修复预备过程中适当的预防性扩展的主要目的是

选项:

- A.自洁和防止继发龋
- B.提供良好的固位形和抗力形
- C.去除龋坏牙体组织
- D.增进修复体的美学效果
- E.促进牙周组织的健康

答案: A

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

以下哪项不是固定义齿的优点

选项:

- A.固位作用好
- B.咀嚼效能高
- C.磨切牙体组织少
- D.近似真牙
- E.异物感小

答案: C

解析:

题型: A1 型选择题

题目:

铸造金属全冠颈部肩台的宽度通常为

选项:

- A.0.3~0.4 mm
- B.0.5~0.8 mm
- C.0.9~1.0 mm
- D.1.1~1.2 mm
- E.1.3~1.5 mm

答案: B

解析: 无

题型：A1 型选择题

题目：

金属烤瓷冠的制作，错误的说法是

选项：

- A.全冠舌侧颈缘全用金属
- B.金瓷结合处应避免咬合功能区
- C.金瓷结合处呈斜面搭接
- D.瓷覆盖区底层冠厚度至少 0.5 mm
- E.瓷覆盖区瓷层空间不超过 2 mm

答案：C

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

对烤瓷合金的性能要求，不正确的是

选项：

- A.弹性模量低
- B.机械强度高
- C.铸造性能好
- D.收缩变形小
- E.湿润性好

答案：A

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

不能消除可摘局部义齿翘动的是

选项：

- A.增加间接固位体
- B.增大平衡距
- C.增大游离距
- D.增加基托面积
- E.骨突处基托组织面缓冲

答案：C

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

下列关于整体铸造支架式义齿的评价中错误的是

选项：

- A.坚固耐用，不易折裂
- B.体积明显减小，戴用舒适
- C.温度传导差

D.修理与增补人工牙困难

E.适应证较严格

答案：C

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

饮水加氟的适宜浓度是

选项：

A.0.3~0.5 mg/L

B.0.5~0.7 mg/L

C.0.7~1.0 mg/L

D.1.0~1.2 mg/L

E.1.2~1.5 mg/L

答案：C

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

不属于连接体的是

选项：

A.卡环与基托相连部分

B.卡环与舌杆相连部分

C.卡臂与支托相连部分

D.牙弓两侧鞍基相连部分

E.卡环与金属网状结构相连部分

答案：C

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

决定可摘局部义齿基托伸展范围的是

选项：

A.基托的种类

B.人工牙的种类

C.黏膜的厚度

D.力的大小

E.缺失牙的时间

答案：D

解析：无

题型：A1 型选择题

题目：

患者女,25 岁。妊娠 3 个月。因牙龈红肿出血就诊。口腔检查发现 DI-S 为 2,CI-S 为 0,GI 为

1.余未见异常。对该患者正确的处理措施是

选项:

- A.口腔含漱剂含漱
- B.口服消炎药物
- C.口腔卫生指导
- D.龈上洁治术
- E.龈下刮治术

答案: C

解析: 无

题型: A1 型选择题

题目:

患者男, 25 岁。口腔内上下前牙龈乳头消失, 并凹陷, 呈反波浪形, 牙间乳头颊舌侧分离, 可从牙面翻开, 下方有牙石, 血象正常, 无坏死。可能的原因是

选项:

- A.疱疹性龈炎
- B.中性粒细胞缺乏引起龈坏死
- C.慢性龈缘炎
- D.坏死性龈炎
- E.龈乳头炎

答案: D

解析: 坏死性龈炎的临床表现为牙间乳头严重破坏, 甚至消失, 乳头处的龈高度低于龈缘高度, 呈反波浪状, 牙间乳头处颊舌侧牙龈分离, 甚至从牙面翻开, 其下牙面上有牙石和软垢, 牙龈一般无坏死物, 因此 D 正确。疱疹性龈炎、中性粒细胞缺乏引起龈坏死、慢性龈缘炎都不局限于牙间乳头, 因此 A、B、C 错误。龈乳头炎表现为个别龈乳头的炎症, 因此 E 错误。本题选 D。

题型: A1 型选择题

题目:

男, 60 岁。行上颌结节注射麻醉后, 突然感到心悸、头晕、头痛、脉搏快而有力。血压升至 150 / 100 mmHg, 口唇苍白, 应考虑

选项:

- A.中毒
- B.晕厥
- C.癡症
- D.过敏
- E.肾上腺素反应

答案: E

解析: 肾上腺素反应的症状是头昏头痛, 口唇苍白, 血压升高, 脉搏快而有力。

题型: A1 型选择题

题目:

男性, 60 岁。右下后牙残冠行局麻下拔除术。在局麻药注射中突然出现头晕、胸闷、面色苍白、全身冷汗、恶心、呼吸困难, 诊断为晕厥。应采取的措施是

选项:

- A.立即停止注射
- B.放平椅位, 置患者于头低位
- C.松解衣领, 保持呼吸道通畅
- D.氧气吸入, 静脉注射高渗葡萄糖
- E.以上均是

答案: E

解析: 晕厥的处理办法: 立即停止注射, 迅速放平座椅, 置病员于头低位; 松解衣领, 保持呼吸道通畅; 芳香氨酒精或氨水刺激呼吸, 针刺人中穴, 氧气吸入和静脉注射高渗葡萄糖液。

题型: A1 型选择题

题目:

一男性患者欲拔除左上颌第一磨牙, 病史叙述中知其患有甲状腺功能亢进 4 年余。查体: 其静息脉搏为 90 次 / 分, 基础代谢率为 +16%, 未见其他并发症发生。下列描述正确的是选项:

- A.为拔牙禁忌证
- B.为拔牙适应证, 但应注意减少对患者的精神刺激, 术后预防感染
- C.麻药中可以加少量的肾上腺素
- D.麻药可选择阿替卡因或甲哌卡因
- E.以上选项均不正确

答案: B

解析: 甲亢患者静息脉搏在 100 次/分以下, 基础代谢率在 +20% 以下可拔牙, 应尽量减少对病人的精神刺激, 麻药中不可加肾上腺素。

题型: A1 型选择题

题目:

25 岁, 初孕, 妊娠第 8 周牙痛。检查: 右下 6 牙体破坏大, 需拔除, 消炎后拔除的时间应为

选项:

- A.1 周内
- B.1 周后
- C.2 周后
- D.3 周后
- E.4 周后

答案: E

解析: 妊娠期拔牙应尽量选择在第 4-6 月。

题型: A1 型选择题

题目:

男性, 70 岁。余留牙影响义齿修复求拔除。患者曾患过脑栓塞, 长期服用阿司匹林。为防止拔牙术后出血应查

选项:

- A.X 线片检查
- B.血常规检查

- C.血小板计数
- D.凝血酶原时间
- E.心电图检查

答案：D

解析：长期服用阿司匹林等有抗凝血效果的药物，为防止拔牙后出血应查凝血酶原时间。

题型：A1型选择题

题目：

男性，40岁。诉左下颌后牙有洞1年求补。无明显自觉症状，患者1周前刚完成肿瘤放疗疗程。口腔检查：左下6残冠，已穿髓底，无法牙体修复，建议拔除。拔牙时机应选择

- 选项：
- A.半年后
- B.1年后
- C.2年后
- D.3个月后
- E.3年后

答案：E

解析：一般认为放疗后3-5年内不应拔牙。

题型：A1型选择题

题目：

患者女性，56岁，右上第二磨牙疼痛半个月，糖尿病6年，服药控制血糖在5.96 mmol/L，要求拔牙此时应进行治疗的方案是

- 选项：
- A.局部冲洗上药
- B.口服抗生素
- C.拔牙+抗生素
- D.暂缓拔牙
- E.抗生素+上药

答案：C

解析：糖尿病患者血糖控制在空腹8.88 mmol/L (160 mg/dl) 以内可拔牙，但应预防感染，术前术后使用抗生素。

题型：A1型选择题

题目：

患者，女性，65岁，有右上第一恒磨牙残根，高血压病8年余，未规律用药，测血压160/110 mmHg。正确的处理方法是

- 选项：
- A.内科治疗高血压后再考虑拔除右上第一恒磨牙
- B.2%普鲁卡因加肾上腺素局麻下拔除右上第一恒磨牙
- C.2%利多卡因局麻下拔除右上第一恒磨牙
- D.口服安定半小时后拔除右上第一恒磨牙
- E.口服复方降压片半小时后拔除右上第一恒磨牙

答案：A

解析：高血压患者血压低于 24 / 13.3 kPa (180 / 100 mmHg) 时方可拔牙，否则应经内科治疗高血压后再考虑拔牙。

题型：A1 型选择题

题目：

男性，70 岁。诉全口余留牙松动求治。患者无明显的全身系统性疾病。口腔检查：全口余留牙左下 1 右下 12345，松动 I°~ II°，拟一次拔除。正确的拔牙顺序是

选项：

- A.先拔除左下 1
- B.先拔除右下 1
- C.先拔除右下 3
- D.先拔除右下 4
- E.从右下 5 开始由右向左顺序拔除

答案：E

解析：由内向外，利于操作，也防止感染。

题型：A1 型选择题

题目：

患者女，16 岁。发现右下颌骨逐渐膨大 8 年，近年来增大速度减慢。检查发现下颌骨体部弥漫性膨大，以颊侧更明显，质硬。X 线片示右下颌骨体部成磨砂玻璃样，与骨皮质相移行。术后病理检查发现纤维组织代替正常骨组织，其中有较多的纤细小梁。诊断为

选项：

- A.牙骨质化纤维瘤
- B.骨化性纤维瘤
- C.骨纤维异常增殖症
- D.巨颌症
- E.牙源性纤维瘤

答案：C

解析：磨砂玻璃样是骨纤维异常增殖症的重要特征。

题型：A1 型选择题

题目：

患者男，外伤昏迷后一度意识清醒好转，随后又转入嗜睡，昏迷，伤侧瞳孔散大，对光反射消失，呼吸脉搏变慢，血压升高，应考虑为

选项：

- A.失血过多
- B.电解质紊乱
- C.硬脑膜外血肿
- D.休克
- E.以上都不是

答案：C

解析：以上是硬脑膜外血肿的临床表现，应立即采取措施抢救。

题型：A1 型选择题

题目：

患者女，43岁。因开口严重受限3个月就诊，临床检查开口度10mm，无明显疼痛，无弹响和杂音，右侧升颌肌群发硬有压痛，听诊器可听到肌杂音。最可能的诊断是

选项：

- A.右侧翼外肌亢进
- B.右侧翼外肌痉挛
- C.右侧咀嚼肌群痉挛
- D.右侧肌筋膜炎
- E.右颞下颌关节炎性疾病类

答案：C

解析：无

题型：A1型选择题

题目：

患者女，18岁。因下颌前牙拥挤到医院就诊。曲面体层片示上、下颌牙列完整，全口牙未见明显的龋病，根尖周骨质良好，但在右侧下颌体部见一边缘清楚的圆形致密影，直径约0.3cm×0.3cm，与牙根无关，患者亦无疼痛不适的症状。则该致密影最可能的诊断是

选项：

- A.牙瘤
- B.致密骨岛
- C.埋伏多生牙
- D.良性成牙骨质细胞瘤
- E.牙胚

答案：B

解析：牙瘤、埋伏多生牙、牙胚的周围均有包膜显示为低密度的线条影；良性成牙骨质细胞瘤表现为同牙根相连的高密度团块影像，边界清楚，周围有低密度的光环征，题中的描述与这些特点不相符。致密骨岛为边缘清楚的圆形致密影，且与牙根无关。因此，B为正确答案。

题型：A1型选择题

题目：

患者男性，42岁，残根需拔除，X线片显示其腭侧根与上颌窦底影像重叠，判断牙根是否位于上颌窦内的征象为

选项：

- A.根尖周是否密度减低
- B.牙周膜与骨硬板是否连续
- C.上颌窦底是否突入牙根之间
- D.上颌窦是否过大
- E.垂直角度是否过大

答案：B

解析：无

题型：A1型选择题

题目：

男性患者，58岁，晨起喝水时左侧口角漏水，照镜子发现左口角下垂，左眼不能完全闭合，



遂来我院就诊。门诊除以上症状外，还发现左侧舌、颊及口底黏膜较对侧显无光泽、干燥，同侧舌前 2 / 3 味觉迟钝，听力检查明显较右侧差。对于该患者目前最恰当的治疗应选择选项：

- A.立即行面神经管减压术
- B.大剂量激素+抗病毒药+神经营养药
- C.尽快给予强电流刺激以促进肌肉运动
- D.大剂量激素+肌肉兴奋剂
- E.阿司匹林+神经营养药

答案： B

解析： 面瘫急性期治疗：糖皮质激素+抗病毒药+神经营养药。阿司匹林是解热镇痛药。

题型： A1 型选择题

题目：

女，34 岁。右侧眉因外伤缺失。拟采用皮肤移植方法进行眉再造手术。应选用的是选项：

- A.表层皮片
- B.薄中厚皮片
- C.厚中厚皮片
- D.全厚皮片
- E.轴型皮瓣

答案： D

解析： 无

题型： A3/A4 型选择题

题目：

患者，男，24 岁，上唇部肿胀疼痛 3 天，伴发热。体温 38.5℃，上唇肿胀明显、紫红色，可见多个黄白色脓头。

选项：

子题：

此病可诊断为

选项：

- A.上唇脓肿
- B.下唇疔
- C.上唇疔
- D.上唇皮脂腺继肿继发感染
- E.以上都不是

答案： C

解析： 无

子题：

此部位感染最常见的致病菌为

选项：

- A.铜绿假单胞菌
- B.大肠杆菌

- C.金黄色葡萄球菌
- D.变形杆菌
- E.白色念珠菌

答案： C

解析： 无

子题：

此部位感染易引起海绵窦化脓性血栓性静脉炎可能的原因不包括

选项：

- A.血运丰富
- B.面静脉无静脉瓣
- C.上唇运动较多
- D.细菌毒力强
- E.局部皮脂腺丰富

答案： B

解析： 无

子题：

此患者的治疗方案中，哪项是错误的

选项：

- A.局部高渗盐水持续湿敷
- B.全身运用抗生素
- C.加强营养，增强抵抗力
- D.唇部减少活动
- E.早期挑破或切开引流

答案： E

解析： 无

题型： A3/A4 型选择题

题目：

患者，男，26岁，因交通事故造成面部外伤而来诊。检查见耳、鼻出血，并证实有脑脊液鼻漏，面部两侧不对称，右侧眶下区肿胀，右下眼睑肿胀、淤血，右侧上颌骨下垂，后牙早接触。

子题：

应选用以下哪项X线检查

选项：

- A.华特位片
- B.颧弓位片
- C.上颌前部横断片
- D.许勒位片
- E.上颌正位体层片

答案： A

解析： 无

子题:

如X线片显示右侧上颌骨骨折,骨折线横过鼻根、眶部,经颧额缝达翼突。正确的诊断是  
选项:

- A. LeFort I 型骨折
- B. LeFort II 型骨折
- C. LeFort III 型骨折
- D. 鼻骨骨折
- E. 颧弓骨折

答案: C

解析: 无

子题:

如X线片显示右侧上颌骨骨折,骨折线自鼻额缝向两侧横过鼻梁、眶内侧壁、眶底,经颧上颌缝达翼突。正确的诊断是

选项:

- A. LeFort I 型骨折
- B. LeFort II 型骨折
- C. LeFort III 型骨折
- D. 鼻骨骨折
- E. 颧弓骨折

答案: B

解析: 无

子题:

以下各项处理措施中,哪项是错误的

选项:

- A. 抗生素点鼻
- B. 鼻腔填塞止血
- C. 耳鼻应经常消毒,保持干净
- D. 防止咳嗽和打喷嚏
- E. 用抗生素预防感染

答案: B

解析: 无

子题:

对于该患者应采取的初步救治措施是

选项:

- A. 气管切开, 输液
- B. 立即行切开复位内固定术
- C. 立即行颌间结扎, 颅颌绷带固定
- D. 消毒棉填塞鼻腔及外耳道, 上颌骨暂时悬挂固定
- E. 暂时作颅上颌固定, 补液, 对症处理并密切观察

答案: E

解析：无

题型：B1 型选择题

题目：

- A.口腔问卷调查
- B.口腔健康调查
- C.口腔健康咨询
- D.口腔保健规划
- E.口腔预防保健措施

子题：

在新社区开展口腔卫生保健工作，首先要制定

选项：

答案：D

解析：无

子题：

了解社区人群口腔健康知识、态度和行为状况要进行

选项：

答案：A

解析：无

子题：

开展爱牙日活动最常采用的形式是

选项：

答案：C

解析：无

题型：B1 型选择题

题目：

- A.氧化锌
- B.复合树脂
- C.氢氧化钙
- D.牙胶
- E.磷酸锌粘固粉

子题：

常用的后牙充填材料是

选项：

答案：B

解析：无

子题：

常见的垫底材料是

选项:

答案: E

解析: 无

题型: B1 型选择题

题目:

- A.冷刺激一过性痛
- B.温度刺激迟缓性痛
- C.自发性阵发痛
- D.自发性持续胀痛
- E.疼痛有“扳机点”

子题:

可复性牙髓炎

选项:

答案: A

解析: 无

子题:

龈乳头炎

选项:

答案: D

解析: 无

子题:

急性牙髓炎

选项:

答案: C

解析: 可复性牙髓炎受冷刺激过后会一过性痛, 故选 A。急性牙髓炎有自发性阵发痛, 不定位疼痛, 故选 C。龈乳头炎有自发性持续胀痛, 故选 D。慢性牙髓炎有温度刺激迟缓性痛。疼痛有“扳机点”是三叉神经痛的疼痛特点。