

1、慢性肾小球肾炎发病的起始因素为

- A、急性肾小球肾炎迁延不愈所致
- B、细菌感染所致
- C、病毒感染所致
- D、免疫介导炎症
- E、遗传因素

答案: D

解析: 慢性肾小球肾炎发病的起始因素是免疫介导炎症, 多数病例肾小球内有免疫复合物沉积。(此题为扩充内容)

2、导致人体自卫功能不良而易发生肾盂肾炎最主要的易感因素是

- A、尿流不畅和尿路梗阻
- B、尿路畸形
- C、机体免疫功能低下
- D、尿道口炎症病变
- E、尿路功能缺陷

答案: A

解析: 尿流不畅和尿路梗阻, 是最主要的易感因素。此外, 肾小管和集合管内有结晶(如高尿酸血症)等沉积时, 细菌容易在肾内停留、生长、繁殖而感染。

3、急性肾小球肾炎属于下列哪种性质的疾病

- A、感染后免疫反应性疾病
- B、病毒直接感染肾脏
- C、细菌直接感染肾脏
- D、单侧肾脏化脓性炎症
- E、双侧肾脏化脓性炎症

答案: A

解析: 急性肾小球肾炎常因 $\beta$ 溶血性链球菌“致肾炎菌株”感染所致, 常见于上呼吸道感染(如急性扁桃体炎、咽炎)、猩红热或皮肤感染(脓疱疮)后, 感染导致机体产生免疫反应而引起双侧肾脏弥漫性的炎症反应。

4、肾病综合征治疗下列哪项不妥当

- A、应用阿司匹林
- B、必要时补充人体清蛋白
- C、用激素治疗 4 周无效加用环磷酰胺
- D、用激素治疗, 尿蛋白减少立即减量
- E、必要时应用环孢菌素 A

答案: D

解析: 激素治疗, 糖皮质激素应用一定要遵从下列用药原则: ①起始用量要足。②减撤药物要慢。③维持用药要久, 服半年至 1 年或更久。

5、护士夜间巡视病房, 发现尿毒症病人烦躁不安, 主诉胸闷、心悸、咳嗽、咳白色泡沫样痰。体检双肺底有湿啰音, 可考虑

- A、尿毒症性肺炎
- B、尿毒症性胸膜炎
- C、尿毒症性心包炎

D、尿毒症引起的心力衰竭

E、尿毒症所致心律失常

金英杰酱酱

答案: D

解析: 本题考查尿毒症的临床表现。尿毒症的心血管并发症有心力衰竭、心律失常、心包炎等。该患者夜间睡眠中出现胸闷、憋气、咳嗽、咳白色泡沫样痰,查体发现双肺底有湿啰音,提示出现急性左心衰竭。

6、慢性肾小球肾炎治疗的主要目的为

- A、消除蛋白尿
- B、消除血尿
- C、防止或延缓肾功能进行性减退
- D、改善消化道症状
- E、消除水肿

答案: C

解析: 慢性肾小球肾炎治疗的主要目的是防止或延缓肾功能进行性减退,改善或缓解临床症状及防治严重合并症为目的,而不以消除尿红细胞或轻微蛋白尿为目标。

7、腹膜透析期间,提示并发腹膜炎的表现是

- A、漏出液减少
- B、漏出液混浊
- C、漏出液呈红色
- D、插管部位皮肤发红
- E、出现恶心、呕吐

答案: B

解析: 腹膜炎是腹透的主要并发症,表现为腹痛、寒战、发热,腹部压痛、反跳痛,透析液混浊。

8、血液透析患者最常见的并发症是

- A、出血
- B、致热原反应
- C、低血压
- D、失衡综合征
- E、过敏反应

答案: C

解析: 本题考查血液透析的常见并发症。选项均为血液透析的并发症,其中最常见的是低血压。

9、慢性肾衰竭患者需严格记录出入液量是因为患者有

- A、脱水
- B、水肿
- C、脱水或水肿
- D、低钾血症
- E、低钠血症

答案: C

解析: 肾衰可引起水电解质和酸碱平衡失调,出现水肿或脱水时需记录出入量。

10、护理少尿与无尿患者,最重要的措施是

- A、卧床休息
- B、预防感染
- C、保证饮食总热量

D、限制蛋白质的摄入

E、严格控制水、钠摄入

答案: E

解析: 护理少尿与无尿患者, 最重要的措施是严格控制水、钠摄入。

