

2021年 中 西 医 助 理 医 师 考 试

模拟密押卷

**2021年
中 西 医 助 理 医 师
资 格 考 试
专 用 试 卷**

第一单元

1、在脾胃的相互关系中，最根本的是

- A、脾主升清，胃主降浊
- B、胃主纳谷，脾主磨谷
- C、脾燥胃湿，燥湿相济
- D、胃为水谷之海，脾为胃行其津液
- E、太阴湿土得阳始运，阳明燥土得阴自安

2、肾在志为

- A、喜
- B、思
- C、悲
- D、恐
- E、怒

3、热者寒之属于

- A、正治、逆治
- B、反治、从治
- C、正治、从治
- D、反治、逆治
- E、标本同治

4、五脏六腑的病理特点及治疗原则是

- A、脏病多虚，五脏宜补
- B、脏病多实，五脏宜泻
- C、腑病多虚，六腑宜泻
- D、腑病多实，六腑宜补
- E、脏病多实，五脏宜补

5、肝之华在

- A、面
- B、毛
- C、唇
- D、爪
- E、发

6、以下瘀血的致病特点不正确的是

- A、易于阻滞气机
- B、影响血脉运行
- C、为阴邪，易伤阳气
- D、影响新血生成
- E、病位固定，病证繁多

7、《内经》将人体的思维活动概括为

- A、意志思虑智
- B、怒忧思悲恐
- C、意志魂虑智
- D、意神思虑智
- E、神魂魄意志

8、来源于脾胃所化生的水谷之精微的是

- A、营气和元气
- B、卫气和宗气
- C、宗气和元气
- D、卫气和营气
- E、宗气和营气

9、在十二经脉走向中，足之三阴是

- A、从足走头
- B、从手走头
- C、从脏走手
- D、从头走足

E、从足走腹

10、寒者热之所体现的阴阳关系是

A、阴阳交感

B、阴阳互根

C、阴阳对立

D、阴阳消长

E、阴阳转化

11、肾精所化生的液是

A、泪

B、汗

C、涎

D、涕

E、唾

12、产后大出血，继则冷汗淋漓，甚则晕厥，其病机是

A、气不摄血

B、气随血脱

C、气血两虚

D、气血失和

E、气滞血瘀

13、不属于脾虚气陷证临床表现的是

A、久泄不止

B、肛门重坠

C、便意频数

D、子宫下垂

E、四肢不温

14、“阴阳离决，精气乃绝”所反映的阴阳关系是（ ）

A. 对立制约

B. 互根互用

C. 相互交感

D. 消长平衡

E. 相互转化

15、寒湿困脾证与湿热蕴脾证均有的表现是

A、身热不扬

B、脘腹痞闷

C、面黄不泽

D、口渴喜饮

E、白带量多

16、脉短如豆，滑数有力的是

A、疾脉

B、促脉

C、实脉

D、动脉

E、短脉

17、属于正常人从出生至死一生基本不变的面色是

A、主色

B、客色

C、善色

D、恶色

E、病色

18、寒痰的咳痰特点是

A、咳吐脓血腥臭痰

B、痰中带血，色鲜红

C、痰少而黏，难于咯出

D、痰白而清稀，有灰黑点

E、痰白滑而量多，易咯出者

19、口之形态中口撮可见于

- A、痲病
- B、中风
- C、疟疾发作
- D、小儿脐风
- E、以上都不是

20、形瘦多食者，多属于

- A、中气虚弱
- B、中焦有火
- C、阴虚不足
- D、阳气不足
- E、痰湿内盛

21、下列各项中，不属于引起舌象生理变异的因素是

- A、年龄因素的影响
- B、地域因素的影响
- C、女性生理特点的影响
- D、禀赋体质因素的影响
- E、气候、环境因素的影响

22、身重兼脘闷苔腻者，多因

- A、湿困脾阳
- B、水湿泛溢
- C、脾气虚
- D、脾肾阳虚
- E、食滞胃脘

23、饥不欲食兼见胃中有嘈杂、灼热感，舌红少苔，脉细数者多见于

- A、胃强脾弱
- B、脾胃湿热

- C、胃阴不足
- D、肝胃蕴热
- E、胃火亢盛

24、下列属于阳证的是

- A、食少乏味
- B、倦怠无力
- C、身体蜷卧
- D、呼吸怯弱
- E、小便短赤涩痛

25、柴胡与升麻均具有的功效是

- A、解表生津
- B、清热解毒
- C、疏肝解郁
- D、透发麻疹
- E、升阳举陷

26、内服清热泻火，除烦止渴，火煨外用敛疮生肌、收湿、止血的药物是

- A、知母
- B、栀子
- C、石膏
- D、芦根
- E、竹叶

27、凉血不留瘀，活血不动血，又能退无汗骨蒸的药物是

- A、赤芍
- B、白薇
- C、生地黄
- D、牡丹皮
- E、郁金

28、用大黄泻下攻积，最恰当的用法

是

- A、酒炒后下
- B、醋炒先煎
- C、炒炭研末服
- D、生用后下
- E、生用先煎

29、下列各项，不属主治风湿热痹的药物的是

- A、黄柏、木瓜
- B、木通、防己
- C、独活、威灵仙
- D、白鲜皮、薏苡仁
- E、连翘、络石藤

30、性微温而善于芳香化湿解暑的药物是

- A、香薷
- B、佩兰
- C、砂仁
- D、豆蔻
- E、藿香

31、治疗暑湿泄泻，利小便以实大便，应选用的药物是

- A、木通
- B、车前子
- C、茯苓
- D、茵陈
- E、石韦

32、能行气化痰消痞，破气除满止痛的药物是

- A、陈皮
- B、青皮
- C、佛手
- D、枳实
- E、木香

33、被称为“回阳救逆第一品药”的药物是

- A、人参
- B、肉桂
- C、鹿茸
- D、附子
- E、干姜

34、具有凉血功效的药物是

- A. 石膏
- B. 知母
- C. 芦根
- D. 天花粉
- E. 栀子

35、参苓白术散的功用是

- A、健脾益气，和中养胃
- B、健脾益气，渗湿止泻
- C、健脾益气，升阳举陷
- D、健脾养胃，理气化痰
- E、健脾助运，养胃渗湿

36、牡蛎散中功专收敛止汗的药物是

- A、煅牡蛎
- B、麻黄根
- C、生黄芪
- D、小麦
- E、白术

37、半夏泻心汤适用于

- A、脾胃虚弱，寒热错杂。症见脘腹痞胀，恶食懒倦，大便不畅者
- B、脾胃虚弱，寒热错杂。症见心下痞满，但满不痛，呕吐下利者
- C、脾胃虚弱，水热互结。症见心下硬满，干噎食臭，肠鸣下利者
- D、脾胃虚弱，痰浊内阻。症见心下痞硬，噎气不除，苔腻脉滑者
- E、胃虚有热，和降失常。症见心胸烦闷，气逆欲呕，口干喜饮

38、苏合香丸主治

- A、心绞痛属痰浊气滞血瘀者
- B、寒闭证
- C、暑秽
- D、热闭证
- E、痰热内闭心包证

39、以降逆化痰、益气和胃为主要功用的方剂是

- A、半夏厚朴汤
- B、半夏泻心汤
- C、丁香柿蒂汤
- D、旋覆代赭汤
- E、橘皮竹茹汤

40、生化汤重用全当归为君，意在

- A、养血补肝
- B、养血滋阴
- C、养血润肠
- D、化瘀生新

E、和血止痛

41、以养阴透热为主要功用的方剂是

- A、清胃散
- B、犀角地黄汤
- C、竹叶石膏汤
- D、青蒿鳖甲汤
- E、清营汤

42、乌梅丸重用乌梅的作用是

- A、敛肺止咳
- B、敛阴止汗
- C、涩精止遗
- D、固精缩尿
- E、涩肠止泻

43、和解少阳的代表方剂是

- A、四逆散
- B、逍遥散
- C、小柴胡汤
- D、大柴胡汤
- E、半夏泻心汤

44、导赤散主治心经有热之证，属于下列何种情况者为宜

- A. 气火内郁，暗耗阴血，虚热上炎者
- B. 气郁化火，心火内炽，循经上炎者
- C. 气郁化火，炼液为痰，痰火内扰者
- D. 心火上炎，或下移小肠，水虚火不实者
- E. 心火亢盛，烦热谵语，口舌生疮，邪实而正不虚者

45、上消化道出血患者的粪便性状是

- A. 经络痹阻

B. 结石阻滞

C. 肝肾阴虚

D. 湿寒阻滞

E. 瘀血阻络

46、代谢性酸中毒可出现

A. 潮式呼吸

B. 库斯莫尔呼吸

C. 间停呼吸

D. 夜间阵发性呼吸困难

E. 吸气性呼吸困难

47、肝区病变出现腹痛的特点是

A. 突发中上腹剧烈刀割样持续性疼痛

B. 持续性、广泛性剧烈腹痛伴腹肌紧张

C. 右上腹进行性锐痛

D. 剑突下钻顶样疼痛

E. 右上腹阵发性绞痛

48、抽搐不伴有意识障碍最可能的原因是

A. 急性脑血管病

B. 脑外伤

C. 癫痫

D. 癔病

E. 小儿高热惊厥

49、下列除哪项外，均可见胸痛

A. 带状疱疹

B. 肺癌

C. 气胸

D. 心包炎

E. 哮喘

50、病史中，不属主要症状特点的内容是

A. 部位

B. 程度

C. 诊治经过

D. 性质

E. 持续时间

51、下列各项中，叩诊不会出现浊音的是

A. 肺不张

B. 肺空洞

C. 胸腔积液

D. 胸膜肥厚粘连

E. 未液化的肺脓肿

52、可出现强迫蹲位的疾病是

A. 急性腹膜炎

B. 先天性发绀型心脏病

C. 心绞痛

D. 破伤风

E. 急性肺水肿

53、下列关于甲状腺检查说法错误的是

A. 甲状腺肿大 II 度，能看到肿大，又能触及，但不超过胸锁乳突肌

B. 甲状腺肿大常可听到低调的连续性血管杂音

C. 甲亢时肿大的甲状腺质地多较柔软

D. 甲状腺癌时，包块有结节感、不规则、质硬

E. 甲状腺癌触诊时可摸到颈总动脉搏动

54、肠套叠可见腹痛，并伴有

A. 急性发热

B. 黄疸

C. 呕吐

D. 腹泻

E. 血便

55、十二经脉中，相表里的阴经和阳经的交接部位

A. 胸腹部

B. 胸部

C. 腹部

D. 指（趾）内侧端

E. 四肢内侧

56、外邪由皮毛传入脏腑的途径，依次是

A. 络脉——孙脉——经脉

B. 孙脉——经脉——络脉

C. 经脉——孙脉——络脉

D. 络脉——经脉——孙脉

E. 孙脉——络脉——经脉

57、在八脉交会穴中，通任脉的是

A. 足临泣

B. 公孙

C. 后溪

D. 照海

E. 列缺

58、在特定穴中，原穴主要用于治疗

A. 五脏病证

B. 六腑病证

C. 五脏六腑病证

D. 急性病证

E. 表里经脉病证

59、耻骨联合上缘至股骨内上髁上缘的骨度分寸是

A. 18 寸

B. 19 寸

C. 20 寸

D. 21 寸

E. 22 寸

60、下列腧穴中，归经错误的是

A. 合谷——大肠经

B. 太溪——肝经

C. 列缺——肺经

D. 阳陵泉——胆经

E. 阴陵泉——脾经

61、下列哪个腧穴是足阳明胃经的原穴

A. 冲阳

B. 内庭

C. 厉兑

D. 解溪

E. 足三里

62、太阴脾经的穴位是

A. 气冲

- B. 大横
- C. 期门
- D. 梁门
- E. 章门

63、手少阴心经的络穴是

- A. 少海
- B. 神门
- C. 阴郄
- D. 通里
- E. 灵道

64、当第 9 胸椎棘突下，旁开 1.5 寸的穴位是

- A. 膈俞
- B. 脾俞
- C. 胆俞
- D. 胃俞
- E. 肝俞

65、毛果芸香碱的主要适应证是

- A. 青光眼
- B. 角膜炎
- C. 结膜炎
- D. 视神经水肿
- E. 晶状体混浊

66、有机磷杀虫药中毒的主要机制

- A. 促使乙酰胆碱水解
- B. 抑制心血管运动中枢
- C. 兴奋交感神经系统
- D. 抑制胆碱酯酶活性
- E. 抑制呼吸中枢

67、山莨菪碱适于治疗的疾病是

- A. 青光眼
- B. 晕动病
- C. 感染中毒性休克
- D. 麻醉前给药
- E. 震颤麻痹

68、主要兴奋 β 受体的拟肾上腺素药是

- A. 去甲肾上腺素
- B. 肾上腺素
- C. 间羟胺
- D. 异丙肾上腺素
- E. 多巴胺

69、安定具有下述哪种作用

- A. 降血压
- B. 中枢性肌松
- C. 镇痛
- D. 镇吐
- E. 利尿

70、苯巴比妥用于消除下列哪种之外的各型癫痫

- A. 强直阵挛发作
- B. 肌阵挛性发作
- C. 失神小发作
- D. 强直发作
- E. 失张力发作

71、用于人工冬眠的药物是

- A. 吗啡
- B. 丙咪嗪

C. 氯丙嗪

D. 苯海索

E. 左旋多巴

72、卡比多巴与左旋多巴合用的机制是

A. 增强左旋多巴的疗效，减轻其外周副作用

B. 卡比多巴直接激动多巴胺受体，增强左旋多巴疗效

C. 抑制多巴胺的再摄取，增强左旋多巴的疗效

D. 卡比多巴阻断胆碱受体，增强左旋多巴疗效

E. 减慢左旋多巴由肾脏排泄，增强左旋多巴的疗效

73、成瘾性最小的镇痛药是

A. 吗啡

B. 芬太尼

C. 哌替啶

D. 喷他佐辛

E. 美沙酮

74、阿司匹林的作用是

A、抗炎、免疫抑制

B、镇痛、镇静

C、镇痛、抗炎

D、解热、镇静

E、抗炎、抗休克

75、病原体侵入人体后能否引起疾病，主要取决于

A. 机体的保护性免疫

B. 机体的天然屏障作用

C. 病原体的毒力与数量

D. 病原体的侵入途径与特异性定位

E. 病原体的致病力与机体的免疫功能

76、属 DNA 病毒的是

A. 甲型肝炎病毒

B. 乙型肝炎病毒

C. 丙型肝炎病毒

D. 丁型肝炎病毒

E. 戊型肝炎病毒

77、普通型流脑临床特征性体征是皮肤

A. 瘀点或瘀斑

B. 水疱

C. 黑痂

D. 斑丘疹

E. 脓肿

78、下列各项，不属医院感染的是

A、无明显潜伏期的感染，在入院 48 小时后发生的感染

B、本次感染直接与上次住院有关

C、有明确潜伏期的感染，自入院时算起没有超过其平均潜伏期的感染

D、新生儿经产道时获得的感染

E、肿瘤患者住院化疗期间出现带状疱疹

79、有关流脑和乙脑鉴别最有意义的是

- A、外周血白细胞明显升高
B、脑膜刺激征明显
C、高热、头痛、呕吐、昏迷
D、皮肤瘀点瘀斑
E、发病季节
- 80、传染病的基本特征为
A、有传染性、免疫性和病原体
B、有传染性、流行性、地方性和季节性
C、有传染性、病原体、免疫性和流行性
D、有传染性、传播途径和传染源
E、有传染性、免疫性和流行性
- 81、关于布鲁菌病感染途径的描述，错误的是
A、经呼吸道吸入传播
B、经消化道食人传播
C、经体表皮皮肤黏膜接触传播
D、人与人之间相互传播
E、蚊虫叮咬传播
- 82、下列有关消毒方法的叙述，错误的是
A、微波消毒属灭菌法
B、异丙醇属中效消毒法
C、通风换气属低效消毒法
D、灭菌法可杀灭一切微生物
E、病原体及消毒方法相同，在不同的物品上消毒效果相同
- 83、下列有关中毒型菌痢脑型与乙脑

鉴别的叙述，最有意义的是

- A、起病急骤
B、呼吸衰竭
C、早期出现休克
D、高热、昏迷、抽搐
E、粪便常规检查有无白细胞
- 84、潜伏期是指
A、自病原体侵入机体至典型症状出现
B、自病原体侵入机体至排出体外
C、自病原体侵入机体至临床症状开始出现
D、自接触传染源至患者开始出现症状
E、自接触传染源至典型症状出现
- 85、正确处理医务人员关系的意义是
A、实现正确诊断、有效治疗
B、有利于提高医疗服务水平
C、取他人之长，补己之短
D、使医务人员之间相互尊重
E、互相监督，避免疏漏
- 86、1976年美国学者提出的医患关系基本模式是
A. 主动-被动型，互相-合作型，平等参与型
B. 主动-合作型，相互-指导型，共同参与型
C. 主动-配合型，指导-合作型，共同参与型
D. 主动-被动型，指导-合作型，共同参与型

E. 主动-被动型，共同参与型，父权主义型

87、生命质量的衡量标准不包括

- A. 个体生命健康程度
- B. 个体生命德才素质
- C. 个体生命优化条件
- D. 个体生命治愈希望
- E. 个体生命预期寿命

88、属于医学伦理学基本原则的

- A. 有利、公正
- B. 权利、义务
- C. 廉洁奉公
- D. 医乃仁术
- E. 等价交换

89、我国卫生法律是由哪一级机构制定和颁布的

- A. 卫生部
- B. 国务院
- C. 最高人民法院
- D. 全国人大及其常委会
- E. 地方人民政府

90、国家实行医师资格考试制度，目的是检查评价申请医师资格者是否具备

- A. 医学专业学历
- B. 取得医学专业技术职务的条件
- C. 从事医学专业教学、科研的资格
- D. 开办医疗机构的条件

E. 从事医学实践必须的基本专业知识与能力

二、A2 题型

91、患者突起胃脘疼痛，呕吐清涎，面色苍白，舌苔白润，脉沉紧，其临床意义是

- A. 表实寒证
- B. 表实热证
- C. 里实寒证
- D. 里虚寒证
- E. 里虚热证

92、患者消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蛔的临床意义是

- A. 太阳病证
- B. 阳明病证
- C. 少阳病证
- D. 少阴病证
- E. 厥阴病证

93、患者消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蛔的临床意义是

- A. 太阳病证
- B. 阳明病证
- C. 少阳病证
- D. 少阴病证
- E. 厥阴病证

94、患者舌短缩，色红绛而干的临床意义是

- A. 寒凝筋脉
- B. 气血俱虚

- C、痰湿内蕴
- D、热盛伤津
- E、动风先兆

95、患者，女，23岁。心烦失眠1个月。患者因最近与同事发生矛盾，心情烦躁，入夜难以入睡，自觉手足心发热，口干欲饮，但所饮不多，舌红苔薄而干，脉细数的临床意义是

- A、心阴虚证
- B、肝阴虚证
- C、心火上炎证
- D、肝火上炎证
- E、肝气郁结证

96、患者，女，17岁。因高考将至，过度紧张，而致心情烦躁，入夜难眠，口干多饮，舌红苔黄干，脉数的临床意义是

- A、心阴虚证
- B、肝阴虚证
- C、心血虚证
- D、心火亢盛证
- E、肝火上炎证

97、患者，男，49岁。小便开始或末尾尿液混浊，色如米泔，伴有小便不畅，舌质淡，苔薄黄，脉象弦滑。用药应首选的药物是

- A、木通
- B、茯苓
- C、萆薢

- D、车前子
- E、泽泻

98、者，男，42岁。胁肋胀痛，脘腹灼热疼痛，口苦，舌质红，脉弦数。

用药应首选的药物是

- A、木香
- B、香附
- C、乌药
- D、川楝子
- E、佛手

111、患者，男，41岁。午后呕吐2次，腹泻5次，经输液治疗后，夜间吐泻未作，天明前左腿抽筋2次，起床后仍感疼痛。用药应首选的药物是

- A、藿香
- B、佩兰
- C、木瓜
- D、石菖蒲
- E、苍术

99、患者，男，40岁。腰腿怕冷，痿软无力，伴有阳痿、早泄、尿频症状，舌淡苔白，脉沉迟少力。用药应首选

的药物是

- A、干姜
- B、细辛
- C、肉桂
- D、吴茱萸
- E、小茴香

100、患者，男，33岁，身热多汗，心

胸烦闷，气逆欲呕，口干喜饮，舌红少苔，脉虚数。治疗应首选

- A. 导赤散
- B. 凉膈散
- C. 生脉散
- D. 竹叶石膏汤
- E. 清暑益气汤

101、患者，女，58岁，恶寒蜷卧，四肢厥冷，吐泻腹痛，口不渴，神衰欲寐，脉沉微。治疗应首选

- A. 理中丸
- B. 肾气丸
- C. 四逆散
- D. 当归四逆汤
- E. 回阳救急汤

102、患者，女，37岁，症见眩晕，头痛，胸膈痞满，恶心呕吐，舌苔白腻，脉弦滑者，治宜选用

- A. 温胆汤
- B. 清气化痰丸
- C. 茯苓丸
- D. 半夏白术天麻汤
- E. 小陷胸汤

103、患者，女，33岁，恶寒发热，头痛，胸膈满闷，脘腹疼痛，恶心呕吐，善泄泻，舌苔白腻，应选用的治则是：

- A. 燥湿运脾，行气和胃
- B. 解表化湿，理气和中
- C. 清热，利湿，退黄

- D. 清热泻火，利水通淋
- E. 宣畅气机，清利湿热

104、患者，女，28岁，胆怯易惊，虚烦不宁，失眠多梦，或呕恶呃逆，或眩晕，或癫痫等，苔腻微黄，脉弦滑，治宜选用

- A. 温胆汤
- B. 清气化痰丸
- C. 茯苓丸
- D. 半夏白术天麻汤
- E. 小陷胸汤

105、患者，男，15岁，食少难消，脘腹痞满，大便溏薄，倦怠乏力，苔腻微黄，脉虚弱治宜选用

- A. 健脾丸
- B. 保和丸
- C. 四逆散
- D. 痛泻要方
- E. 葛根黄芩黄连汤

106、患者外感风寒湿邪，症见恶寒发热头痛，肌表无汗，肢体酸楚疼痛，口苦而渴者，治宜选用

- A. 参苏饮
- B. 败毒散
- C. 桂枝汤
- D. 小青龙汤
- E. 九味羌活汤

107、患者，女，31岁，两胁作痛，头痛目眩，月经不调，乳房作胀，神疲

食少，脉弦而虚者。治宜选用

- A、四逆散
- B、柴胡疏肝散
- C、逍遥散
- D、一贯煎
- E、痛泻要方

108、患者，中年男性。持续或间断咳血痰或少量咯血，最大可能是

- A. 肺炎
- B. 肺脓肿
- C. 肺气肿
- D. 肺癌
- E. 肺梗死

109、患者，男，30岁，食欲和记忆力减退，检查：眼睑苍白，血红细胞、白细胞和血小板均减少。应首先考虑的是

- A. 再生障碍性贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 溶血性贫血
- D. 失血性贫血
- E. 巨幼红细胞性贫血

110、患者，女，25岁。大咯血急诊入院，既往有反复咳嗽、大量脓痰及咯血病史。胸片示左下肺肺纹理增多、增粗、排列紊乱。诊断最可能的是

- A. 肺结核
- B. 肺炎
- C. 肺癌

- D. 支气管扩张
- E. 肺脓肿

111、患儿，男，10岁。皮肤黄染伴右上腹绞痛2天。实验室检查：尿胆红素(+)，尿胆原(-)。应首先考虑的是

- A. 蚕豆病
- B. 胃炎
- C. 胆道蛔虫症
- D. 急性病毒性肝炎
- E. 遗传性球形红细胞增多症

112、患者，男，32岁，牙痛剧烈，伴口臭，口渴，便秘，舌苔黄，脉洪。治疗应首选

- A. 风池
- B. 外关
- C. 足三里
- D. 风门
- E. 内庭

113、患者，男，48岁。大便出血，色鲜红，血量不等，有赘物垂于肛外。治疗应首选

- A. 承山
- B. 大肠俞
- C. 小肠俞
- D. 膈俞
- E. 血海

114、患者高血压史2年。平素心烦惊悸，健忘失眠。治疗应首选

- A. 合谷

- B. 间使
- C. 神门
- D. 内关
- E. 灵道

115、患者，女，68岁。因心力衰竭入院，拟用地高辛口服治疗，每日0.25mg。已知地高辛半衰期为36小时，达稳定的血药浓度约需

- A. 2~3天
- B. 6~7天
- C. 9~10天
- D. 12~14天
- E. 16~18天

116、患者，男，40岁。癫痫病史多年，今因癫痫持续状态被送入医院。应采取的治疗措施是

- A. 口服苯巴比妥
- B. 口服苯妥英钠
- C. 口服丙戊酸钠
- D. 静脉注射安定、地西洋
- E. 肌肉注射氯丙嗪

117、患者，男，62岁。患高血压病8年，突发气促，端坐呼吸，咳吐粉红色泡沫痰。检查：双肺广泛水泡音，血压160/90mmHg。治疗应首选

- A. 氨茶碱
- B. 螺内酯(安体舒通)
- C. 地高辛
- D. 吗啡

E. 多巴酚丁胺

118、病原体侵入人体后能否引起疾病，主要取决于

- A. 机体的保护性免疫
- B. 机体的天然屏障作用
- C. 病原体的毒力与数量
- D. 病原体的侵入途径与特异性定位
- E. 病原体的致病力与机体的免疫功能

119、属DNA病毒的是

- A. 甲型肝炎病毒
- B. 乙型肝炎病毒
- C. 丙型肝炎病毒
- D. 丁型肝炎病毒
- E. 戊型肝炎病毒

120、普通型流脑临床特征性体征是皮肤

- A. 瘀点或瘀斑
- B. 水疱
- C. 黑痂
- D. 斑丘疹
- E. 脓肿

三、B型题

- A、上出息道，下走气街
- B、熏于盲膜，散于胸腹
- C、通过三焦，流行全身
- D、上荣头目，达于周身
- E、与血同行，环周不休

121、宗气的分布是

122、卫气的分布是

- A、胆
- B、胃
- C、小肠
- D、大肠
- E、膀胱

123、具有“主津”功能的脏是

124、具有“主液”功能的脏是

- A、大汗淋漓，四肢厥冷，面色苍白，神情淡漠，呼吸微弱，脉微欲绝
- B、形体消瘦，五心烦热，颧红盗汗，口燥咽干，皮肤干燥，脉象细数
- C、身热大汗，汗热质黏，面色潮红，躁扰不安，渴喜冷饮，脉细数疾
- D、高热肢厥，神识昏沉，胸腹灼热，口渴喜饮，面色紫暗，脉沉有力
- E、经常畏冷，四肢不温，渴喜热饮，常自汗出，尿清便溏，脉迟无力

125、真热假寒证的临床表现是

126、亡阳证的临床表现是

- A、发热，微恶风寒，舌边尖红，脉浮数
- B、发热，神昏谵语，斑疹紫暗，出血动风，舌质深绛
- C、身热夜甚，心烦，舌红绛，脉细数
- D、壮热，汗出，口渴，脉洪大
- E、发热，汗出，口渴，舌红苔黄，脉数

127、血分证的辨证要点是

128、营分证的辨证要点是

- A、气陷证
- B、气虚证
- C、气不固证
- D、气脱证
- E、血脱证

129、年高体弱，小便淋漓不尽，夜尿多，神疲，气短，动则汗出，脉弦缓的临床意义是

130、外伤后腹痛，出冷汗，面色苍白，脉微的临床意义是

- A、泻下力强
- B、泻下力缓
- C、偏于活血
- D、清上焦火热
- E、善止血

131、生大黄的作用特点是

132、大黄炭的作用特点是

- A、木通
- B、金钱草
- C、石韦
- D、地肤子
- E、海金沙

133、具有利尿通淋、止咳功效的药物是

134、具有清热利湿、止痒功效的药物是

- A、青蒿鳖甲汤
- B、茵陈蒿汤
- C、半夏泻心汤

D、四逆散

E、蒿芩清胆汤

135、清胆利湿，和胃化痰的方剂是

136、寒热平调，消痞散结的方剂是

A、止嗽散

B、泻白散

C、清气化痰丸

D、苏子降气汤

E、贝母瓜蒌散

137、热痰咳嗽。症见胸膈痞闷，气急呕恶，咯痰不爽，苔黄而腻者，治宜选用

138、燥痰咳嗽。症见呛咳气急，咯痰不爽，咽喉干燥，苔白而干者，治宜选用

A、咯铁锈色痰

B、咯粉红色泡沫痰

C、唇色、睑结膜苍白

D、咳嗽，午后潮热，盗汗

E、弛张热，皮肤、巩膜黄染

139、患败血症时，可出现

140、患肺结核时，可出现

A、闪罐法

B、留罐法

C、走罐法

D、刺血拔罐法

E、留针拔罐法

141、治疗丹毒、扭伤常选用

142、治疗局部皮肤麻木或功能减退常

选用

A、磺胺嘧啶

B、甲硝唑

C、甲氧苄啶

D、左氧氟沙星

E、呋喃唑酮

143、治疗各种厌氧菌感染的重要药物是

144、可以代替大环内酯类用于支原体肺炎的药物是

A、氢氯噻嗪

B、普萘洛尔

C、胍屈嗪

D、哌唑嗪

E、卡托普利

145、可引起高血钾、血管神经性水肿的降压药物是

146、可引起红斑狼疮样综合征的降压药物是

A、经济标准

B、疗效标准

C、社会标准

D、行为标准

E、科学标准

147、评价医务人员医疗行为善恶标准的出发点和根本标准是

148、评价医疗行为是否有利于人类生存和改善，是否有利于人类健康符合

A、地方卫生法规

B、基本法律

C、卫生法律

D、卫生规章

E、卫生行政法规

149、省级人民代表大会制定颁布的是

150、国务院卫生行政部门颁布的是

第二单元

一、A₁型选择题（1～45题）

答题说明：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 慢性支气管炎 X 线检查可见

A. 两肺纹理增粗，呈网状或条索状，以下肺野较明显

B. 肺纹理增粗或呈卷发状

C. 两肺野的透亮度增加，肺血管纹理外带纤细、稀疏和变直，内带的血管纹理可增粗或紊乱

D. 块状阴影或结节状影

E. 肺动脉影增宽

2. 治疗冠心病心绞痛气阴两虚证，可采用的是

A. 血府逐瘀汤与硝酸酯制剂、 β 受体阻滞药、钙离子拮抗药

B. 补阳还五汤与硝酸酯制剂、 β 受体阻滞药、利尿药

C. 枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤与硝酸酯制剂、ACEI 药、钙离子拮抗药

D. 生脉散合炙甘草汤与硝酸酯制剂、 β 受体阻滞药、钙通道阻滞药

E. 当归四逆汤合苏合香丸与利尿药、硝酸酯制剂、 β 受体阻滞药

3. 洋地黄中毒引起的心律失常最常见的是

A. 房性期前收缩

B. 室性期前收缩

C. 室上性心动过速

D. 室性心动过速

E. 房室传导阻滞

4. 风心病二尖瓣狭窄最重要的体征是

A. 心尖区第一心音亢进

B. 心尖区舒张中、晚期隆隆样杂音

C. 肺动脉瓣区第二心音亢进

D. 心房纤颤

E. 心尖搏动向左下移动

5. 怀疑胃溃疡恶变时的最佳处理措施是

A. 边治疗溃疡边密切观察

B. 胃镜取活检明确诊断，指导治疗

C. 服中药活血化瘀，清热解毒

D. 立即化疗

E. 立即手术

6. 男性肝硬化患者常出现性欲减退，睾丸萎缩，乳房发育，蜘蛛痣。其主要原因是

A. 垂体功能减低

B. 雌激素过多

C. 雄激素过多

D. 肾上腺皮质激素过多

E. 脾功能亢进

7. 发展中国家，引起慢性肾衰竭最常见的病因是

A. 糖尿病肾病

B. 高血压肾病

C. 肾小球肾炎

D. 多囊肾

E. IgA 肾病

8. 尿路感染初发者应首选的治疗药物是

A. 红霉素

B. 左氧氟沙星

- C. 链霉素
- D. 氯霉素
- E. 四环素

9. 下列各项中，不属于缺铁性贫血中医证型的是

- A. 脾胃虚弱证
- B. 心脾两虚证
- C. 热毒壅盛证
- D. 脾肾阳虚证
- E. 虫积证

10. 原发性血小板减少性紫癜，血小板被破坏的场所是

- A. 脾脏
- B. 肝脏
- C. 肾脏
- D. 肺脏
- E. 胰腺

11. 下列哪种疾病，骨髓中巨核细胞明显减少

- A. 缺铁性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 特发性血小板减少性紫癜
- D. 脾功能亢进
- E. 巨幼细胞性贫血

12. 甲亢患者，给予他巴唑 20mg，一日 3 次，在家中治疗。之后应到医院复查

- A. 心率、心律
- B. 心电图
- C. 甲状腺大小
- D. 白细胞计数
- E. 突眼程度

13. 下列哪项不属于消渴的并发症

- A. 雀目
- B. 中风
- C. 耳聋
- D. 疮痍
- E. 咳嗽

14. 下列各项中，不属于类风湿关节

炎关节症状的是

- A. 晨僵
- B. 疼痛与压痛
- C. 关节肿大
- D. 皮肤红
- E. 关节畸形

15. 晚期帕金森病的典型步态是

- A. 小步态
- B. 慌张步态
- C. 蹒跚步态
- D. 间歇跛行
- E. 拖曳步态

16. 下列不属于“外感六淫”的是

- A. 风
- B. 寒
- C. 暑
- D. 湿
- E. 痰

17. 下列哪项不属于腰麻的常见并发症

- A. 术后头痛
- B. 尿潴留
- C. 腰背痛
- D. 下肢瘫痪
- E. 四肢麻木

18. 急性淋巴结炎属中医 () 的范畴

- A. 内痈
- B. 外痈
- C. 疽
- D. 发
- E. 痰核

19. 挤压综合征主要是指挤压之后出现

- A. 呼吸困难
- B. 肢体坏死
- C. 昏迷
- D. 休克、急性肾衰
- E. 心衰

20. 神经纤维瘤的特点不包括

- A. 数目不定，几个甚至上千个不等
- B. 大者可达十数千克
- C. 肿瘤沿神经干走向生长
- D. 呈圆形、扁圆形或分叶状
- E. 皮肤出现咖啡斑，大小不定

21. 下列哪项不是甲亢的诊断要点

- A. 甲状腺抗体阳性
- B. 性情急躁，易激动
- C. 有突眼征
- D. 两手颤动
- E. 甲状腺肿大，常可扪及震颤或听到血管杂音

22. 对于原发性周围型肺癌，首选的治疗方法是

- A. 中医中药治疗
- B. 免疫治疗
- C. 放射治疗
- D. 化学治疗
- E. 手术治疗

23. 下列哪项不属于乳腺癌的典型表现

- A. 乳内无疼痛、单发包块
- B. 质地硬
- C. 局部皮肤橘皮样改变
- D. 表面不光滑，与周围组织粘连，不易推动
- E. 边界清楚

24. 胃癌的组织学分型错误的是

- A. 鳞腺癌
- B. 鳞癌
- C. 腺癌
- D. 类癌
- E. 十二指肠溃疡瘢痕性幽门梗阻

25. 原发性肝癌的首选治疗方法是

- A. 肿瘤局部放射治疗
- B. 生物治疗
- C. 中医中药治疗
- D. 手术治疗

E. 全身化疗

26. 我国妇女最常见的骨盆类型是

- A. 女型
- B. 男型
- C. 扁平型
- D. 漏斗型
- E. 类人猿型

27. 身体无病，每三月一行经者，称为

- A. 激经
- B. 暗经
- C. 居经
- D. 避年
- E. 并月

28. 下列各项，不属不孕症的必查项目的是

- A. 体格检查
- B. 妇科检查
- C. 卵巢功能测定
- D. 盆腔 CT 检查
- E. 精液常规检查

29. 治疗暑入阳明型产褥中暑，应首选的方剂是

- A. 清暑益气汤
- B. 白虎汤
- C. 紫雪丹
- D. 竹叶石膏汤
- E. 清营汤

30. 下列各项，不属热伤冲任所致病证的是

- A. 月经先期
- B. 月经过多
- C. 月经过少
- D. 崩漏
- E. 经行吐衄

31. 宫颈癌的临床分期是根据

- A. 有无淋巴结转移
- B. 术后所见分期
- C. 肉眼所见病灶大小

- D. 病灶累及的范围
- E. 临床症状严重程度

32. 下列各项，不属盆腔炎性疾病后遗症临床

- A. 下腹疼痛
- B. 发热恶寒
- C. 腰骶酸痛
- D. 带下量多
- E. 伴有不孕

33. 下列各项，属妊娠剧吐主要发病机理的是

- A. 冲气上逆，胃失和降
- B. 痰浊上扰，胃失和降
- C. 肝胃不和，胃失和降
- D. 脾气虚弱，胃失和降
- E. 阴血下注，阳气偏亢

34. 下列各项，不属肝肾阴虚型阴痒主证的是

- A. 阴部皮肤变白、干燥
- B. 阴部干涩
- C. 带下量多，色黄如脓
- D. 阴道口缩小
- E. 阴部萎缩、平坦

35. 下列关于初乳的叙述，错误的是

- A. 呈淡黄色，含有丰富的脂质
- B. 含蛋白质多
- C. 含乳糖较少
- D. 含β胡萝卜素多
- E. 含大量免疫抗体，如分泌型 IgA

36. 过敏性紫癜患儿最易出现的内脏损害是

- A. 心
- B. 肝
- C. 肺
- D. 肾
- E. 脾

37. 皮肤黏膜淋巴结综合征最早出现的症状是

- A. 淋巴结肿大
- B. 出疹
- C. 发热

D. 杨梅舌
E. 结膜充血

38. 蛋白质-能量营养不良的发病年龄是

- A. 主要见于 3 岁以下
- B. 主要见于 3~4 岁
- C. 主要见于 4~5 岁
- D. 主要见于 5~6 岁
- E. 青春期

39. 佝偻病肾虚骨弱证的治法是

- A. 补肾壮骨
- B. 补肾填精，佐以健脾益气
- C. 平肝潜阳
- D. 健脾补肾，填精补髓
- E. 温脾助运

40. 降低麻疹发病率的关键措施是

- A. 早发现，早隔离，早治疗
- B. 易感者按时注射麻疹减毒活疫苗
- C. 注射丙种球蛋白
- D. 易感儿不到人群密集场所
- E. 病人停留过的房间应开窗通风半小时

41. 下列各项，不属猩红热临床表现的是

- A. 发热数小时至一天出疹的
- B. 初起发热，咽喉红肿糜烂
- C. 皮疹呈鲜红点状
- D. 恢复期皮肤有色素沉着
- E. 有环口苍白圈，杨梅舌，皮肤皱褶处可见线状疹

42. 尿血的中医辨证分型不包括

- A. 风热伤络证
- B. 下焦湿热证
- C. 脾肾两虚证
- D. 肝脾不和证
- E. 阴虚火旺证

43. 治疗便秘的基本法则是

- A. 消积导滞
- B. 清热和中
- C. 清腑泄热
- D. 疏肝理气
- E. 润肠通便

44. 小儿感冒主要的病原体是

- A. 病毒
- B. 肺炎支原体
- C. 衣原体
- D. 葡萄球菌
- E. 立克次体

45. 小儿鹅口疮口腔局部的临床特征是

- A. 口腔黏膜出现单个或成簇的小疱疹
- B. 口腔黏膜充血，水肿，可有疱疹
- C. 口腔创面有纤维素渗出物形成或灰白色假膜，易擦去
- D. 口腔黏膜表面覆盖白色乳凝块样片状物，不易擦去
- E. 口腔黏膜出现大小不等的糜烂或溃疡

二、A₂型选择题（46 ~ 113 题）

答题说明：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

46. 患者，男，50 岁。咳嗽 2 个月，痰中带血。不发热，抗感染治疗效果不明显。3 次 X 线检查均显示右肺中叶炎症。为确诊，下列哪项检查最重要

- A. 血常规
- B. 血培养
- C. 结核菌素试验
- D. 痰结核菌检查
- E. 纤维支气管镜检查

47. 患者，男，21 岁。呼吸困难，咳嗽，汗出 1 小时而就诊。查体：端坐呼吸，

呼吸急促，口唇微绀，心率 114 次/分，律齐，双肺满布哮鸣音。为迅速缓解症状，应立即采取的最佳治法是

- A. 口服氨茶碱
- B. 肌注氨茶碱
- C. 喷吸沙丁胺醇
- D. 口服强的松
- E. 口服阿托品

48. 患者，女，32 岁。10 年前患风湿热，检查：心尖部听到舒张期隆隆样杂音。X 线显示左心房增大应首先考虑的是

- A. 二尖瓣关闭不全
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 肺动脉瓣狭窄

49. 患者，女，40 岁。平素善惊易恐，因受惊吓而心悸 1 个月余，坐卧不安，少寐多梦，舌苔薄白，脉虚弦。治疗应首选

- A. 归脾汤
- B. 炙甘草汤
- C. 朱砂安神丸
- D. 天王补心丹
- E. 安神定志丸

50. 患者，男，40 岁。十二指肠溃疡病史 15 年。近 2 个月来自感头痛、眩晕而就诊。检查：血压 160/100mmHg，诊断为高血压，下列降压药应禁用的是

- A. 利血平
- B. 硝苯地平
- C. 氢氯噻嗪
- D. 胍苯酞嗪
- E. 卡托普利

51. 患者，女，30 岁。反复上腹痛 6 年，饥饿时加重，进食后减轻。近 1 周来进食后上腹部胀痛加重，但大量呕吐后减轻。查体：轻度脱水，上腹部膨隆有振水音。应首先考虑的是

- A. 多发性溃疡病
- B. 复合性溃疡病
- C. 胃溃疡恶变
- D. 十二指肠溃疡伴幽门梗阻
- E. 胃窦部溃疡伴急性穿孔

52. 患者，男，46岁。反复右肋腹疼痛10年。现症见肋下积块坚实，痛定不移，脘腹胀满，甚则腹大如鼓，面目发黄晦暗，肌肤甲错，高热烦渴，小便黄赤，大便干黑，舌红有瘀斑，苔黄腻，脉弦数。经诊断为“原发性肝细胞癌”。其治法是

- A. 养阴清热，解毒祛瘀
- B. 疏肝理气，活血化瘀
- C. 清热利湿，化瘀解毒
- D. 理气活血，化瘀解毒
- E. 运脾利湿，化气行水

53. 女性患者，20岁，大便干结，腹胀腹痛，口干口臭，面红心烦，有身热，小便短赤，舌红，苔黄燥，脉滑数。其治疗首选方剂为

- A. 黄连上清丸
- B. 麻子仁丸
- C. 大承气汤
- D. 导赤散
- E. 三黄泻心汤

54. 患者小便淋漓不已，时作时止，每于劳累后发作，尿热，时有尿痛，面色无华，神疲乏力，少气懒言，腰膝酸软，食欲不振，口干不欲饮水，舌质淡，苔薄白，脉沉细。治疗应首选的方剂是

- A. 八正散
- B. 丹栀逍遥散
- C. 无比山药丸
- D. 知柏地黄丸
- E. 补中益气汤

55. 张某，男性，36岁。体检时发现蛋白尿阳性，24小时定量为1.3g，下肢轻度浮肿，血压150/96mmHg，血肌酐

124 $\mu\text{mol/L}$ 。其诊断是

- A. 慢性肾小球肾炎
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 肾病综合征
- D. 慢性肾功能衰竭
- E. 慢性肾盂肾炎

56. 患者王某，男性，45岁。慢性肾炎12年，现面浮肢肿，身热汗出，口干不欲饮，胸脘痞闷，腹部胀满，纳差，尿黄短少，便溏，舌红，苔黄腻，脉滑数。其中医治法是

- A. 益气养阴
- B. 活血化瘀
- C. 清热利湿
- D. 健脾化湿
- E. 温补脾肾

57. 边某，男，54岁，慢性肾衰竭病史两年，近两日精神萎靡，恶心，呕吐，血肌酐940 $\mu\text{mol/L}$ ，二氧化碳结合力15mmol/L，血钾6.8mmol/L，应首选的治疗措施是

- A. 静点碳酸氢钠
- B. 口服碳酸氢钠
- C. 血液透析
- D. 腹膜透析
- E. 静脉注射利尿剂

58. 6岁女童，喜食泥块，面色萎黄，血红蛋白92g/L，治疗应首选的药物是

- A. 抗生素
- B. 葡萄糖
- C. 维生素类
- D. 铁剂
- E. 钙剂

59. 某男，50岁，确诊为慢性髓细胞白血性期。首选治疗是

- A. 骨髓移植
- B. 泼尼松
- C. 长春新碱
- D. 尼洛替尼
- E. 环磷酰胺

60. 孙某，因发热就诊，血常规示白细胞 $70 \times 10^9/L$ ，见大量幼稚细胞，骨髓象提示有核细胞增生活跃，原始细胞占 35%。患者表现为壮热，口渴多汗，烦躁，头痛面赤，咽喉肿痛，面颊肿胀疼痛，牙龈出血，舌质红绛，苔黄，脉大。应首先考虑的病证结合诊断是

- A. 白血病+痰热瘀阻证
- B. 再障+痰热瘀阻证
- C. 再障+热毒炽盛证
- D. 骨髓增生异常综合征+热毒炽盛证
- E. 白血病+热毒炽盛证

61. 患者安某，服用氯霉素后出现乏力、出汗、周身不适，外周血象粒细胞计数为 $3.0 \times 10^9/L$ 。就诊时面色萎黄，头晕目眩，倦怠乏力，少寐多梦，心悸怔忡，纳呆食少，腹胀便溏，舌质淡，苔薄白，脉细弱。应首先考虑的病证结合诊断是

- A. 白血病+气血两虚证
- B. 粒细胞减少症+肝肾阴虚证
- C. 白血病+肝肾阴虚证
- D. 粒细胞减少症+外感温热证
- E. 粒细胞减少症+气血两虚证

62. 高某，两周前患上呼吸道感染，口服药物治疗后症状减轻，但近日皮肤多处瘀点、瘀斑，牙龈出血，不伴发热。血象检查：白细胞 $0.9 \times 10^9/L$ ，血红蛋白 $130g/L$ ，血小板 $38 \times 10^9/L$ 。应首先考虑的诊断是

- A. 上呼吸道感染
- B. 白血病
- C. 过敏性紫癜
- D. 原发免疫性血小板减少症
- E. 再生障碍性贫血

63. 王某，女，47 岁。1 周前曾患上呼吸道感染，现患者自觉颈前肿胀并伴有疼痛，心悸，出汗，口苦咽干，食欲减少，烦躁易怒，舌质红，苔薄黄，脉浮数。首选的中医治法是

- A. 活血化瘀，软坚散结
- B. 疏肝理气，消肿止痛
- C. 清肝泻胆，消肿止痛
- D. 滋阴降火，软坚散结
- E. 益气养阴，软坚散结

64. 患者，男性，58 岁，糖尿病史 5 年，服格列本脲血糖控制在 $8.6-9.6mmol/L$ 之间。近 3 天尿频、尿痛、尿急，昨天出现昏迷，查空腹血糖 $24.0mmol/L$ ，血钠 $148mmol/L$ ，血尿素氮 $7.08mmol/L$ ，尿糖（+++），尿酮（++）。应首先考虑的诊断是

- A. 糖尿病酮症酸中毒
- B. 脑血管意外
- C. 乳酸中毒昏迷
- D. 低血糖昏迷
- E. 高渗性非酮症糖尿病昏迷

65. 患者，男性，60 岁，口渴欲饮 6 年，近半年小便频数，混浊如膏，甚则饮一溲一，面色黧黑，耳轮焦干，腰膝酸软，形寒畏冷，阳痿，舌淡苔白，脉沉细无力。治疗应首选的方剂是

- A. 七味白术散
- B. 肾气丸
- C. 六味地黄丸
- D. 玉女煎
- E. 消渴方

66. 患者，男性，56 岁，凌晨关节疼痛惊醒、进行性加重、剧痛如刀割样或咬噬样，伴有发热、头痛、恶心、心悸、寒战，血液中尿酸 $420 \mu mol/L$ ，最可能是

- A. 类风湿关节炎
- B. 化脓性关节炎
- C. 创伤性关节炎
- D. 痛风
- E. 继发性高尿酸血症

67. 某患者，多食，消谷善饥，形体壮实，脘腹胀满，面色红润，心烦头晕，口干口苦，胃脘灼痛、嘈杂得食则缓，

舌红，苔黄腻，脉弦滑。其治法应是

- A. 滋养肝肾
- B. 行气化瘀
- C. 健脾化湿
- D. 温阳化湿
- E. 清胃泄热

68. 某女，两手指间和掌指关节强直不舒两年，近两周病情加重，关节疼痛、肿大变形，伴活动受限。查血沉 45mm/h，类风湿因子(++)。其诊断是

- A. 痛风
- B. 风湿性关节炎
- C. 类风湿关节炎
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 骨性关节炎

69. 男孩，突然意识短暂丧失，面色变白，双目凝视，手中的筷子掉在地下，口角出现细小颤动，持续约 15 秒后立即清醒。其诊断是

- A. 癫痫单纯部分性发作
- B. 癫痫不典型失神发作
- C. 癫痫典型失神发作
- D. 精神运动性癫痫
- E. 癫痫单纯部分性运动性发作

70. 患者平素头晕头痛，耳鸣目眩，突然发生口眼喎斜，舌强语蹇，半身不遂，舌质红，苔黄，脉弦。诊断为脑

- A. 风痰入络证
- B. 肝阳暴亢，风火上扰证
- C. 痰爽热腑实，风痰上扰证
- D. 气虚血瘀证
- E. 阴虚风动证

71. 女性患者，突然昏迷，抽搐，呼吸有大蒜味，瞳孔明显缩小，皮肤冷汗，两肺湿啰音。下列各项中，应首先考虑的诊断是

- A. 一氧化碳中毒
- B. 安定中毒
- C. 脑出血

- D. 有机磷杀虫药中毒
- E. 蛛网膜下腔出血

72. 患者，男，27 岁。高温下作业 7 小时后，大汗出，腹部痉挛和疼痛，四肢抽搐。查体：颜面潮红，口唇干燥，体温 39℃。首选的诊断是

- A. 中暑（热痉挛）
- B. 中暑（热射病）
- C. 中暑（热衰竭）
- D. 轻度中暑
- E. 中暑先兆

73. 患者患喘证 20 年，现症见喘促短气，气怯声低，喉有鼾声，咳声低弱，痰吐稀薄，自汗畏风，痰少质黏，烦热而渴，咽喉不利，面颧潮红，舌质淡红，脉细数。其中医治法是

- A. 补肾纳气
- B. 扶阳固脱，镇摄肾气
- C. 补肺益气养阴
- D. 开郁降气平喘
- E. 化痰降逆

74. 患者，男，75 岁。哮喘病史二十余年。动则喘甚，呼多吸少，气不得续，形瘦神惫，跗肿，汗出肢冷，面青唇紫，舌淡苔白，脉微细。其证候是

- A. 肺气虚耗证
- B. 肾虚不纳证
- C. 痰浊阻肺证
- D. 痰热郁肺证
- E. 肺气郁痹证

75. 头痛患者，疼痛日久，其痛如锥刺，固定不移，舌质紫，脉细涩。其证候是

- A. 肝阳
- B. 痰浊
- C. 血虚
- D. 肾虚
- E. 瘀血

76. 患者，男，3 岁，啼哭时可见腹股

沟上段内侧由外上向内下前斜行凸现一圆形囊性包块，平卧时可自行回纳。应首先考虑的诊断是

- A、腹股沟直疝
- B、腹股沟斜疝
- C、股疝
- D、脐疝
- E、切口疝

77. 患者，女，50岁，教师，右下肢沉重、酸胀2年余，检查可见右下肢浅静脉隆起、迂曲，状如蚯蚓。为确诊，应做的检查是

- A、多普勒肢体血流图
- B、静脉造影
- C、红外热像仪测定
- D、肢体光电容积描记
- E、血液流变学检查

78. 患者，男性，63岁，颈部出现片状稍隆起的紫红色浸润区，质地坚韧，界限不清，中央形成多个脓栓，应首先考虑的诊断是

- A. 疔
- B. 痈
- C. 疽
- D. 丹毒
- E. 痰核

79. 患者，男，60岁。右足划伤3天，局部沉重疼痛，持续加重，迅速向上蔓延，伤口大量液体渗出并可见气泡冒出。应首选的抗生素是

- A. 庆大霉素
- B. 青霉素
- C. 妥布霉素
- D. 氧氟沙星
- E. 甲硝唑

80. 患者，男，24岁，头部被木棒击伤昏迷半小时后转醒，左颞骨线性骨折，3小时后转入昏迷状态，出现瞳孔散大，应首先考虑的诊断是

- A. 脑震荡

- B. 脑挫伤
- C. 原发性脑干损伤
- D. 硬膜外血肿
- E. 继发性脑干损伤

81. 患者，24岁，不慎跌入80℃热水池内，池水淹没下半身超过臀部，初步估计烫伤面积为

- A. 30%~34%
- B. 35%~39%
- C. 40%~44%
- D. 45%~50%
- E. >60%

82. 患者，女，31岁，甲状腺弥漫性肿大，可触及震颤，伴有杂音，核素扫描为热结节，吸碘率增高，应首先考虑的诊断是

- A. 甲状腺瘤
- B. 结节性甲状腺肿
- C. 单纯性甲状腺肿
- D. 甲状腺癌
- E. 甲状腺功能亢进症

83. 患者，女，38岁，颈前肿痛，胸闷不适，口苦咽干，急躁易怒，心悸多汗；苔薄黄，脉弦数。其中医证型是

- A. 气滞痰凝
- B. 火毒炽盛
- C. 肝郁胃热
- D. 胃火炽盛
- E. 肝郁痰结

84. 患者，女，75岁。长期饮食困难，近于梗阻，呕恶气逆，形体枯羸，目不识人，气短乏力，语声低微，面色苍白，大便难下，舌质暗绛，舌体瘦小，无苔，脉沉细无力。应首先考虑的诊断是

- A. 肺癌
- B. 肝癌
- C. 胃癌
- D. 肺结核
- E. 食管癌

85. 患者，女性，36岁，乳房内多发性肿块，伴疼痛，月经后有所缩小、变软，应首先考虑的诊断是

- A. 乳腺增生病
- B. 乳腺癌
- C. 乳腺纤维腺瘤
- D. 积乳囊肿
- E. 急性乳腺炎

86. 患者，女，35岁，乳房胀痛半年，经前加重，经后痛减；伴情绪抑郁，心烦易怒，失眠多梦，胸胁胀满；舌质淡红苔薄白，脉细涩。其中医证型是

- A. 痰瘀凝结
- B. 肝郁气滞
- C. 气滞血瘀
- D. 冲任失调
- E. 毒热蕴结

87. 患者，男，45岁，消化性溃疡反复发作20年，近1个月来出现食欲减退，上腹部饱胀及沉重感，呕吐频繁，呕吐量大且含有酸臭味的宿食，呕吐物中不含胆汁，吐后上腹饱胀减轻，腹痛消失，明显消瘦，可见到上腹部的胃蠕动波、胃型、胃振水音，应首先考虑的诊断是

- A. 消化性溃疡合并幽门梗阻
- B. 肠梗阻
- C. 贲门梗阻
- D. 弥漫性腹膜炎
- E. 食管癌

88. 患者，女，35岁，反复右上腹阵发性绞痛，痛连右肩背1个月，B超示胆囊大小正常，胆汁回声正常，胆总管轻度扩张，下端见直径0.5cm结石1枚，胰腺未见异常。应首选的治疗方法是

- A. 排石疗法
- B. 溶石疗法
- C. 碎石疗法
- D. 取石疗法

E. 外科手术

89. 患者，男，55岁，肋下积块，腹大如鼓，黄疸日深，纳呆乏力，小便短赤，腹水肢肿。应首先考虑的中医诊断是

- A. 噎膈
- B. 鼓胀
- C. 伏梁
- D. 肺积
- E. 反胃

90. 患者，男，80岁，出现便血，伴贫血、腹痛、右下腹肿块1个月，无发热，伴明显消瘦、腹胀，应首先考虑的诊断是

- A. 慢性阑尾炎
- B. 阑尾类癌
- C. 结肠癌
- D. 溃疡性结肠炎
- E. 肠结核

91. 患者，男，40岁，腰痛，少腹急满，小便频数短赤，伴有涩痛难忍，淋沥不爽，口干欲饮；舌红，苔黄腻，脉弦细。治疗应首选的方剂是

- A. 石韦散
- B. 八正散
- C. 济生肾气丸
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 仙方活命饮

92. 初产妇，孕40周临产，规则宫缩12小时，破膜10小时，肛查：宫口开大5cm，先露+0.5，首先应考虑的诊断是

- A. 胎膜早破
- B. 正常潜伏期
- C. 正常活跃期
- D. 潜伏期延长
- E. 第一产程延长

93. 患者，女，29岁。妊娠53天，呕吐剧烈，吐出物带血丝，消瘦明显，

嘴唇燥裂，口渴，大便干燥，皮肤弹性差，精神萎靡，舌红，苔花剥，脉细滑无力。其中医证型是

- A. 脾胃虚弱型
- B. 肝胃不和型
- C. 痰湿阻滞型
- D. 气阴两亏型
- E. 阴虚火旺型

94. 患者，女，24岁。停经67天，腹痛伴阴道流血3天。妇科检查：宫口见有胚胎样组织物堵塞，子宫孕9周大小。首先应考虑的诊断是

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 不全流产
- D. 过期流产
- E. 流产感染

95. 患者，女，27岁。产后2周，高热汗出，烦躁，斑疹隐隐，舌红绛，苔黄燥，脉弦细而数。化验血常规：白细胞： $20 \times 10^9/L$ 。治疗应首选的方剂是

- A. 解毒活血汤
- B. 荆防败毒散
- C. 紫雪丹
- D. 安宫牛黄丸
- E. 清营汤

96. 患者，女，35岁，G3P2。流产后月经9~10天/28~30天，量中等，痛经(-)，基础体温为双相但下降缓慢。首先应考虑的诊断是

- A. 无排卵性异常子宫出血
- B. 黄体功能不全
- C. 排卵期出血
- D. 子宫内膜不规则脱落
- E. 正常月经

97. 患者，女，23岁，未婚。月经不定期、经期延长，量时多时少已3年余，肛检外阴发育正常，宫体较小。前次月经约行20天方净。本次又值经期，

已4天，量多如注，色鲜红，质稍稠，腰膝酸软，头晕耳鸣，心烦口干，舌红，少苔，脉细数。应首选的方剂是

- A. 固本止崩汤
- B. 左归丸合二至丸
- C. 清热固经汤
- D. 固经丸
- E. 保阴煎

98. 患者，女，28岁，G₃P₁。以往月经尚规律，量中等，近2年月经开始渐渐后错，量少，现已半年余月经未潮，尿妊娠试验(-)，小腹隐隐作痛，喜温喜按，舌淡，苔薄白，脉沉细。首先应考虑的诊断是

- A. 月经后期
- B. 月经过少
- C. 原发性闭经
- D. 继发性闭经
- E. Turner综合征

99. 患者，女，16岁。1年来每逢月经来潮时下腹冷痛，拒按，得热痛减，经血量少，色暗有块，畏寒，舌淡暗，苔白腻，脉沉紧。治疗应首选的方剂是

- A. 理冲汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 少腹逐瘀汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 艾附暖宫丸

100. 患者，女，38岁。月经数月不行，形体肥胖，胸脘满闷，呕恶痰多，带下量多，舌苔白腻，脉滑，尿妊娠试验(-)。其中医治法是

- A. 燥湿祛痰，行气通经
- B. 健脾祛湿，活血调经
- C. 燥湿祛痰，理气活血
- D. 燥湿健脾，活血通经
- E. 燥湿化痰，活血通经

101. 患者，女，40岁。月经规律，性生活后阴道有少量流血2个月，无腹

痛等其他不适症状。首先应考虑的诊断是

- A. 子宫内膜癌
- B. 宫颈癌
- C. 卵巢肿瘤
- D. 输卵管癌
- E. 子宫肌瘤

102. 患者，女，35岁。近半年感下腹部有一包块，固定不移，胀痛拒按，面色晦暗，舌边有瘀点，脉沉涩。B超示：子宫肌瘤。治疗应首选的方剂是

- A. 银甲丸
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 失笑散
- D. 温经汤
- E. 桂枝茯苓丸

103. 患者，女，30岁，G₂P₀。痛经5年。妇科检查：阴道后穹隆可扪及触痛结节，宫体后壁有多个小结节，右附件可扪及5cm×4cm×4cm大小囊肿，欠活动，压痛，诊断为子宫内膜异位症。下列的处理错误的是

- A. 达那唑治疗
- B. 孕三烯酮治疗
- C. 子宫及右附件切除术
- D. 雷诺德治疗
- E. 腹腔镜手术

104. 患者，女，38岁。痛经6年，盆腔检查扪及与子宫相连的囊性包块或盆腔内有触痛性结节每于经前小腹冷痛，经血色暗、有块，形寒肢冷，面色苍白，舌紫暗，苔薄白，脉沉紧。治疗应首选的方剂是

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 桃红四物汤
- E. 艾附暖宫丸

105. 患者，女，29岁。结婚4年未孕，月经周期不规律，经来腹痛，月经量

少，色暗有小血块，经前乳胀，烦躁易怒，舌红，苔白，脉弦。治疗应首选的方剂是

- A. 启宫丸
- B. 养精种玉汤
- C. 开郁种玉汤
- D. 柴胡疏肝散
- E. 逍遥散

106. 足月男婴，出生后6小时即出现身黄、目黄，颜色鲜明，哭闹不安、呕吐、尿黄，舌质红，苔黄，指纹紫滞。治疗首选方剂是

- A. 茵陈理中汤加减
- B. 茵陈蒿汤加减
- C. 黄连解毒汤加减
- D. 羚角钩藤汤加减
- E. 膈下逐瘀汤加减

107. 患儿，1岁。发热4天，咳嗽气急，心率增快，双肺底部湿啰音固定。症见频咳不已，喉间痰鸣，声如拽锯，气急鼻扇，面赤口渴，苔薄黄，脉滑数。其诊断是

- A. 支气管肺炎，痰热闭肺证
- B. 支气管肺炎，风热闭肺证
- C. 支气管肺炎，心阳虚衰证
- D. 大叶性肺炎，风热闭肺证
- E. 支气管肺炎，阴虚肺热证

108. 患儿，着凉后述胸闷气短，乏力，低热，恶心呕吐，心率快，心音低钝，心肌酶升高，心电图示ST段抬高，低电压，下列处置方法错误的是

- A. 加强体育锻炼，增加运动量
- B. 避免情绪波动
- C. 安静卧床
- D. 易消化富营养饮食
- E. 营养心肌，改善心肌代谢，稳定心功能

109. 患儿，9个月。腹泻时曾服用抗生素1周，现症见满口白屑，状如雪花。应首先考虑的诊断是

- A. 幼儿急疹
- B. 乳垢
- C. 正常
- D. 鹅口疮
- E. 麻疹

110. 患儿，1岁半。发热腹泻半天就诊。泻下稀薄，水分较多，粪色深黄而臭，微见黏液，腹部时觉疼痛，食欲不振，伴泛恶，口渴，小便短黄，肛门灼热发红，舌苔黄腻，其治法是

- A. 消食化积
- B. 清热利湿
- C. 健脾益气
- D. 疏风散寒
- E. 补脾温肾

111. 患儿，3岁，口腔溃疡2天，疼痛拒食、烦躁，流口水，小便黄，大便干。查体：口腔口舌面及舌尖多处溃疡，周围红赤，口臭，舌尖红苔黄，脉滑数。其诊断是

- A. 口疮（心火上炎）
- B. 口疮（虚火上浮）
- C. 口疮（脾胃积热）
- D. 口疮（心肝火旺）
- E. 口疮（肝胃同病）

112. 患儿，6岁。浮肿4天，小便量少色赤，烦热口渴，头身困重，尿蛋白（+），红细胞20个/高倍视野，舌质红，苔黄腻，脉滑数。其首选方剂是

- A. 五苓散
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 五味消毒饮
- D. 温胆汤
- E. 麻黄连翘赤小豆汤

113. 患儿，4岁。反复浮肿5个月，面色萎黄，神疲乏力，畏寒肢冷，肢体浮肿，晚间腹胀，纳少便溏。查体：全身浮肿呈凹陷性，舌淡苔白滑，脉沉缓。实验室检查：尿蛋白明显增高，血浆蛋白降低，血清胆固醇

5.97mmol/L。诊断为肾病综合征，其证型是

- A. 风水相搏
- B. 脾肾阳虚
- C. 肝肾阴虚
- D. 脾虚湿困
- E. 湿热内侵

114. 患儿，5岁。突然出现全身肢体抽搐，伴神志丧失，持续约5分钟，自行缓解。无发热，大便稀溏。查大便常规：未见异常。查脑电图：可见棘、尖慢波，呈爆发现象。有高热惊厥史3次。其诊断是

- A. 疫毒痢
- B. 癫痫
- C. 急惊风
- D. 暑温
- E. 慢惊风

115. 患儿，10岁。经常挤眉眨眼，耸肩摇头，口出秽语，肢体震颤，大便干结，五心烦热，两颧潮红，形体消瘦，舌质红绛，舌苔光剥，脉细数无力。治疗应首选的方剂是

- A. 醒脾散
- B. 大定风珠
- C. 川芎茶调散
- D. 礞石滚痰丸
- E. 千金龙胆汤

116. 患儿，2岁。起病急骤，皮肤出现瘀斑瘀点，色红鲜明，伴有齿衄鼻衄，偶见尿血，面红目赤，心烦口渴，便秘尿少，舌红，苔黄，脉数。其首选方剂是

- A. 参苓白术散
- B. 桃仁汤
- C. 犀角地黄汤
- D. 大补阴丸合茜根散
- E. 归脾汤

117. 患儿，7个月。母乳喂养，未加辅食，食欲不振，皮肤黏膜渐苍白，肝

肋下 3cm, 脾肋下 1.5cm, 血红蛋白 70g/L, 红细胞 $3.5 \times 10^9/L$ 。其诊断是

- A. 营养性大细胞性贫血
- B. 营养性缺铁性贫血
- C. 营养性感染性贫血
- D. 生理性贫血
- E. 先天性再生障碍性贫血

三、A₃型选择题 (118 ~ 132 题)

答题说明: 以下提供若干个案例, 每个案例下设 3 道考题。请根据题干所提供的信息, 在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

(118~122 题共用题干)

某男, 76 岁。慢性阻塞性肺病史 17 年, 长期咳嗽、咳痰伴气短、憋喘。近 3 天来咳嗽、憋喘加剧。现呼吸困难, 浅短难续, 张口抬肩, 心悸, 气短, 头痛, 夜间失眠, 白天嗜睡, 神情淡漠, 不欲饮食。查体: 口唇发绀, 颈静脉怒张, 全身浮肿, 肝脏增大, 三尖瓣区收缩期杂音, 心率 120 次/分, 律不齐, 双肺哮鸣音及肺底湿性啰音。舌胖紫暗, 苔白滑, 脉沉滑。动脉血气分析: PaO_2 50mmHg, $PaCO_2$ 60mmHg, pH7.2, AB>SB。

118. 首先考虑的诊断是

- A. 慢性阻塞性肺病 (脾肾阳虚证)
- B. 慢性呼吸衰竭 (脾肾阳虚证)
- C. 慢性呼吸衰竭 (阳微欲脱证)
- D. 慢性阻塞性肺病 (痰浊阻肺证)
- E. 慢性呼吸衰竭 (痰蒙神窍证)

119. 可能的酸碱平衡紊乱是

- A. 代偿性呼吸性酸中毒
- B. 失代偿性呼吸性酸中毒
- C. 代偿性呼吸性碱中毒
- D. 失代偿性代谢性酸中毒
- E. 代偿性代谢性酸中毒

120. 以下不恰当的处理措施是

- A. 清除气道内分泌物, 保持呼吸道通畅
- B. 较高浓度 (>35%) 给氧以迅速缓解低氧血症

C. 明确致病菌, 并选用敏感有效的抗生素

D. 若出现呼吸肌疲劳, 及时使用机械通气

E. 补充 5%碳酸氢钠, 使 pH 值上升至 7.25 左右

121. 中医治法是

- A. 化痰降气, 活血化瘀
- B. 补益肺肾, 纳气平喘
- C. 温肾健脾, 化湿利水
- D. 益气温阳, 固脱救逆
- E. 涤痰开窍, 息风止痉

122. 治疗此证应首选的方剂是

- A. 独参汤灌服
- B. 真武汤合五苓散加减
- C. 补肺汤合参蛤散加减
- D. 涤痰汤送服安宫牛黄丸、至宝丹
- E. 二陈汤合三子养亲汤加减

(123~126 题共用题干)

患者, 男, 62 岁。症见脘腹胀满, 胁痛肢楚, 神疲乏力, 纳呆便溏, 四肢肿胀, 既往乙肝病史 13 年, CT 可见肝区肿块, 舌淡胖, 苔白腻, 脉弦滑。

123. 其诊断是

- A. 肝硬化
- B. 肝炎
- C. 肝癌
- D. 胃癌
- E. 胃溃疡

124. 其证型是

- A. 气滞血瘀证
- B. 肝胆湿热证
- C. 肝肾阴虚证
- D. 脾虚湿困证
- E. 阴阳两虚证

125. 其治疗是

- A. 疏肝理气, 活血化瘀
- B. 益气健脾, 化湿祛痰
- C. 清利湿热, 活血化瘀
- D. 养阴散结, 凉血解毒
- E. 滋阴助阳

126. 治疗应首选

- A. 小柴胡汤

- B. 茵陈蒿汤合鳖甲煎丸加减
- C. 青蒿鳖甲汤合一贯煎加减
- D. 四君子汤合逍遥散加减
- E. 八珍汤

(127~129 题共用题干)

患者，女，31岁，已婚。停经2月余，反复少量阴道流血18天，10天前曾下腹剧痛，现下腹坠胀。妇科盆腔及B超检查：子宫大小正常，右附件包块约7cm×6cm×5cm大小，尿妊娠试验可以(+)。头晕神疲，舌淡黯，苔薄白，脉细滑。

127. 首先考虑的诊断是

- A. 宫外孕为破损型
- B. 宫外孕不稳定型
- C. 宫外孕包块型
- D. 子宫内膜异位症
- E. 右附件炎性包块

128. 中医治法为

- A. 活血祛瘀，杀胚消癥
- B. 益气化瘀，消癥杀胚
- C. 回阳救逆，益气固脱
- D. 活血化瘀，消癥散结
- E. 益气养血，调固冲任

129. 治疗首选

- A. 宫外孕 I 号方加党参、黄芪、紫草、蜈蚣、天花粉
- B. 宫外孕 II 号方加紫草、蜈蚣、水蛭、天花粉
- C. 参附汤合生脉散加黄芪、柴胡、炒白术
- D. 理冲丸加土鳖虫、水蛭、炙鳖甲
- E. 泰山磐石散

答案：BBA

解析：结合患者停经史、反复出血、下腹剧痛、下腹坠胀及辅助检查，首先考虑宫外孕不稳定型——胎瘀阻络、气虚血瘀证（多见于输卵管妊娠流产）。不稳定型证候：停经后下腹一侧腹痛拒按，阴道不规则少量流血，头晕神疲，血β-hCG动态监测呈升高趋势；舌淡黯，苔薄白，脉细滑。治法：益气化瘀，消癥杀胚。方药：宫外孕 I

号方加党参、黄芪、紫草、蜈蚣、天花粉。因本型患者可反复内出血，应配合西医化学药物杀胚，动态监测血β-hCG和B型超声，作好抢救休克的准备。

(130~132 题共用题干)

患儿，男，3岁。胃脘胀满，疼痛拒按，噯腐吞酸，呕吐，呕吐物为不消化食物。舌质红，苔厚腻，脉滑。

130. 其诊断是

- A. 胃炎
- B. 腹泻
- C. 消化性溃疡
- D. 急性胰腺炎
- E. 肠蛔虫症

131. 其证型是

- A. 寒邪犯胃
- B. 乳食积滞
- C. 湿热中阻
- D. 肝气犯胃
- E. 脾胃虚寒

132. 治疗应首选

- A. 香苏散合良附丸加减
- B. 黄连温胆汤加减
- C. 保和丸加减
- D. 柴胡疏肝散加减
- E. 黄芪建中汤加减

四、B₁型选择题（133~150题）

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题最密切的答案。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(133~134 题共用备选答案)

- A. 增加心肌需氧量为因素诱发的心绞痛
- B. 无明显心肌需氧增加的情况下发生的心绞痛
- C. 心绞痛发作时，心电图某些导联ST段抬高

D. 心尖部针刺样疼痛，发作时有心电图异常

E. 心前区压迫样疼痛 15 分钟以上，心电图有病理性 Q 波

133. 劳力型心绞痛的诊断标准是

134. 变异型心绞痛的诊断标准是

(135~136 题共用备选答案)

A. 八珍汤合无比山药丸

B. 归脾汤

C. 左归丸

D. 右归丸

E. 四物汤

135. 缺铁性贫血脾肾阳虚证的治疗方剂为

136. 再生障碍性贫血脾肾亏虚证的治疗方剂为

(137~138 题共用备选答案)

A. 三仁汤

B. 清瘟败毒饮

C. 清燥救肺汤

D. 益胃汤

E. 加味二妙散

141. 痿证肺热津伤，筋失濡润证代表方是

142. 痿证湿热浸淫，气血不运证代表方是

(139~140 题共用备选答案)

A. 龙胆泻肝汤

B. 滋阴除湿汤

C. 八正散

D. 暖肝煎

E. 济生肾气丸

139. 治疗睾丸炎湿热下注证应首选

140. 治疗睾丸炎寒湿凝滞证应首选

(141~142 题共用备选答案)

A. 使阴道上皮细胞增生角化

B. 使阴道上皮细胞脱落加快

C. 促进阴毛和腋毛的生长

D. 直接促进窦前卵泡及窦状卵泡的生长发育

E. 抑制垂体 FSH 分泌

141. 孕激素的作用是

142. 促卵泡素的作用是

(143~144 题共用备选答案)

A. 肝肾阴虚型

B. 脾肾阳虚型

C. 湿热下注型

D. 湿虫滋生型

E. 津亏血少型

143. 阴部干涩，灼热瘙痒，五心烦热，舌红苔少，脉细数。其中医证型是

144. 阴部瘙痒，带下量多，色黄如脓，稠黏臭秽，舌苔黄腻，脉弦数。其中医证型是

(145~146 题共用备选答案)

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 8

145. 正常小儿会爬行的月龄是

146. 正常小儿会独坐的月龄是

(147~148 题共用备选答案)

A. 智力及动作发育落后有倒退现象

B. 兴奋、多动

C. 注意力不集中，记忆力减退

D. 腱反射减弱

E. 感觉异常

147. 缺铁性贫血神经系统表现

148. 营养性巨幼红细胞性贫血神经系统表现

(149~150 题共用备选答案)

A. 桃仁承气汤

B. 复方大承气汤

C. 温脾汤

D. 甘遂通结汤

E. 驱蛔承气汤

137. 腹胀、腹痛，痞满拒按，恶心呕吐，无排气排便，发热口渴，小便黄赤，舌红苔黄燥，脉洪数。应首选

138. 腹痛阵作，胀满拒按，恶心呕吐，
无排气排便，舌淡红，苔薄白，脉弦
或涩。应首选