

1. 氟的急救量是多少，氟的中毒量是多少
2. 用于评价大规模的口腔流行病学的指数
3. 品红溶液浓度是多少
4. 牙本质过敏牙膏选什么
5. 牙髓活力检查，热测试敏感，冷测试缓解，诊断是
6. 分析性的临床试验最多用的是
7. 中度高度危险器械
8. 除了四环素，还有什么药物可引起四环素牙

1. 最早口腔检查人员是

- A. 婴儿
- B. 幼儿
- C. 月龄儿童
- D. 成人
- E. 老年人

2. 3 天前做完牙髓治疗，逐渐出现咬合痛，X 线正常，没有超出根管。

- A 遗漏根管
- B 超预备
- C 药物刺激
- D 残髓炎

3. 上中切牙外伤脱落后处理

- A. 直接放进牙槽窝
- B. 冲洗干净再放入牙槽窝
- C. 自来水冲洗干净后放入自来水瓶内
- D. 冲洗擦干后放卫生纸内包裹

4. 至龋最弱的糖是

- A. 蔗糖
- B. 葡萄糖
- C. 麦芽糖
- D. 淀粉
- E. 果糖

5. 用于评价大规模的口腔流行病学指数

- A 牙龈出血、牙菌斑、软垢
- B 龈沟出血、牙周袋、牙石
- C 牙石、软垢、菌斑
- D 牙周袋深度、牙龈出血
- E 菌斑、牙石、牙周袋

(共用备选答案)

- A. 2.5mg

- B. 5mg
- C. 7.5mg
- D. 10mg
- E. 15mg

- 1 氟的急救量
- 2 氟化物可能中毒计量

(共用题干)

初一 200 人，患龋率 20%，初二 200 人，患龋率 22.5%，初三 100 人，患龋率 25%

- 1. 全初中患龋率
- 2. 龋指数是多少
- 3. 低，很低，高，很高

(共用备选答案)

- A. 模型雕刻刀
- B. 蜡刀
- C. 口镜
- D. 拔牙钳
- E. 锤子

- 1. 高危器械是
- 2. 中危器械是

(共用备选答案)

- A 菌斑生物膜
- B 结合上皮分泌的防御素
- C 合创伤
- D 食物嵌塞
- E 龈沟液分泌的 PMN

- 1. 在牙周炎发展中具有致炎和抗炎双作用的是
- 2. 单独存在时，牙龈组织炎症不受影响的是
- 3. 单个牙松动，骨吸收不同于其他，可能的原因是

命中题

- 1. 分析性流行病学的研究方法之一是
 - A. 横断面研究
 - B. 常规资料分析
 - C. 纵向研究

- D. 群组研究
- E. 现况调查

【答案】 D。

2. 哪种制剂不能作为菌斑染色剂

- A. 2%碱性品红
- B. 2%甲紫
- C. 2%~5%藻红
- D. 4%酒石黄
- E. 1.0%~2.5%孔雀绿

【答案】 B

3. 急性化脓性牙髓炎有特点的症状是

- A. 自发痛阵发性加重
- B. 冷刺激可缓解疼痛
- C. 热刺激可缓解疼痛
- D. 痛向对侧面部放散
- E. 刺激除去痛立即消失

【答案】 B

5. 能引起四环素牙的药物有

- A. 先锋霉素和四环素
- B. 土霉素和地美环素
- C. 链霉素和氯霉素
- D. 林可霉素和庆大霉素
- E. 先锋霉素和米诺环素

【答案】 B

6. 出生后, 第一次需做口腔检查的时间是

- A. 3个月, 乳牙未萌出
- B. 6个月, 第一颗乳牙萌出
- C. 1岁, 下中、侧切牙萌出
- D. 2岁, 多数乳牙已萌出
- E. 2岁半, 乳牙全部萌出

【答案】 B