

2022年执业/助理医师资格考试

笔试高频精选冲刺题

中西医执业医师精选600题

套卷二【151-300题】

金英杰医学教育

151.(A1型题)13治疗肿疡期肿而有结块, 应选用的药物是

- A.生肌白玉膏
- B.金黄膏
- C.九一丹
- D.无极膏
- E.皮质类固醇激素软膏

答案:B

解析:金黄膏适用于阳证, 肿疡、肛门周围痈疽, 具有清热解毒、消肿散结的作用。而生肌白玉膏用于一切溃疡或烧伤, 腐肉未脱, 新肉未生, 或日久不能收口。九一丹、无极膏拔脓祛腐, 用于疮疡溃破之初。故治疗肿疡期肿而有结块, 用金黄膏。故本题选B。

152.(A1型题)17婴儿面部的皮肤消毒, 应采取

- A.2.5%碘酊擦涂2次
- B.0.75%碘酊擦涂2次
- C.0.1%新洁尔灭擦涂2次
- D.0.2%洗必泰酊擦涂1次
- E.70%酒精擦涂1次

答案:C

解析:对婴儿、口腔、肛门、外生殖器、面部皮肤等不能使用碘酊消毒处, 可选用0.1%新洁尔灭, 0.1%洗必泰, 0.1%硫柳汞酊, 0.75%PVP-I等涂擦2~3遍, 以免刺激皮肤或黏膜。故本题选C。

153.(A1型题)20下列各项, 不属局部麻醉的是

- A.局部浸润麻醉
- B.静脉麻醉
- C.表面麻醉
- D.区域阻滞麻醉
- E.神经阻滞麻醉

答案:B

解析:局部麻醉包括表面麻醉、局部浸润麻醉、区域阻滞麻醉、神经阻滞麻醉。静脉麻醉属全身麻醉中的非吸入性麻醉。故本题选B。

154.(A1型题)23正常成人每日所需的水量是

- A.500~1000ml
- B.1000~1500m
- C.1500~2000ml
- D.2000~2500ml
- E.2500~3000ml

答案:D

解析:正常成人24小时出入量2000~2500ml。故本题选D。

155.(A1型题)27急性呼吸性酸中毒最先应进行的治疗是

- A.肺部感染,使用大量抗生素
- B.进行人工呼吸
- C.应用呼吸中枢兴奋剂
- D.解除呼吸道梗阻,改善肺通气功能
- E.给予碱性液体

答案:D

解析:急性呼吸性酸中毒患者机体对呼吸性酸中毒的代偿能力较差,而且常合并存在缺氧,对集体的危害性极大,因此除需要治疗原发病因之外,还要采取积极措施改善病人的通气功能。故本题选D。

156.(A1型题)30脾破裂可引起的休克是

- A.感染性
- B.过敏性
- C.损伤性
- D.失血性
- E.疼痛性

答案:D

解析:失血性休克常见病因有上消化道出血、宫外孕破裂出血、动脉瘤破裂以及肝、脾和大动脉破裂出血,脾破裂会导致大量血液流失,容易致失血性休克。感染性休克系因外科脓毒血症和败血症引起的休克。过敏性休克多发生于对青霉素、普鲁卡因、血清制剂和疫苗过敏者。损伤性休克常见病因有严重烧伤、骨折、内脏损伤、软组织挤压伤。疼痛性休克常因剧烈疼痛而引起。故本题选D。

157.(A1型题)34急性硬膜外血肿典型的意识改变是

- A.伤后昏迷-清醒-再昏迷
- B.持续性昏迷
- C.伤后无昏迷
- D.短暂昏迷
- E.持续深昏迷

答案:A

解析:硬脑膜外血肿的典型意识改变是有中间清醒期,即昏迷-清醒或好转-再昏迷。故本题选A。

158.(A1型题)37有头疽的致病菌主要是

- A.大肠杆菌
- B.类杆菌
- C.变形杆菌
- D.金黄色葡萄球菌
- E.溶血性链球菌

答案:D

解析:一般化脓性感染多为金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌。而有头疽的致病菌主要是金黄色葡萄球菌。皮下蜂窝组织炎多为溶血性链球菌致病。故本题选D。

159.(A1型题)41外科感染应用抗生素的原则是

- A.选择抗革兰阳性菌的抗生素
- B.选择抗革兰阴性菌的抗生素
- C.选择广谱抗生素
- D.根据病灶细菌培养和药物敏感试验选用抗生素
- E.早期、大剂量使用抗生素

答案:D

解析:外科感染应用抗生素要根据细菌培养及抗生素敏感试验结果指导选用抗菌药物,尽量停用广谱抗生素,改用对感染有效的窄谱抗生素。故本题选D。

160.(A1型题)45治疗急性阑尾炎瘀滞证,应首选青霉素加

- A.五味消毒饮
- B.阑尾化瘀汤
- C.阑尾清化汤
- D.阑尾清解汤
- E.黄连解毒汤

答案:B

解析:急性阑尾炎瘀滞证治宜行气活血,通腑泻热。应选用阑尾化瘀汤。故本题选B。

161.(A1型题)49治疗肠梗阻痞结证,应首选

- A.调胃承气汤
- B.大承气汤
- C.小承气汤
- D.增液承气汤
- E.大黄牡丹皮汤

答案:B

解析:肠梗阻痞结证治宜清热通里攻下,当选大承气汤。故本题选B。

162.(A1型题)53手术治疗乳晕部浅表脓肿,切口应在

- A.脓肿最软处作纵形切口
- B.脓腔最低位作放射状切口
- C.沿乳晕边缘作弧形切口
- D.波动感最明显处作斜形切口
- E.脓肿最高处作纵形切口

答案:C

解析:乳晕下脓肿应沿乳晕边缘作弧形切口。故本题选C。

163.(A1型题)57膀胱结石的主要症状是

- A.尿频、尿急
- B.脓尿
- C.尿痛
- D.排尿中断
- E.血尿

答案:D

解析:膀胱结石典型症状为排尿突然中断,并感疼痛。尿频、尿急、尿痛为膀胱刺激征,与血尿、脓尿均见于尿路感染。故本题选D。

164.(A1型题)61下列哪种疾病的早期可出现无症状性全程血尿

- A.膀胱炎
- B.前列腺炎
- C.肾癌
- D.膀胱结核
- E.膀胱结石

答案:C

解析:肾癌多见突发性无痛全程血尿。前列腺炎除血尿外还伴见疼痛和尿路刺激症状。膀胱炎和膀胱结核伴膀胱刺激征。膀胱结石主要症状为排尿中断,并感疼痛,少见血尿。故本题选C。

165.(A1型题)65脑复苏的主要治疗措施不包括

- A.巴比妥类药物治疗
- B.抗生素类药物治疗
- C.钙离子拮抗药治疗
- D.高压氧治疗
- E.低温-脱水疗法

答案:B

解析:脑复苏的主要治疗措施包括:巴比妥类药物治疗、钙离子拮抗药治疗、高压氧治疗、低温-脱水疗法以及其他药物治疗(皮质激素、自由基清除剂、催醒药、脑细胞营养药等)。故本题选B。

166.(A2型题)67患者,女,35岁。左腋下化脓性淋巴结炎溃破,疮口仍有较多脓腐。治疗应首选

- A.白降丹
- B.三石散
- C.九一丹
- D.平胥丹
- E.五五丹

答案:A

解析:白降丹为腐蚀药,适用于溃疡疮口太小、脓腐难去者。三石散为清热收涩药,适用于急性皮肤病渗液不多者。九一丹和五五丹为提脓祛腐药,适用于溃疡初期腐肉不脱、新肉不生者。平胥丹属平胥药,具平复胥肉作用,能使疮口增生的胥肉回缩。故本题选A。

167.(A2型题)71患者,72岁。烧伤1周后,神识淡漠,面色苍白,呼吸急促,口唇淡紫,体温36.5°C,四肢厥冷,脉细缓。其证型是

- A.气阴两伤
- B.阴损及阳
- C.胃阴伤败

D. 气血两亏

E. 热入营血

答案: B

解析: 阴损及阳证表现为面色苍白, 呼吸气微, 表情淡漠, 自汗肢冷, 体温不升反降, 脉细缓。气阴两伤证表现为精神疲倦, 气短懒言, 口干喜饮, 自汗, 盗汗, 舌淡苔少, 脉细弱。胃阴伤败证表现为面色萎黄, 纳呆食少, 腹胀便溏, 口干少津或口舌生糜, 舌干红, 苔花剥或无苔, 脉细数。气血两亏证表现为神疲倦卧, 气短懒言, 形体消瘦, 面色无华, 创面愈合迟缓, 舌淡, 苔薄白或薄黄, 脉细弱。热入营血证表现为壮热躁动, 口干唇燥, 大便秘结, 小便短赤, 舌红绛而干, 苔黄或黄糙或焦干起刺, 脉洪数。故本题选B。

168.(A2型题)74患者, 男, 20岁。初起颜面部红肿热痛, 肿势局限, 可见一个脓头, 3~5日化脓, 出脓即愈。应首先考虑的是

A. 疔

B. 痈

C. 急性淋巴管炎

D. 急性淋巴结炎

E. 痤疮

答案: A

解析: 疔的局部症状为初起有红、肿、热、痛的小结节, 逐渐肿大, 数天后脓栓脱落, 脓液排出, 炎症随之消退而愈。痈早期在局部呈片状稍隆起的紫红色浸润区, 随后中央形成多个脓栓, 破溃后呈蜂窝眼状, 相当于中医的有头疽。急性淋巴管炎浅部见一条或数条“红线”, 硬且明显压痛, 深部肢体明显肿胀和压痛, 淋巴管走行部位压痛更明显。急性淋巴结炎早期有局部淋巴结肿大和压痛, 后局部红肿热痛加剧。痤疮初为坚实丘疹, 挤之有白色粉样物质, 反复挤压形成大小不等的结节, 病程较长。故本题选A。

169.(A2型题)77患者, 男, 41岁。头面丹毒, 红肿, 恶寒发热, 口渴, 便秘溲黄, 舌红苔黄, 脉洪数。其证型是

A. 风热化火

B. 气血两燔

C. 湿热化火

D. 热毒蕴结

E. 热毒入营

答案: A

解析: 丹毒风热化火证发于头面部, 发热恶寒, 口干舌燥, 舌红, 苔薄黄, 脉洪数。故本题选A。

170.(A2型题)81患者, 男, 38岁。转移性腹痛2天。检查: 全腹压痛、反跳痛及轻度肌紧张, 肠鸣音减弱, 舌红苔黄腻, 脉洪数。其治法是

A. 通里攻下, 泻火解毒

B. 活血化瘀, 疏肝理气

C. 活血化瘀, 行气止痛

D. 清营解毒, 泻热养阴

E.理气开郁,疏肝利胆

答案:A

解析:该患者辨证为急性腹膜炎胃肠实热证,故治宜通里攻下,泻火解毒。故本题选A。

171.(A2型题)84患者,男,32岁。酗酒后突感左上腹剧痛,并向左腰部放射,伴发热,恶心呕吐。查体:腹平软,左上腹呈束带式压痛,肝、脾不大。应首先考虑的是

A.现为右上腹阵发性绞痛。C伴腹泻。D腹部无压痛,查心电图及心肌酶谱等可鉴别。E为中上腹持续性剧痛,与酗酒无关。

B.急性胰腺炎

C.急性肠炎

D.心肌梗死

E.急性胃炎

答案:B

解析:急性胰腺炎腹痛剧烈,起始于中上腹,也可偏重于右上腹或左上腹,放射至背部,累及全胰则呈腰带状向腰背部放射痛,伴恶心、呕吐、腹胀,可有发热、腹膜炎体征、黄疸等。

172.(A2型题)87患者,女,26岁。左侧急性乳腺炎7天,现左乳房红肿,疼痛剧烈,呈持续性搏动性疼痛,伴高热,口渴喜饮,舌苔黄,脉弦数。其治法是

A.疏肝清胃,通乳散结

B.清热解毒,通乳透脓

C.疏肝理气,化痰软坚

D.调理气血,通乳散结

E.行气活血,软坚散结

答案:B

解析:此为急性乳腺炎热毒炽盛证,且乳房里脓肿已成,治法应清热解毒,通乳透脓。故本题选B。

173.(A2型题)90患者,女,21岁。发现右侧乳腺外上象限一单个肿块3个月,呈卵圆形,约4cm×5cm大小,表面光滑,边缘清楚,质地坚韧,易推动,无压痛。应首先考虑的是

A.急性乳腺炎

B.乳腺囊性增生病

C.乳腺纤维腺瘤

D.乳房结核

E.乳腺癌

答案:C

解析:乳腺纤维腺瘤肿块较硬,边界清楚,表面光滑,活动度好,无压痛。急性乳腺炎包块边界不清,活动不受限,有明显疼痛。乳腺囊性增生病肿块边界不清,质韧,推之可移,有压痛。乳房结核肿块质硬,边界不清,往往和皮肤有粘连。乳腺癌肿块质硬,活动性差,边界不清。故本题选C。

174.(A2型题)93患者,女,45岁。1周前发现右乳外上结节,直径约2.5cm,较硬,不易推动,无压痛,乳头轻度内陷,皮肤呈橘皮样,右侧腋下触及一直径0.8cm的淋巴结,表面光滑,活动度好。应首先考虑的中医诊断是

- A.乳癖
- B.乳核
- C.乳岩
- D.乳癆
- E.乳痈

答案:C

解析:乳腺癌包块质硬,表面不光滑,边界不清,活动度差,无压痛,局部皮肤可有酒窝征,橘皮样改变,乳头可内陷、溢液,乳腺癌相当于中医学上的乳岩。乳腺囊性增生病,属于中医乳癖。乳房纤维腺瘤属中医乳核范畴,肿块圆形,表面光滑,边界清楚,活动度大。乳癆是乳房部的慢性化脓性疾病,相当于西医的乳房结核,肿块边界不清,皮肉相连,日久破溃。乳痈是指乳房部的急性化脓性病变。故本题选C。

175.(A2型题)96患者,男,45岁。既往有溃疡病史。突然大量呕血,面色苍白,冷汗出,手足冷,表情淡漠,舌淡苔白,脉细无力。其中医治法是

- A.清胃泻火
- B.益气固脱
- C.清肝泻火
- D.益气健脾
- E.温经散寒

答案:B

解析:患者因大量呕血导致气血不足,出现虚脱的症状,宜益气固脱,方用独参汤。故本题选B。

176.(A2型题)99患者,男,32岁。阴囊潮红,睾丸肿痛2天,伴发热恶寒,舌红苔黄腻,脉弦数。其治法是

- A.清热利湿,解毒消肿
- B.疏肝解毒,活血散结
- C.疏肝解郁,清热消肿
- D.凉血解毒,活血散结
- E.扶正托毒,散结解毒

答案:A

解析:据患者症状可诊断为睾丸炎湿热下注证,治宜清热利湿,解毒消肿。故本题选A。

177.(A2型题)102前列腺增生症患者,小便点滴不尽,小腹胀满疼痛,舌质紫暗,脉涩。治疗应首选

- A.五神汤加减
- B.枸橘汤加减
- C.抵当丸
- D.龙胆泻肝汤

E.知柏地黄丸

答案:C

解析:此属前列腺增生血瘀证,法应活血化瘀止痛,选用抵挡丸。故本题选C。

178.(A2型题)105患者Ⅱ期内痔,便血鲜红,便时有物脱出,口渴,大便秘结,舌苔黄,脉数。治疗应首选

A.龙胆泻肝汤

B.五神汤

C.归脾汤

D.小承气汤

E.凉血地黄汤

答案:E

解析:此属Ⅱ期内痔热伤肠络证,法应清热凉血,选用凉血地黄汤。故本题选E。

179.(B型题)106外科疾病中,风痛的特点是

A.痛无定处,忽此忽彼,走注甚速

B.皮色不红,不热,酸痛,得暖则痛缓

C.灼热疼痛,遇冷则痛减

D.肿势急胀,痛无止时,如有鸡啄,按之中软应指

E.皮色紫暗而胀痛

答案:A

解析:风痛特点为痛无定处,忽彼忽此,走注甚速。化脓痛的特点为痛势急胀,痛无止时,如同鸡啄,按之中软应指。B为寒痛特点。C为热痛特点。E为瘀血痛特点。故106题选A,107题选D。

180.(B型题)109清热法的代表方是

A.荆防败毒散

B.托里消毒散

C.五味消毒饮

D.龙胆泻肝汤

E.香贝养营汤

答案:C

解析:托里消毒散是益气托毒法代表方,用于脓疡毒势方盛,正气已虚,不能托毒外出。五味消毒饮是清热解毒法的代表方,用于热毒之证。A是解表法中辛温解表法的代表方。D是理湿法之清热利湿法的代表方。E是祛痰法之养营化痰法的代表方。故108题选B,109题选C。

181.(B型题)112口腔黏膜消毒,应首选

A.甲醛

B.石炭酸

C.0.1%新洁尔灭

D.0.5%亚硝酸钠

E.2.5%碘酊

答案:C

解析:口腔黏膜消毒应选用0.1%新洁尔灭,皮肤消毒一般选用2.5%碘酊。故112题选C,113题选E。

182.(B型题)114椎管内麻醉平面过高,可致

- A.血压下降
- B.呼吸抑制
- C.恶心呕吐
- D.头痛
- E.尿潴留

答案:A

解析:血压下降常发生于麻醉范围过广或高部位阻滞。呼吸抑制多见于高位硬膜外阻滞。恶心呕吐常由于血压骤降或手术牵拉内脏引起。头痛与脑脊液由针眼不断外渗到硬膜外腔有关,是椎管内麻醉的常见术后并发症。尿潴留是因支配膀胱排尿功能的神经恢复最慢或伤口致膀胱括约肌反射性痉挛。故114题选A,115题选D。

183.(B型题)117在短时间内输入所需血量者,适用于

- A.大出血
- B.中度缺水
- C.纠正贫血和低蛋白血症
- D.严重感染
- E.凝血异常

答案:A

解析:单纯贫血者应输红细胞混悬液,合并低蛋白血症者宜用全血,输血量取决于红细胞丢失的程度。急性大量失血患者应迅速恢复血容量并输红细胞。凝血异常除输新鲜血外,更重要还要输有关的凝血因子。严重感染要替换血液中的有害物质。故116题选C,117题选A。

184.(B型题)119属感染性休克的是

- A.机械性肠梗阻引起的休克
- B.注射青霉素引起的休克
- C.麻醉引起的休克
- D.急性重症胆囊炎引起的休克
- E.心肌梗死引起的休克

答案:D

解析:机械性肠梗阻可见呕吐,致体液丢失,有效循环血量减少,引起低血容量性休克。急性胆囊炎是胆囊管梗阻和细菌感染引起的炎症,易致感染性休克。B属过敏性休克。C属神经源性休克。E属心源性休克。故118题选A,119题选D。

185.(B型题)122烧伤患者,高热灼手,汗多气粗,口渴头痛,烦躁不安,舌红绛苔黄,脉洪数。其证型是

- A.火热伤津
- B.气阴两伤
- C.阴损及阳

D.气营两燔

E.热入营血

答案:E

解析:热入营血证表现为壮热躁动,口干唇燥,大便秘结,小便短赤,舌红绛而干,苔黄或黄糙或焦干起刺,脉洪数。火热伤津证候表现为壮热,口干唇燥,口渴喜饮,大便秘结,小便短赤,舌红而干,苔黄少津,脉细数。故122题选E,123题选A。

186.(B型题)125西医学的颈部急性淋巴结炎,相当于中医学的

A.蛇眼疔

B.红丝疔

C.颈痈

D.有头疽

E.烂疔

答案:C

解析:急性淋巴结炎相当于中医学的外痈,长于颈部的外痈称为颈痈。蛇眼疔相当于西医学的甲沟炎。红丝疔相当于西医学的急性淋巴管炎。西医学的痈中医学称为有头疽。烂疔相当于西医学的气性坏疽。故126题选D,127题选C。

187.(B型题)127发于新生儿的丹毒,其病机多为

A.风热毒蕴

B.胎火蕴毒

C.湿热毒蕴

D.火毒炽盛

E.肝经郁火

答案:B

解析:丹毒的风热毒蕴证发生于头面部。胎火蕴毒证发生于初生儿。湿热毒蕴证发生于下肢。肝经郁热证发生于腰胯肋下。故126题选A,127题选B。

188.(B型题)130来自间叶组织的恶性肿瘤,称为

A.癌

B.瘤

C.肉瘤

D.临界瘤

E.纤维瘤

答案:C

解析:肉瘤是来自于间叶组织的恶性肿瘤。癌是来自上皮组织的恶性肿瘤。瘤是来自于上皮组织的良性肿瘤。介于良性与恶性肿瘤间的过渡性肿瘤称为临界瘤。纤维瘤是良性肿瘤。故130题选C,131题选A。

189.(B型题)133急性阑尾炎湿热证,右下腹疼痛,口渴不多饮,大便溏而不爽,舌苔黄腻,脉弦数。治疗以通里攻下为主,还应

A.行气祛瘀,佐以清热解毒

B.活血祛瘀,佐以清热利湿

- C.清热利湿, 佐以行气活血
- D.清热解毒, 佐以行气凉血
- E.行气凉血, 佐以利湿消肿

答案:C

解析:急性阑尾炎瘀滞证治法以行气活血, 通腑泻热为主, 脘腹胀闷, 大便秘结为胃肠热毒积聚, 故应佐以清热解毒。急性阑尾炎湿热证治法以通腑泻热, 利湿解毒为主, 同时为防湿热致气血瘀滞, 故佐以行气活血。故132题选A, 133题选C。

190.(B型题)135最易嵌顿的疝, 是指

- A.腹股沟斜疝
- B.腹股沟直疝
- C.股疝
- D.肠梗阻
- E.睾丸鞘膜积液

答案:A

解析:腹股沟斜疝肿块常在站立、行走、咳嗽或劳动时出现, 多呈带蒂柄的梨形, 并可降至阴囊或大阴唇, 平卧时肿块可向腹腔回纳而消失。腹股沟直疝当病人直立时, 在腹股沟内侧端、耻骨结节上外方出现一半球形肿物, 平卧时可消失。嵌顿性疝通常发生在斜疝, 强劳力或排便等腹内压骤增是其主要原因, 临床上表现为疝块突然增大, 并伴有明显疼痛, 平卧或用手推送不能使肿物回纳, 肿物紧张发硬, 且明显触痛。故134题选A, 135题选A。

191.(B型题)137患者左输尿管结石, 停留日久不移, 外形不整, 腰部胀痛, 舌有瘀点, 脉沉涩。其治法是

- A.滋阴清热, 通淋排石
- B.行气利水, 通淋排石
- C.清热利湿, 消石通淋
- D.理气祛瘀, 软坚排石
- E.健脾益气, 通淋排石

答案:D

解析:肾结石患者证属脾虚气滞, 治法应为健脾益气, 通淋排石。输尿管结石患者证属气滞血瘀, 法应理气祛瘀, 软坚排石。故136题选E, 137题选D。

192.(A1型题)1女性外阴发生感染时, 最易形成炎症及脓肿的部位是

- A.大阴唇
- B.小阴唇
- C.前庭大腺
- D.阴道前庭
- E.处女膜

答案:C

解析:前庭大腺位于阴道口的两侧, 大阴唇的后部, 腺管开口与前庭后方小阴唇与处女膜之间的沟内, 此处容易细菌滋生和存活, 所以一旦女性外阴发生感染时, 细菌容易侵犯腺体导致其形成炎症及脓肿。故本题选C。

193.(A1型题)3下列叙述, 正确的是

- A.子宫古称产户
- B.阴道古称产道
- C.外阴古称毛际
- D.处女膜古称阴户
- E.子宫颈口古称阴门

答案:B

解析:子宫古称胞宫, 又名女子胞、子处、子脏、血室、胞脏等。阴道, 又名子肠、产道、地道。子门, 又名子户, 是指子宫颈口的部位, 是排出月经和娩出胎儿的关口。阴户, 又名四边, 即外阴, 系指女性阴蒂、大小阴唇、阴唇系带及阴道前庭的部位。玉门, 又名龙门、胞门, 是指外生殖器的阴道口及处女膜的部位。阴阜古称毛际。故本题选B。

194.(A1型题)6胞宫的功能是

- A.产生卵子
- B.主月经
- C.司血海, 主疏泄
- D.主第二性发育
- E.产生性激素

答案:B

解析:它具有蓄经、行经、育胎、分娩的功能。故本题选B。

195.(A1型题)10雌激素的生理功能是

- A.使阴道上皮细胞增生、角化
- B.使增生期子宫内膜转变为分泌期内膜
- C.促进卵发育, 使成熟卵泡排卵
- D.促进黄体发育生成
- E.刺激生乳素的分泌

答案:A

解析:①子宫:能促使子宫发育, 子宫内膜增生和肌层增厚;增加子宫平滑肌对缩宫素的敏感性;使子宫颈管黏液分泌量增加, 质变稀薄, 拉丝度延长, 以利于精子的通过, 宫颈涂片干燥后镜检可见羊齿植物叶状结晶。②卵巢:协同促卵泡素促进卵泡发育。③输卵管:增强输卵管的蠕动, 有利于孕卵的输送。④阴道:使上皮细胞增生、角化, 细胞内糖原增加, 保持阴道弱酸性环境。⑤乳房:使乳腺腺管增生, 乳头和乳晕着色。大剂量雌激素可抑制乳汁分泌。⑥垂体:通过对下丘脑的正负反馈作用, 影响脑垂体促性腺激素的分泌。⑦促使女性第二性征发育。⑧促进水钠潴留。⑨促进骨中钙的沉积, 加速骨骺闭合。故本题选A。

196.(A1型题)13黄体发育成熟的时间, 大约在排卵后的

- A.4~5天
- B.7~8天
- C.9~10天
- D.11~12天
- E.13~14天

答案:B

解析:黄体发育成熟的时间,大约在排卵后的7~8天。故本题选B。

197.(A1型题)16中医学的“居经”是指

- A.月经1月两行
- B.月经2月一行
- C.月经3月一行
- D.终身不来月经而能受孕
- E.受孕之初,仍按月少行经

答案:C

解析:参见15题。故本题选C。

198.(A1型题)19下列关于枕前位分娩机制,判定产程进展的重要标志是

- A.衔接
- B.下降
- C.内旋转
- D.俯屈
- E.仰伸

答案:B

解析:由于下降动作贯穿于分娩全过程。下降动作成间歇性,宫缩时胎头下降,间歇时胎头又稍退缩。而其他选项均未贯穿分娩全过程。故本题选B。

199.(A1型题)22治疗肝肾不足、冲任损伤导致妇产科疾病的常用方剂有

- A.养精种玉汤、左归饮、内补丸
- B.左归饮、内补丸、一贯煎
- C.养精种玉汤、左归饮、调肝汤
- D.调肝汤、左归饮、内补丸
- E.调肝汤、一贯煎、养精种玉汤

答案:E

解析:肝肾不足,冲任损伤导致妇产科疾病的常用方剂调肝汤、一贯煎、养精种玉汤。故本题选E。

200.(A1型题)24妊娠剧吐,除哪项外,均应考虑终止妊娠

- A.经积极治疗病情无改善
- B.体温高于38℃
- C.心率大于120次/分
- D.呕吐物中有胆汁
- E.出现黄疸

答案:D

解析:妊娠剧吐出现体温高于38℃、心率大于120次/分、持续黄疸或蛋白尿、精神萎靡不振,经积极治疗病情无改善应考虑终止妊娠。故本题选D。

201.(A1型题)30中医学认为,异位妊娠最主要的病因病机是

- A.冲任虚弱

- B.肾气不足
- C.寒凝气滞
- D.痰湿阻胞
- E.少腹血瘀

答案:E

解析:中医认为本病的病因病机:一因虚,主要是脾肾气虚,不能把孕卵及时送达胞宫;二因阻,孕卵受到阻滞,不能送达胞宫。由于孕卵未能移行至胞宫,而居于胞脉,久而胞脉破损,血溢妄行,离经之血淤积少腹,气机阻滞,不通则痛,形成少腹血瘀证。最主要的病因病机为少腹血瘀。故本题选E。

202.(A1型题)33治疗子肿脾虚证的代表方剂是

- A.参苓白术散
- B.全生白术散
- C.鲤鱼汤
- D.四君子汤
- E.天仙藤散

答案:B

解析:参见32题。故本题选B。

203.(A1型题)35白术散适用于妊娠高血压综合症的哪种证型

- A.脾虚湿盛
- B.肾虚水泛
- C.气滞湿阻
- D.脾虚肝旺
- E.阴虚肝旺

答案:A

解析:参见32题。故本题选A。

204.(A1型题)38产后发热感染邪毒证的治法是

- A.清热解毒,泻下逐瘀
- B.清热解毒,活血化瘀
- C.解毒排脓,逐瘀通腑
- D.清热透邪,生津止渴
- E.清营解毒,凉血养阴

答案:B

解析:产后发热感染邪毒证的治法为清热解毒,活血化瘀,主方用五味消毒饮合失笑散加减。

205.(A1型题)42滴虫性阴道炎带下的特点是

- A.黄绿色脓性
- B.匀质稀薄状
- C.赤白带相兼
- D.白色豆腐渣样
- E.灰黄色泡沫样

答案:E

解析:滴虫性阴道炎妇科检查可发现阴道内有较多黄绿或灰黄色带泡沫的分泌物,阴道黏膜充血,重者可出现出血点。A、B见于细菌性阴道病。C见于老年性阴道炎。D见于念珠菌阴道炎。故本题选E。

206.(A1型题)44治疗霉菌性阴道炎,应首选

- A. 柏己片塞药加3%小苏打液冲洗
- B. 制霉菌素塞药加蛇床子散煎液冲洗
- C. 灭滴灵塞药加蛇床子散煎液冲洗
- D. 柏己片塞药加1%乳酸液冲洗
- E. 灭滴灵塞药加3%小苏打液冲洗

答案:B

解析:治疗念珠菌阴道炎宜首选制霉菌素塞药加蛇床子散煎液冲洗。故本题选B。

207.(A1型题)47治疗慢性宫颈炎(宫颈糜烂),应首选

- A. 外用黄蜈散II号加物理疗法
- B. 外用制霉菌素栓加塌痒方
- C. 灭滴灵塞药加蛇床子散煎液冲洗
- D. 口服知柏地黄汤加1%醋酸液冲洗
- E. 外用制霉菌素栓加1%乳酸液冲洗

答案:A

解析:治疗慢性宫颈炎(宫颈糜烂)应该药物加物理疗法同时应用,宜外用黄蜈散II号加物理疗法。故本题选A。

208.(A1型题)52疑子宫内膜脱落不全者,取宫内膜送病检的时间是

- A. 经来潮24小时内
- B. 月经来潮第5天
- C. 月经干净后3天
- D. 月经干净后7天
- E. 月经干净后10天

答案:B

解析:子宫内膜不规则脱落者,月经第5~6天诊刮,刮出内膜送检提示仍可见分泌期改变内膜,且与出血期及增殖期内膜并存。故本题选B。

209.(A1型题)55治疗排卵期出血肾阳虚证,应首选

- A. 健固汤加孕激素
- B. 举元煎加雄激素
- C. 健固汤加雄激素
- D. 健固汤加雌激素
- E. 举元煎加孕激素

答案:D

解析:排卵期出血肾阳虚证宜补脾渗湿,配合补充雌激素,方选健固汤加雌激素。故本题选D。

210.(A1型题)57治疗黄体功能不全脾气虚弱证,应首选

- A.补中益气汤
- B.两地汤合二至丸
- C.当归补血汤
- D.四君子汤
- E.左归丸合二至丸

答案:A

解析:黄体功能不全脾气虚弱证宜益气摄血固冲,方选补中益气汤。B用于阴虚血热证。C用于血虚证。D用于益气健脾,不适于功血。E用于肾阴虚证。故本题选A。

211.(A1型题)59治疗因口服避孕药所致月经不调肾阳虚证,应首选

- A.失笑散合四物汤
- B.左归丸合二至丸
- C.右归丸合二至丸
- D.保阴煎合失笑散
- E.举元煎合失笑散

答案:C

解析:月经不调肾阳虚证,方选右归丸合二至丸滋肾益阴,固冲止血。故本题选C。

212.(A1型题)62治疗月经先期阴虚血热型,应首选

- A.两地汤加孕激素
- B.举元煎加雄激素
- C.健固汤加雄激素
- D.健固汤加孕激素
- E.右归丸加雌激素

答案:A

解析:月经先期阴虚血热型症见月经提前,量少、色红、质稠,两颧潮红,手足心热,舌质红,舌苔少,脉细数。滋阴凉血止血,方选两地汤,西医治宜补充孕激素调经。故本题选A。

213.(A1型题)65治疗闭经肝肾不足证,应首选

- A.归肾丸
- B.金匱肾气丸
- C.二至丸
- D.右归丸
- E.六味地黄丸

答案:A

解析:治疗闭经肝肾不足证应首选归肾丸补肾养肝调经。故本题选A。

214.(A1型题)68下列哪项不是原发性痛经寒湿凝滞证的临床表现

- A.经前、经期小腹冷痛
- B.经量少、色暗、有块

- C.畏寒身痛
- D.妇检子宫增大、有压痛
- E.舌质暗,脉沉紧

答案:D

解析:原发性痛经寒湿凝滞证的临床表现经前、经期小腹冷痛,经量少、色暗、有块,畏寒身痛,舌质暗,苔白腻,脉沉紧。故本题选D。

215.(A1型题)71治疗经前期综合征肝郁气滞证,应首选的方剂是

- A.逍遥散
- B.柴胡疏肝散
- C.血府逐瘀汤
- D.滋水清肝饮
- E.丹栀逍遥散

答案:B

解析:经前期综合征肝郁气滞证治宜疏肝解郁、理气调经。方用柴胡疏肝散。故本题选B。

216.(A1型题)74黏膜下子宫肌瘤患者,有生育要求者,应首选的治疗措施是

- A.子宫肌瘤摘除术
- B.子宫全切术
- C.维生素加桂枝茯苓丸
- D.孕激素加桂枝茯苓丸
- E.纠正贫血加桂枝茯苓丸

答案:A

解析:黏膜下子宫肌瘤患者有生育要求者应该选择子宫肌瘤摘除术。故本题选A。

217.(A1型题)77治疗子宫肌瘤阴虚内热证应首选

- A.桂枝茯苓丸
- B.膈下逐瘀汤
- C.参茜固经冲剂
- D.逐瘀止血汤
- E.清海丸

答案:E

解析:子宫肌瘤阴虚内热证治宜滋阴清热,化瘀消癥,方选清海丸。故本题选D。

218.(A1型题)80治疗子宫内膜异位症气滞血瘀证,应首选的方剂是

- A.温经汤
- B.桃红四物汤
- C.少腹逐瘀汤
- D.失笑散
- E.膈下逐瘀汤

答案:E

解析:子宫内膜异位症气滞血瘀证治宜疏肝理气,活血化瘀,方用膈下逐瘀汤。C治疗寒凝血瘀证。故本题选E。

219.(A1型题)83治疗不孕症之肾虚证,应首选

- A.养荣壮肾汤
- B.开郁种玉汤
- C.归肾丸合五子衍宗丸
- D.湿土毓麟汤
- E.归脾汤

答案:C

解析:肾虚不孕症之治疗无论气虚、阳虚还是阴虚均宜温养肾气,填精益血,所以首选归肾丸合五子衍宗丸。故本题选C。

220.(B型题)132中医称之为屡孕屡堕者,是指

- A.先兆流产
- B.难免流产
- C.不全流产
- D.完全流产
- E.习惯性流产

答案:E

解析:难免流产一般多由先兆流产发展而来。此时阴道流血增多,阵发性腹痛逐渐加剧,或出现阴道流水(胎膜破裂)。检查示宫颈口已扩张,有组织物堵塞或有水流出,或见胎膜囊膨出,子宫与停经周数符合或较小。中医称为胎动欲堕。习惯性流产中医称为屡孕屡堕或滑胎。A中医称为胎漏、胎动不安。C中医称堕胎、小产。D中医称堕胎、小产。故131题选B,132题选E。

221.(B型题)133患者停经3个月余,子宫如孕40天大小。应首先考虑的是

- A.胎动不安
- B.滑胎
- C.完全流产
- D.过期流产
- E.感染性流产

答案:D

解析:过期流产即稽留流产,指胚胎或胎儿在宫内已死亡后仍未自然排出者。妊娠诊断肯定,曾有先兆流产症状或无,之后妊娠反应消失,妊娠试验转为阴性。检查:子宫不再增大或反而减小,胎动消失,检查子宫较停经月份小,质地不软,子宫颈口闭。感染性流产主要发生于各类流产后,除流产的一般症状外,主要伴有高热寒战、腹痛等感染症状。故133题选D,134题选E。

222.(B型题)137治疗闭经肝肾不足证,应首选

- A.左归丸
- B.右归丸
- C.归肾丸
- D.血府逐瘀汤
- E.苍附导痰丸

答案:C

解析:闭经肝肾不足证治以补益肝肾,调理冲任,方用归肾丸。痰湿阻滞证治以健脾燥湿化痰,活血调经,方用苍附导痰丸加减。A用于肾阴虚证。B用于肾阳虚证。D用于气滞血瘀证。故137题选C,138题选E。

223.(B型题)140治疗子宫肌瘤阴虚内热证,应首选

- A.桂枝茯苓丸
- B.膈下逐瘀汤
- C.参茜固经冲剂
- D.逐瘀止血汤
- E.清海丸

答案:E

解析:子宫肌瘤寒湿凝滞的治疗宜散寒除湿、活血消癥,方选桂枝茯苓丸。阴虚内热证的治疗宜滋阴清热,活血消癥,方选清海丸。故139题选A,140题选E。

224.(B型题)144疑诊子宫内膜脱落不全,选择诊断性刮宫的时间是

- A.月经来潮第6天
- B.月经来潮第5天
- C.月经来潮第3天
- D.月经来潮第2天
- E.月经来潮6小时内

答案:B

解析:对于不孕症或功能失调性子宫出血患者,应选在月经前或月经来潮后6小时内刮宫,以判断有无排卵或黄体功能不足。子宫内膜脱落不全的诊断:BBT高温期有少量子宫出血,BBT下降后子宫出血增多如月经量,并按时停止。子宫出血第5天子宫内膜活检仍有分泌相。故143题选E,144题选B。

225.(A1型题)2在小儿年龄分组中,婴儿期是指

- A.出生后至满1周岁之前
- B.1周岁至满3周岁
- C.自出生脐带结扎时起,至生后足28天
- D.3周岁后(第4年)至入小学前(6~7岁)
- E.8岁至12岁

答案:A

解析:参见1题。故本题选A。

226.(A1型题)6小儿体格发育最快的时期是

- A.婴儿期
- B.新生儿期
- C.学龄前期
- D.学龄期
- E.幼儿期

答案:A

解析:小儿体格发育最快的时期是婴儿期,初步适应了外界环境,生长迅速。B小儿适应能力及御邪能力较差,易出现疾患。C小儿发育稳步增长,智力发育日趋完善。D小儿发育仍稳步增长。E小儿体格增长较婴儿期缓慢。故本题选A。

227.(A1型题)8小儿1岁时,头围是

- A.38cm
- B.46cm
- C.50cm
- D.52cm
- E.64cm

答案:B

解析:一般孩子出生时头围在33~34cm。在第一年的前3个月和后9个月头围都增长6cm,故1岁时头围为46cm;生后第二年头围增长减慢,2岁时头围48cm;5岁时为50cm;15岁时头围接近成人为54~58cm。故本题选B。

228.(A1型题)11小儿时期最易发病的两脏是

- A.脾肾
- B.肝肾
- C.肺肾
- D.肺脾
- E.肺肝

答案:D

解析:小儿时期行气未充,发病容易,最易表现在肺脾系疾病及肾系疾病、传染病方面。故本题选D。

229.(A1型题)14察指纹的适用年龄是

- A.5岁以内
- B.4~5岁
- C.4岁以内
- D.3~4岁
- E.3岁以内

答案:E

解析:察指纹是对3岁以内的小儿用以代替脉诊的一种辅助诊法,用以辨别婴幼儿疾病的病因、性质并估计预后等。故本题选E。

230.(A1型题)16下列各项,属于早产儿生理性黄疸特点的是

- A.黄疸出现后,7~8天完全消退
- B.黄疸出现后,10~14天完全消退
- C.黄疸出现后,15~20天完全消退
- D.黄疸出现后,21~28天完全消退
- E.黄疸出现后,30~35天完全消退

答案:D

解析:新生儿生理性黄疸大多在生后2~3天出现,4~6天达高峰,7~10天消退,早产儿生后3~4天出现,持续时间较长,可达3~4周,除轻微食欲不振外,一般无其他临床症状。故本题选D。

231.(A1型题)20新生儿生理性黄疸出现的时间是

- A.出生后24小时内
- B.出生后2~3天
- C.出生后1周
- D.出生后10天
- E.出生后12天

答案:B

解析:新生儿生理性黄疸大多在生后2~3天出现,4~6天达高峰,7~10天消退,早产儿持续时间较长可达3~4周,除轻微食欲不振外,一般无其他临床症状。故本题选B。

232.(A1型题)24下列各项,不属病毒性心肌炎临床诊断依据的是

- A.心功能不全或心源性休克
- B.心脏扩大
- C.肌酸磷酸激酶同工酶升高
- D.心电图表现为完全性右或左束支阻滞
- E.ST-T段改变, T波高耸

答案:D

解析:病毒性心肌炎临床可见心功能不全、心源性休克或心脑综合征;心脏扩大;肌酸磷酸激酶同工酶升高;心电图改变:I、II、aVF、V₁~V₅导联中两个或两个以上出现ST-T段改变, T波高耸。故本题选D。

233.(A1型题)28婴幼儿腹泻湿热泄泻证的治法是

- A.消食导滞, 和中止泻
- B.疏风散寒, 理气化湿
- C.补脾温肾, 固涩止泻
- D.清热利湿, 清肠止泻
- E.健脾益气, 升提助运

答案:D

解析:婴幼儿腹泻湿热泄泻证治以清热利湿、清肠止泻,方用葛根黄芩黄连汤。A用于伤食泻。B用于风寒泻。C用于脾肾阳虚泻。E用于脾虚泻。故本题选D。

234.(A1型题)31下列哪项不是小儿急性肾炎的临床特征

- A.多数患儿都有血尿
- B.病程早期常有高血压
- C.部分病例可出现急性肾功能不全
- D.血压急剧升高时可出现高血压脑病
- E.浮肿为可凹性、上行性

答案:E

解析:小儿急性肾炎的临床特征有浮肿及尿量较少,浮肿为非凹陷性;血尿;高血压。并发症有高血压性脑病,严重循环充血,急性肾衰竭。血清总补体及C₃可一过性明显下降,6~8周可恢复。故本题选E。

235.(A1型题)34小儿哮喘发作期的病机是

- A.风寒犯肺,肺气失宣
- B.外邪犯肺,肺气郁闭
- C.感受外邪,袭于肺卫
- D.风热犯肺,肺失清肃
- E.外邪袭肺,触动伏痰

答案:E

解析:小儿哮喘发作期的病机关键是痰饮内伏,遇外来因素感触而发,反复不已。六淫之邪入于肺经,肺失宣肃,肺气不利,引动伏痰,痰气交阻于气道,痰随气升,气因痰阻,相互搏击而发哮喘。故本题选E。

236.(A1型题)38婴儿手足搐搦症是由于缺乏

- A.维生素D
- B.维生素C
- C.维生素B₁₂和叶酸
- D.铁
- E.锌

答案:A

解析:手足搐搦症绝大多数见于婴儿时期,主要是由于维生素D缺乏以致血清钙低落,神经肌肉兴奋性增强,出现惊厥和手足搐搦等症状。故本题选A。

237.(A1型题)42治疗风疹邪郁肺卫证,应首选

- A.银翘散
- B.桑菊饮
- C.麻杏石甘汤
- D.葶苈大枣泻肺汤
- E.五虎汤

答案:A

解析:风疹邪郁肺卫证治以疏风清热、清肺利咽,方用银翘散加减。故本题选A。

238.(A1型题)46流行性腮腺炎主要侵犯的经脉是

- A.足厥阴肝经
- B.足少阳胆经
- C.足太阳膀胱经
- D.足阳明胃经
- E.足少阴肾经

答案:B

解析:参见45题。故本题选B。

239.(A1型题)50下列哪项不是小儿厌食胃阴不足证的证候特征

- A.食少饮多
- B.皮肤欠润
- C.大便偏干
- D.面色不华
- E.舌红苔黄腻

答案:E

解析:厌食胃阴不足证表现为不思饮食,食少饮多,口舌干燥,皮肤欠润,形体偏瘦,小便短黄,大便干结,烦躁少寐,手足心热,舌红少津,苔少或花剥,脉细数。E为湿热证的表现。故本题选E。

240.(A2型题)54患儿,男,3岁。两个月来午后低热,盗汗,乏力,日渐消瘦。问病史时应特别注意的是

- A.反复呼吸道感染史
- B.喂养史
- C.乙肝疫苗接种史
- D.结核病人密切接触史
- E.乙肝病人接触史

答案:D

解析:根据患儿午后低热、盗汗、乏力及消瘦两月的临床症状,首先怀疑结核病,因此针对该病询问有无结核病接触史以进一步明确或排除结核病。故本题选D。

241.(A2型题)58足月女婴,25天。出生后2周出现身黄,目黄,其色晦暗,持续不退,精神倦怠,四肢欠温,不欲吮乳,大便溏薄,小便短少,舌质偏淡,舌苔白腻。治疗应首先考虑的方剂是

- A.茵陈理中汤
- B.茵陈蒿汤
- C.血府逐瘀汤
- D.茵陈四苓汤
- E.茵陈四逆汤

答案:A

解析:足月患儿,25天出现黄疸,可诊断为病理性黄疸。寒湿蕴阻脾胃,肝胆疏泄失常而出现面目皮肤发黄,其色晦暗,持续不退。湿阻脾胃,脾失健运而见呕吐腹胀、不思乳食。舌苔及指纹亦为湿阻脾胃之证,故辨证为寒湿阻滞,治以温中化湿,方用茵陈理中汤。B用于湿热黄疸证。C用于气滞血瘀证。D用于湿热黄疸,湿重于热者。E用于黄疸阴证。故本题选A。

242.(A2型题)63患儿,1岁。腹泻2天,泻下急迫,大便如水注,有黏液及腥臭味,伴发热,烦躁口渴,肢体困倦,小便短赤,肛门灼热,发红。其证型是

- A.伤食
- B.风寒
- C.脾虚
- D.湿热
- E.脾肾阳虚

答案:D

解析:小儿湿热内盛,湿困脾阳,运化失职,湿盛而见泻下急迫,大便如注,伴有黏液及腥臭味。湿邪夹热而见发热,烦躁口渴,小便短赤,肛门灼热、发红。故可辨证为湿热。故本题选D。

243.(A2型题)67患儿,男,3岁。腹泻2天,大便如蛋花汤样,泻下急迫,气味臭秽,食欲不振,发热烦躁,口渴,小便短黄,舌质红,苔黄腻,指纹紫。其证型是

- A.伤食泻
- B.寒湿泻
- C.风寒泻
- D.湿热泻
- E.脾虚泻

答案:D

解析:湿热之邪,蕴结肠胃气机,下注大肠,传化失司,故泻下稀如水样,气味秽臭。热性急迫,湿热交蒸,壅遏胃肠气机,故泻下急迫,量多。湿热困脾胃,故纳差食少,神疲乏力。伴有外感,则有发热,热重于湿者,故口渴饮引。湿热在下,则小便短黄。故辨证为湿热泄泻。故本题选D。

244.(A2型题)71患儿,8岁,颜面浮肿1个月,近日来波及下肢。查体:血压128/83mmHg。实验室检查:尿常规蛋白(+++),红细胞40~60个/高倍视野。应首先考虑的是

- A.肾炎性肾病
- B.急性泌尿系感染
- C.慢性肾炎
- D.单纯性肾病
- E.以上均非

答案:A

解析:患儿以浮肿、高血压为主要表现,实验室检查提示尿蛋白、血尿。首先考虑为肾炎性肾病。B以尿频、尿急、尿痛为主要表现,尿常规见白细胞增多。C也以浮肿、高血压为主要表现,有血尿及蛋白尿,此类症状持续1年以上方可诊断此病。D全身水肿,大量蛋白尿,低蛋白血症,高脂血症。故本题选A。

245.(A2型题)75患儿,男,12岁。哮喘病史5年。面色白,气短懒言,语声低微,倦怠乏力,自汗畏冷,四肢不温,脉细无力。其诊断是

- A.哮喘缓解期,肺脾气虚证
- B.哮喘缓解期,肾虚失纳证
- C.哮喘缓解期,阴虚肺热证
- D.哮喘缓解期,肺阴亏损证
- E.寒性哮喘

答案:A

解析:患儿已有哮喘病史5年,且无急性发作,故诊断为哮喘缓解期。脾气虚见面色白、四肢不温、倦怠乏力,肺气虚可见气短懒言、语声低微、自汗,脉细无力为肺脾气虚证的表现,故辨证为肺脾气虚证。故本题选A。

246.(A2型题)78患儿,男,1岁。明显消瘦,体重65kg,面色萎黄,毛发稀疏,懒言少语,大便酸臭,尿短黄,舌淡苔腻。查体:腹部膨胀,腹部皮下脂肪0.3cm。诊断为营养不良,其程度及证型是

- A.Ⅱ度,疳积
- B.Ⅰ度,疳证
- C.Ⅰ度,疳积
- D.Ⅱ度,疳证
- E.Ⅲ度,干疳

答案:D

解析:营养不良可分为三度。Ⅰ度:体重比正常平均体重减少15%~25%,皮下脂肪厚度小于0.8cm。肌肉不坚实,皮肤颜色正常或稍苍白。身高及一般状态尚无变化。Ⅱ度:体重比正常平均体重减少25%~40%,身高也低于正常。腹部皮下脂肪层几乎完全消失,皮肤苍白、松弛而失去弹性。Ⅲ度:体重比正常平均体重减少40%以上,90%的脂肪消失,身高也低于正常。发育迟缓,此时臀部和面部的皮下脂肪层已消失,预后严重。本患儿可诊断为营养不良Ⅱ度。而营养不良的中医诊断即为疳证。故本题选D。

247.(A2型题)82患儿,女,2岁。体重9kg。纳呆,面色少华,性急易怒,大便干稀不调,舌质淡,苔薄微腻,指纹淡。其诊断是

- A.厌食
- B.疳气
- C.疳积
- D.干疳
- E.积滞

答案:B

解析:根据患儿的临床表现可诊断为疳证。中医认为疳证分为疳气、疳积及干疳。疳气仅表现为面黄发疏,食欲欠佳,精神如常,形体略瘦,大便不调等脾胃不和之症;疳积则出现形体明显消瘦,肚腹膨隆,烦躁多啼等脾虚夹积症状;若出现全身肌肉消削,貌似老人,腹凹如舟,精神萎靡,即为干疳阶段。故此患儿可诊断为疳气。故本题选B。

248.(A2型题)85患儿,5岁。发热,两侧腮腺肿大,张口及吃硬食物疼痛加重。查体:体温38.5℃,双侧肿大腮腺以耳垂为中心向周边蔓延,表面灼热有触痛,无波动感。实验室检查:血白细胞总数 $40 \times 10^9/L$,中性粒细胞42%,淋巴细胞58%。应首先考虑的是

- A.腮腺管阻塞
- B.淋巴结炎
- C.颌下腺炎
- D.流行性腮腺炎
- E.化脓性腮腺炎

答案:D

解析:流行性腮腺炎起病大多较急,无前驱症状。有发热、畏寒、头痛、咽痛、食欲不佳、恶心呕吐、全身疼痛等表现,数小时腮腺肿痛,逐渐明显,体温可达39℃以上,成人患者一般较严重。腮腺肿胀最具特征性,一般以耳垂为中心,向前、后、

下发展, 状如梨形, 边缘不清; 局部皮肤紧张, 发亮但不发红, 触之坚韧有弹性, 有轻触痛。患儿白细胞及中性粒细胞数不高, 淋巴细胞数升高, 可排除化脓性腮腺炎。另根据患儿两侧腮腺肿大及向耳垂两边蔓延的表现, 可明确诊断为流行性腮腺炎。故本题选D。

249.(A2型题)89患儿, 男, 4岁。咳嗽1周, 痰多, 色白而稀, 喉间痰声辘辘, 神乏困倦, 胸闷纳呆。舌淡红, 苔白腻, 脉滑。其证型是

- A. 风寒咳嗽
- B. 风热咳嗽
- C. 痰湿咳嗽
- D. 痰热咳嗽
- E. 气虚咳嗽

答案: C

解析: 湿生于脾, 脾湿盛者, 酿液成痰, 贮阻肺络, 故痰多。湿为阴邪, 故痰白。痰阻气道, 故喉间痰声辘辘。神乏困倦、胸闷纳呆、舌脉均为湿邪之象。故辨证为痰湿咳嗽。故本题选C。

250.(A2型题)92患儿, 男, 1岁。素不欲食, 强迫进食则脘腹胀满, 舌苔白腻, 脉细缓。其诊断是

- A. 厌食, 胃阴不足证
- B. 厌食, 脾运失健证
- C. 厌食, 脾胃气虚证
- D. 疳病, 疳证
- E. 疳病, 疳积

答案: C

解析: 参见91题。故本题选C。

251.(B型题)94新生儿的头围, 平均是

- A. 54cm
- B. 50cm
- C. 46cm
- D. 42cm
- E. 34cm

答案: E

解析: 足月儿出生时头围约为33~34cm, 出生后前3个月和后9个月各长6cm, 1周岁时约为46cm, 2周岁时约为48cm, 5周岁时增至50cm, 15岁接近成人约54~58cm。

252.(B型题)98小儿生理特点是

- A. 不易发病, 传变迅速
- B. 发病容易, 传变迅速
- C. 脏腑娇嫩, 形气未充
- D. 发病容易, 传变较缓
- E. 脏器清灵, 传变迅速

答案:C

解析:小儿生理特点是生机蓬勃,发育迅速;脏腑娇嫩,形气未充。小儿病理特点是发病容易,传变迅速;脏腑清灵,易趋康复。

253.(B型题)101小儿虚热证的脉象是

- A.沉而有力
- B.数而有力
- C.数而无力
- D.浮而无力
- E.迟而有力

答案:C

解析:小儿实热证多表现为脉有力且快,即数而有力。虚热证则表现为脉无力且速率慢,即数而无力。A是里实证的脉象。D是表虚证的脉象。E是寒实证的脉象。故100题选B,101题选C。

254.(B型题)104咽-结膜热的主要病原体是

- A.柯萨奇病毒
- B.合胞病毒
- C.轮状病毒
- D.腺病毒
- E.流感病毒

答案:D

解析:咽-

结膜热的主要病原体是腺病毒3、7型所致,常发生于春夏季,以发热、咽炎、结膜炎为特征。80%婴幼儿腹泻是由病毒感染引起的,病毒性肠炎主要病原为轮状病毒,其次为肠道病毒(包括柯萨奇病毒、埃可病毒、肠道腺病毒)。B可引起呼吸道合胞病毒肺炎。故104题选D,105题选C。

255.(B型题)107病毒性心肌炎痰瘀阻络证的证候有

- A.心悸不宁,胸闷憋气,心前区痛如针刺,舌质紫暗,脉结代
- B.心悸不宁,憋气乏力,少气懒言,烦热口渴,舌红少苔,脉细数
- C.心悸怔忡,神疲乏力,畏寒肢冷,舌质淡胖,脉缓无力
- D.寒热起伏,心悸胸闷,肌肉酸痛,腹痛泄泻,舌质红,苔黄腻,脉濡数
- E.心悸气短,胸闷胸痛,发热咳嗽,咽红肿痛,舌红脉数

答案:A

解析:A为病毒性心肌炎痰瘀阻络证。B为病毒性心肌炎气阴亏虚证。C为病毒性心肌炎心阳虚证。D为病毒性心肌炎湿热侵心证。E不是病毒性心肌炎的典型表现。故106题选D,107题选A。

256.(B型题)112治疗急性肾小球肾炎风水相搏型,应首选

- A.五苓散
- B.真武汤
- C.三妙丸合导赤散
- D.五味消毒饮合五皮饮

E.麻黄连翘赤小豆汤

答案:E

解析:急性肾小球肾炎风水相搏证治以疏风宣肺、利水消肿,方用麻黄连翘赤小豆汤。湿热内侵型治以清热利湿、凉血止血,方用三妙丸合导赤散。A用于蓄水证。B用于阳虚水泛证。D用于寒湿内盛证。故112题选E,113题选C。

257.(B型题)116哮喘发作期的主要病机是

A.外邪引动伏痰,痰阻气道

B.感受外邪,肺气郁闭

C.感受外邪,肺气失宣

D.肺脾肾不足,痰饮内伏

E.脾肾阳虚,肾不纳气

答案:A

解析:小儿哮喘发作必有留痰伏饮,受外邪而引发。发作时,痰随气升,气因痰阻,相互搏激,阻塞气道,气机升降不利,以致呼多吸少,气息喘促。哮喘缓解期的主要病机为肺虚皮毛不固,容易感冒及诱发哮喘;肾气失纳则动则气喘;脾虚则纳运不健,易痰饮上泛。故116题选A,117题选D。

258.(B型题)119哮喘肾虚不纳的正确治法是

A.温肺散寒

B.清热化痰

C.补肺固表

D.健脾化痰

E.补肾固本

答案:E

解析:哮喘脾气虚弱的正确治法为健脾化痰,方选六君子汤加减。哮喘肾虚不纳的正确治法为补肾固本,方选金匱肾气丸加减。A治疗寒哮,B治疗热哮,C治疗肺气虚弱证。故118题选D,119题选E。

259.(B型题)122婴儿手足搐搦症是由于缺乏

A.维生素C

B.维生素D

C.维生素B₁₂和叶酸

D.铁

E.锌

答案:B

解析:婴儿性手足搐搦症绝大多数见于婴儿时期,主要是由于维生素D缺乏以致血清钙降低,神经肌肉兴奋性增强,出现惊厥和手足搐搦等症状。小儿小细胞低色素性贫血是指红细胞中的含铁血黄素低(低色素),同时细胞体积小(小细胞),这种贫血大多数由于缺铁引起。故122题选B,123题选D。

260.(B型题)125突然发热,一般情况好,热退疹出者,应首先考虑的是

A.麻疹

B.幼儿急疹

- C.猩红热
- D.水痘
- E.风疹

答案:B

解析:麻疹多在发热后3~4天出现皮疹。体温可突然升高至40°C~40.5°C,热甚疹出。幼儿急疹骤起高热,而其他临床症状较轻,热退时出现大小不一的淡红色斑疹或斑丘疹。C起病急骤,发热,体温一般38°C~39°C,重者可达40°C以上,婴幼儿起病时可能产生惊厥或谵妄,皮疹于24小时左右迅速出现。D起病较急,可有发热、头痛、全身倦怠等前驱症状,在发病24小时内出现皮疹。E通常于发热1~2天后出现皮疹,皮疹先从面颈部开始,在24小时蔓延到全身。故124题选A,125题选B。

261.(B型题)129咳声重浊,痰黄者,应首先考虑的是

- A.外感暑热
- B.外感风热
- C.风湿犯肺
- D.外感风寒
- E.阴虚肺燥

答案:B

解析:咳声清扬,鼻流清涕者,考虑外感风寒。咳声重浊,痰黄者考虑为外感风热。A多表现为咳声不扬,痰黏黄。C多表现为咳嗽频频,喉中痰鸣。E多表现为干咳无痰或痰少黏稠。故128题选D,129题选B。

262.(A1型题)1下列关于副作用的描述,正确的是

- A.药物在治疗剂量时出现的与治疗目的无关的作用
- B.药物应用不当而产生的作用
- C.因病人有遗传缺陷而产生的作用
- D.停药后出现的作用
- E.因用药剂量过大产生的作用

答案:A

解析:副作用是由于药物的选择性低,药理效应涉及多个器官,当某一效应用作治疗目的时,其他效应就成为副作用,主要造成机体的生理性损害。副作用是在治疗剂量下发生的,是药物本身固有的作用,难以避免,但多数较轻微并可以预料。故本题选A。

263.(A1型题)6吗啡急性中毒致死的最主要原因是

- A.呼吸麻痹
- B.肾衰竭
- C.消化道出血
- D.中枢兴奋
- E.循环衰竭

答案:A

解析:吗啡能够抑制呼吸,治疗量时即可抑制呼吸中枢,使呼吸频率减慢,潮气量降低。中毒量时使呼吸减慢至3~4次/分,死因为呼吸麻痹。故本题选A。

264.(A1型题)10通过抑制血管紧张素I转换酶而发挥抗慢性心功能不全作用的代表药有

- A.地高辛
- B.卡托普利
- C.美托洛尔
- D.氯沙坦
- E.硝普钠

答案:B

解析:卡托普利是血管紧张素转换酶抑制剂,通过血管紧张素I转换酶减少血管紧张素II及的生成量,并抑制醛固酮的生成从而逆转心室肌的重塑。故本题选B。

265.(A1型题)14下列药物中,无抗心律失常作用的是

- A.奎尼丁
- B.氢氯噻嗪
- C.维拉帕米
- D.普萘洛尔
- E.胺碘酮

答案:B

解析:氢氯噻嗪的药理作用有:①利尿,抑制远曲小管对NaCl的重吸收;②抗利尿,使尿崩症患者尿量明显减少,因其排出Na⁺、Cl⁻,使血浆渗透压下降,可减轻患者的口渴感;③降压。故本题选B。

266.(B型题)16长期应用地西洋须加大剂量才产生原有的催眠效果,这是产生了

- A.耐受性
- B.成瘾性
- C.反跳现象
- D.戒断症状
- E.急性中毒

答案:A

解析:耐受性指药物连续多次应用于人体,其效应逐渐减弱,必须不断地增加用量才能达到原来的效应。成瘾性指某些药物连续多次服用后,身体逐渐对其产生精神上的依赖和病态的嗜好,此时一旦停药,即会出现主观上的严重不适症状。而这里因为停止服药而出现的不适症状就属于戒断症状。故16题选A,题17选D。

267.(B型题)20可引起高血钾、咳嗽、血管神经性水肿的药物是

- A.卡托普利
- B.可乐定
- C.哌唑嗪
- D.肼屈嗪
- E.米诺地尔

答案:A

解析:A适用于各型高血压的治疗,长期应用可出现低血压、头痛、头晕、颜面潮红、乏力、血管神经性水肿、刺激性干咳、高血钾、皮疹、脱发等。B长期应用可出

现口干、瞌睡、头晕、便秘。C的不良反应有眩晕、疲倦、口干、头痛、恶心。D服后可出现耐药性及头痛、心悸、恶心等不良反应，长期大剂量使用可引起类风湿性关节炎和红斑狼疮样反应。E的不良反应有心动过速、多毛症、妇女月经次数增多，结膜充血及血小板计数减少等。

268.(B型题)24治疗过敏性休克，应首先考虑的药物是

- A.肾上腺素
- B.去甲肾上腺素
- C.异丙肾上腺素
- D.多巴胺
- E.麻黄碱

答案:A

解析:A为 α 和 β 受体激动药，可使心肌收缩力加强，心率增快，心排出量增加，适用于严重的急性过敏反应，特别是青霉素等引起的过敏性休克治疗。B主要用于早期神经源性休克或药物引起的低血压。C主要适用于中心静脉压高、心排出量低的感染性休克。D主要用于感染性休克、心源性休克和出血性休克的治疗，对伴有心肌收缩力减弱及尿量减少而血容量已补足的患者疗效较好。E使心肌收缩力增强，心输出量增加，可用于因血管扩张引起的休克的治疗。

269.(B型题)29治疗肺炎球菌肺炎，应首选

- A.青霉素
- B.氨苄青霉素
- C.新型青霉素II
- D.红霉素
- E.庆大霉素

答案:A

解析:治疗支原体肺炎首选大环内酯类药物，如红霉素、罗红霉素和阿奇霉素等。治疗肺炎球菌肺炎首选青霉素类、第一代头孢菌素等。

270.(A1型题)1胆道蛔虫梗阻出现腹痛的特点是

- A.突发中上腹剧烈刀割样持续性疼痛
- B.持续性、广泛性剧烈腹痛伴腹肌紧张
- C.右上腹进行性锐痛
- D.剑突下钻顶样疼痛
- E.右上腹阵发性绞痛

答案:D

解析:突发中上腹剧烈刀割样疼痛为消化性溃疡穿孔引起的疼痛。持续性、广泛性剧烈腹痛伴腹肌紧张，提示为急性弥漫性腹膜炎。右上腹进行性锐痛提示肝区病变。右上腹阵发性绞痛，可能是胆囊炎。剑突下钻顶样疼痛是胆道蛔虫梗阻的典型表现。故本题选D。

271.(A1型题)8病理性的持续睡眠状态，可被唤醒，并能正确回答问题称为

- A.嗜睡
- B.意识模糊

- C.昏睡
- D.昏迷
- E.谵妄

答案:A

解析:A是最轻的意识障碍,是一种病理性倦怠,患者可被唤醒,并能作出各种不同的反应。B能保持简单的精神活动,但对时间、地点、人物的定向能力发生障碍。C不易唤醒,在强烈刺激下可被唤醒,醒时答话含糊。D意识的持续的中断或完全丧失。E意识模糊、感觉错乱、躁动不安、言语杂乱。故本题选A。

272.(A1型题)12下列各项,属于脑膜刺激征的是

- A.布鲁津斯基征
- B.查多克征
- C.巴宾斯基征
- D.戈登征
- E.拉塞格征

答案:A

解析:脑膜刺激征包括颈强直、凯尔尼格征、布鲁津斯基征。其余四项与脑膜刺激征均为病理反射。故本题选A。

273.(A1型题)15出现“三偏征”,常见的病变部位是

- A.内囊
- B.深皮质
- C.脑干
- D.脊髓
- E.基底节

答案:A

解析:因感觉、运动传导路都经过内囊,且内囊较窄,如有病变常表现为对侧半身感觉障碍及伴有偏瘫,即三偏征。故本题选A。

274.(A1型题)20尿中出现红细胞管型,主要见于

- A.肾结核
- B.肾结石
- C.慢性肾炎
- D.急性肾炎
- E.慢性肾盂肾炎

答案:D

解析:尿液中见红细胞管型主要提示肾小球疾病,如急进性肾小球肾炎、急性肾小球肾炎、慢性肾小球肾炎急性发作、狼疮性肾炎等。故本题选D。

275.(B型题)22轻度有机磷农药中毒,瞳孔呈

- A.缩小
- B.明显缩小
- C.针尖样大小
- D.显著扩大

E.大小不等

答案:A

解析:轻度有机磷农药中毒瞳孔可略缩小。中度中毒瞳孔明显缩小。重度中毒瞳孔小于针尖。

276.(B型题)26上述各项,可闻及心尖区粗糙的吹风样收缩期杂音的是

A.二尖瓣关闭不全

B.二尖瓣狭窄

C.主动脉瓣关闭不全

D.主动脉瓣狭窄

E.动脉导管未闭

答案:A

解析:吹风样杂音常见于二尖瓣区和肺动脉瓣区,一般呈高调。柔和的吹风样杂音常为功能性杂音;典型的粗糙的吹风样收缩期杂音,常提示二尖瓣关闭不全。隆隆样杂音为低调,心尖区舒张期隆隆样杂音是二尖瓣狭窄的特征。叹气样杂音见于主动脉瓣区,为主动脉瓣关闭不全的特点。机器样杂音主要见于动脉导管未闭,杂音如机器转动声样粗糙。杂音在心尖部最响,提示二尖瓣病变;杂音在主动脉瓣区最响,提示主动脉瓣病变;在肺动脉瓣区最响,提示肺动脉瓣病变;在胸骨下端最响,提示三尖瓣病变。如胸骨左缘第3、4肋间听到响亮而粗糙的收缩期杂音,首先应想到室间隔缺损;胸骨左缘第2、3肋间有连续性机器样粗糙杂音,应想到动脉导管未闭。

277.(B型题)30两肺散在干、湿啰音,其多少及部位不固定者,见于

A.支气管扩张

B.支气管哮喘

C.心源性哮喘

D.慢性支气管炎

E.肺炎球菌肺炎

答案:D

解析:A轻微时可无明显体征,一般在扩张部可听到大小不等的湿性啰音,其特点是持久存在。B桶状胸,呼吸运动减弱,语颤减弱,叩诊高清音,听诊呼气时间延长,听觉语音减弱,两肺布满哮鸣音。C在两肺可闻及较多的干性啰音,有大量粉红色的泡沫痰。D在肺底部可听到干湿啰音。E视病变特征及检查时病人所处的阶段而定。可有肺叶实变或胸膜渗出的典型肺部体征,呼吸运动减弱,叩诊浊音,可闻及支气管呼吸音。

278.(B型题)34急性溶血时,可出现的是

A.淡红色尿

B.淡黄色尿

C.酱油色尿

D.深黄色尿

E.乳白色尿

答案:C

解析:红细胞在血管内被大量破坏时(即血管内溶血),原本红细胞内的血红蛋白就会游离出来,使血浆内出现大量游离血红蛋白,并从肾脏排出,称为血红蛋白尿,其颜色呈红葡萄酒色或酱油色。这是急性溶血的证据之一。乳糜尿是丝虫病的主要症状之一,尿色白如牛奶。由于肠道吸收的乳糜液(脂肪皂化后的液体),不能从正常的淋巴管引流到血液循环中去,只能逆流至泌尿系统的淋巴管中,造成泌尿系统中淋巴管内压增高,曲张而破裂使乳糜液溢入尿液中,而出现乳糜尿。

279.(B型题)38X线下见右上肺有多发的厚壁空洞,周围有较广泛的纤维条索影。应首先考虑的是

- A.肺大泡
- B.肺脓肿
- C.浸润型肺结核空洞形成
- D.慢性纤维空洞型肺结核
- E.周围型肺癌空洞形成

答案:D

解析:厚壁空洞X线表现为空洞形状不规则的透光影,周围有密度高的实变区。内壁凹凸不平或光滑整齐,多为新形成的空洞,见于肺脓肿、肺结核及肺癌。结核性空洞多无或含少量液体,而肺脓肿的空洞多有明显液面。癌瘤内形成的空洞其内壁多不规则,呈结节状。浸润性肺结核长期迁延未愈,可形成慢性纤维空洞型肺结核,表现为轮廓不光整规则,周围有较广泛的纤维索条影和散在的新老病灶。

280.(A1型题)1下列关于感染过程的描述,错误的是

- A.病原体与人体相互作用,相互斗争的过程称为感染过程
- B.感染过程的构成必须具备病原体、人体和外环境三个因素
- C.病原体的致病力包括毒力、侵袭力、病原体数量和变异性
- D.病原体侵入的数量越大,出现显性感染的危险也越大
- E.病原体侵入人体,只要发病就意味着感染过程的开始

答案:E

解析:感染是病原体对人体的一种寄生过程。在漫长的进化过程中,有些病原体与人体宿主之间达到了互相适应、互不损害对方的共生状态,当某些因素导致宿主的免疫功能受损或机械损伤时,平衡不复存在而引起宿主的损伤,所以发病并不一定意味着感染过程的开始。故本题选E。

281.(A1型题)5下列各期,流行性出血热患者可出现“三痛”症状的是

- A.发热期
- B.低血压期
- C.少尿期
- D.多尿期
- E.恢复期

答案:A

解析:流行性出血热发热期,患者可出现全身酸痛、头痛和腰痛,少数患者出现眼眶痛。头痛、腰痛和眼眶痛一般称为“三痛”。B可出现低血压或休克。C可出现尿

毒症、酸中毒和水、电解质紊乱。D可出现多尿、继发性休克、低钾、低钠症状。E尿量逐渐恢复，症状、体征基本消失。故本题选A。

282.(A1型题)9HIV主要感染下列哪种细胞

- A.CD⁴+T淋巴细胞
- B.B淋巴细胞
- C.单核细胞
- D.神经胶质细胞
- E.直肠黏膜上皮细胞

答案:A

解析:CD⁴+T淋巴细胞在HIV直接和间接作用下,细胞功能受损和大量破坏,导致细胞免疫缺陷。故本题选A。

283.(A1型题)13有关脑膜炎球菌的描述下列哪项是正确的

- A.革兰染色阳性,体外抵抗力很弱,能产生自溶酶
- B.特异性荚膜多糖抗原与其致病作用无关
- C.能产生毒力较强的外毒素
- D.目前我国流行株以C群为主
- E.与淋球菌一样也属奈瑟菌属

答案:E

解析:脑膜炎球菌属于脑膜炎奈瑟菌,革兰阴性双球菌,内毒素是致病重要因素,仅存于人体,细胞内寄生,抵抗力弱,产生自溶酶,需要巧克力色血琼脂培养基培养。目前美国流行菌株以C群为主,B群则在欧洲流行,我国和非洲以A群为流行菌株,但已有B、C群的出现及增多的趋势。故本题选E。

284.(A1型题)17霍乱的典型表现是

- A.黏液脓血便
- B.四肢抽搐,顽固性呕吐
- C.皮肤黏膜出血点
- D.发热,盗汗
- E.腹泻,呕吐

答案:E

解析:霍乱的典型表现是剧烈腹泻、继之呕吐,无腹痛和里急后重,严重者出现脱水和周围循环衰竭。A见于菌痢。故本题选E。

285.(B型题)19感染HBV后出现保护性抗体的标志是

- A.HBsAg阳性
- B.HBeAg阳性
- C.抗-HBe阳性
- D.抗-HBc阳性
- E.抗-HBs阳性

答案:E

解析:抗-

HBs是一种保护性抗体,在疾病恢复期出现,临床上作为判断急性乙型肝炎病人

预后的指标。HBeAg在血清中出现与HBV-DNA密切相关,是HBV活动性复制的标志。A最早于HBV感染后1~2周,最迟11~12周出现于周围血中,在慢性感染和无症状携带者中可持续存在多年。C出现提示病毒复制减少或终止。D出现于HBsAg出现后3~5周,说明病毒感染处于窗口期,在“大三阳”组合中,它是HBV活动性复制的标志之一。

286.(B型题)22诺氟沙星治疗

- A.伤寒
- B.血吸虫病
- C.流感
- D.流脑
- E.秋季腹泻

答案:A

解析:流行性脑脊髓膜炎的治疗首选青霉素G,大剂量,20~40万单位/kg·d,5~7天。伤寒的治疗以氟喹诺酮类药物为首选。

287.(B型题)25在外环境中生存能力最强的痢疾杆菌是

- A.志贺痢疾杆菌
- B.福氏痢疾杆菌
- C.宋内痢疾杆菌
- D.鲍氏痢疾杆菌
- E.舒氏痢疾杆菌

答案:C

解析:痢疾杆菌属肠杆菌科志贺菌属,革兰阴性杆菌,无鞭毛。目前分为A、B、C、D四群(分别是志贺、福氏、鲍氏和宋内痢疾杆菌)及47个不同的血清型。生存能力较强(D群>B群>A群)。感染后易转为慢性的是B群福氏痢疾杆菌。

288.(B型题)29霍乱典型表现为

- A.发热,腹痛,腹泻,洗肉水样大便
- B.发热,腹痛,腹泻,脓血便,里急后重
- C.腹泻,呕吐,水样大便,无发热,无腹痛
- D.发热,腹痛,腹泻,水样大便
- E.低热,腹痛,腹泻,果酱样大便

答案:C

解析:参见27~28题。

289.(A1型题)1撰写“医家五戒十要”的医家是

- A.李时珍
- B.陈实功
- C.孙思邈
- D.张仲景
- E.华佗

答案:B

解析:此题暂无解析

290.(A1型题)41976年美国学者提出的医患关系基本模式是

- A.主动-被动型, 互相-合作型, 平等参与型
- B.主动-合作型, 相互-指导型, 共同参与型
- C.主动-配合型, 指导-合作型, 共同参与型
- D.主动-被动型, 指导-合作型, 共同参与型
- E.主动-被动型, 共同参与型, 父权主义型

答案:D

解析:1976年美国学者提出的医患关系基本模式是主动-被动型、指导-合作型、共同参与型。故本题选D。

291.(A1型题)7下列各项, 不符合道德要求的是

- A.尽量为患者选择安全有效的药物
- B.要严格遵守各种抗生素的用药规则, 尽可能开患者要求的好药, 贵重药物
- C.在医疗过程中要为患者保守秘密
- D.对婴幼儿、老年病人的用药应该谨慎, 防止肾功能损害
- E.钻研药理知识, 防止粗疏和盲目用药

答案:B

解析:医学道德的范畴包括:①权利与义务;②情感与良心;③审慎与保密。保密是指医务人员在医疗活动中应当具有对医疗和护理保守秘密的职业道德, 故不选C。

292.(B型题)10反映医患关系本质的是

- A.医患关系是一种民事法律关系
- B.医患关系是具有道德意义较强的社会关系
- C.医患关系是一种商家与消费者的关系
- D.医患关系是包括非技术性和技术性方面的关系
- E.医患关系是患者与治疗者在诊疗和保健中所建立的联系

答案:B

解析:我国医患关系是本质的是以社会主义人道主义为原则建立起来的平等关系。医患关系内容是以医务人员为一方, 以患者及家属为一方, 在诊断、治疗、护理过程中结成的人际关系。

293.(B型题)14作为医学伦理学基本范畴的良心是指

- A.医学关系中的主体在道义上应享有的权力和利益
- B.医学关系中的主体在道义上应履行的职责和使命
- C.医学关系的主体对应尽义务的自我认识 and 自我评价的能力
- D.医学关系中的主体因履行道德职责受到褒奖而产生的自我赞赏
- E.医学关系中的主体在医疗活动中对自己和他人关系的内心体验和感受

答案:C

解析:医学道德的基本范畴有权利与义务、情感与良心、审慎与保密、荣誉与幸福。A为权利, B为义务, D为荣誉与幸福。

294.(A1型题)1下列各项, 不属卫生法制定基本原则的是

- A.公平原则
- B.遵循宪法原则
- C.依照法定权限和程序的原则
- D.坚持民主立法的原则
- E.从实际出发的原则

答案:A

解析:卫生法制定基本原则包括政治原则、宪法原则、国际法原则,卫生行政法的基本原则包括义务本位原则、合法性原则、合理性原则、应急性原则等等,卫生行政法的其他原则包括义务本位原则、合法性原则、合理性原则、应急性原则等。所以公平原则不属卫生法制定基本原则。故本题选A。

295.(A1型题)5下列各项,不属我国《刑法》规定刑罚的种类是

- A.有期徒刑
- B.撤职
- C.管制
- D.罚金
- E.没收财产

答案:B

解析:我国《刑法》规定刑罚的主刑有:管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑;附加刑有:罚金、剥夺政治权利和没收财产。撤职不属我国《刑法》规定刑罚的种类。故本题选B。

296.(A1型题)8医师签署有关医学证明文件,必须亲自诊查、调查,并按照规定及时填写医学文书,对医学文书及有关资料,不得

- A.与同行讨论
- B.用电脑打印
- C.随身携带
- D.向主管医生报告
- E.隐匿、伪造或者销毁

答案:E

解析:《执业医师法》第二十三条规定:医师实施医疗、预防、保健措施,签署有关医学证明文件,必须亲自诊查、调查,并按照规定及时填写医学文书,不得隐匿、伪造或者销毁医学文书及有关资料。故本题选E。

297.(A1型题)11医师开具处方时,除特殊情况外必须注明的是

- A.患者体重
- B.药品的拉丁文
- C.处方药或非处方药
- D.临床诊断
- E.患者是否为过敏体质

答案:D

解析:处方内容包括①前记:医疗机物名称、费别、患者姓名、性别、年龄、门诊或住院病例号、科别或病室和床位号、临床诊断、开具日期。麻醉药品和第一类精神药品处方还应包括患者身伤证明编号、代办人姓名、身份证明编号。②正文:

以Rp或R标示,分列药品名称、剂型、规格数量、用法用量。③后记:医师签名或者加盖专用签章,药品金额以及审核调配、核对、发药的药师签名或者加盖专用签章。

298.(A1型题)2“阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也”,说明了阴阳之间的哪种关系

- A.对立
- B.互根
- C.消长
- D.平衡
- E.转化

答案:B

解析:阴阳互根,是指一切事物或现象中相互对立着的阴阳两个方面,具有相互依存,互为根本的关系。即阴和阳任何一方都不能脱离另一方而单独存在,每一方都以相对的另一方的存在作为自己存在的前提和条件。阴阳互用,是指阴阳双方具有相互资生、促进和助长的关系。《素问·阴阳应象大论》说:“阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也。”指出阴为阳守持于内,阳为阴役使于外,阴阳相互为用,不可分离。故本题选B。

299.(A1型题)5“益火之源,以消阴翳”所指的是

- A.补阴扶阳
- B.阳病治阴
- C.阴中求阳
- D.阳中求阴
- E.阴病治阳

答案:E

解析:阴阳偏衰出现的是虚证,故总的治疗原则是“虚则补之”,即补其不足。分而言之,阴偏衰产生的是“阴虚则热”的虚热证,治疗当滋阴制阳,用“壮水之主,以制阳光”的治法,《内经》称之为“阳病治阴”。阳偏衰产生的是“阳虚则寒”的虚寒证,治疗当扶阳抑阴,用“益火之源,以消阴翳”的治法,《内经》称之为“阴病治阳”。故本题选E。

300.(A1型题)8肝病传脾在五行关系中属于

- A.相生
- B.相克
- C.相乘
- D.相侮
- E.制化

答案:C

解析:相乘,是相克太过致病。引起五脏相乘的原因有二:一是某脏过盛,而致其所胜之脏受到过分克伐;二是某脏过弱,不能耐受其所不胜之脏的正常克制,从而出现相对克伐太过。如以肝木和脾土之间的相克关系而言,相乘传变就有“木旺乘土”(即肝气乘脾)和“土虚木乘”(即脾虚肝乘)两种情况。由于肝气郁结或肝

气上逆，影响脾胃的运化功能而出现胸胁苦满、脘腹胀痛、泛酸、泄泻等表现时，称为“木旺乘土”。故本题选C。

