

2022年临床医师资格执业押题

第三单元

A1型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列哪项为诊断慢性阻塞性肺疾病(COPD)的必要条件

- A. 胸部X线片示肺纹理增粗紊乱
- B. 肺功能检查示阻塞性通气功能障碍
- C. 高分辨CT示肺气肿改变
- D. 长期大量吸烟史
- E. 慢性咳嗽、咳痰病史

2. 下列关于肺炎链球菌肺炎叙述错误的是

- A. 起病急
- B. 咳砖红色痰
- C. 不易形成空洞
- D. 首选青霉素
- E. 病前数日可有上感史

3. 下列哪项为胃食管反流病患者的典型症状

- A. 餐后上腹胀
- B. 上腹部钝痛
- C. 吞咽困难
- D. 嗝气
- E. 反酸、烧心

4. 下列哪项为急性糜烂出血性胃炎最常见的原因是

- A. 不洁饮食
- B. 剧烈呕吐
- C. 刺激性食物
- D. 口服抗生素
- E. 口服非甾体抗炎药

5. 下列哪项为慢性阻塞性肺疾病(COPD)氧疗最常用的

- A. 有创机械通气
- B. 无创机械通气
- C. 间断高浓度吸氧
- D. 持续高频呼吸机通气
- E. 持续低流量吸氧

6. 肺源性心脏病时最常见的心脏改变是

- A. 右心房肥大
- B. 左心房肥大
- C. 右心室肥大

D. 左心室肥大

E. 左心房+左心室肥大

7. 下列哪项不是应激性溃疡发病基础

- A. 重度烧伤
- B. 慢性胃炎
- C. 颅内手术
- D. 重度创伤
- E. 脓毒血症

添加老师微信: jyj qq666

8. 下列哪项胆囊结石在行X线腹部平片检查时常显影

- A. 胆固醇结石
- B. 胆色素结石
- C. 混合性结石
- D. 泥沙样结石
- E. 黑结石

9. 属于乙类传染病的疾病是

- A. 麻疹
- B. 麻风病
- C. 流行性感
- D. 急性出血性结膜炎
- E. 风疹

10. 支气管哮喘患者发作时禁用的药物是A. 吗啡

- B. 氨茶碱
- C. 泼尼松
- D. 肾上腺素
- E. 沙丁胺醇

11. 下列考虑为胃癌的临床表现是

- A. 进行性吞咽困难
- B. 餐后上腹部胀痛伴嗝气
- C. 反复反酸、烧心伴胸痛
- D. 腹痛伴体重减轻
- E. 频发恶心呕吐

12. 以下属于肝脏的一级供应动脉是

- A. 胆囊动脉
- B. 肝静脉

- C. 肝固有动脉
- D. 门静脉
- E. 脾动脉

13. 容易引起休克的肺炎是

- A. 军团菌
- B. 肺炎衣原体
- C. 肺炎衣原体
- D. 肺炎克雷伯菌
- E. 金黄色葡萄球菌

14. 手术前不需要预防性使用抗生素的是

- A. 化脓性阑尾炎手术
- B. 乳腺癌根治术
- C. 手外伤清创缝合术
- D. 甲状腺次全切除术
- E. 肾移植术

15. 下列对门静脉高压症形成后病理变化描述错误的是

- A. 血细胞计数减少
- B. 食管下段、胃底形成的静脉曲张静脉压差最大
- C. 可出现胃黏膜防御屏障的破坏
- D. 腹膜后的小静脉也可明显扩张、充血
- E. 肛周静脉扩张引起继发性痔

16. 下列对原发性肝癌的转移描述正确的是

- A. 最常通过门静脉转移
- B. 最常转移至肺部
- C. 最常通过淋巴转移
- D. 常侵犯邻近器官
- E. 较少侵犯门脉系统

17. 下列哪项不属于支气管哮喘并发症

- A. 气胸
- B. 纵隔气肿
- C. 肺不张
- D. 慢性支气管炎
- E. 支气管扩张

18. 卡氏肺孢子虫肺炎首选的药物治疗是

- A. 复方新诺明
- B. 干扰素
- C. 替诺福韦酯
- D. 青霉素
- E. 拉米夫定

19. 下列最可能提高胃癌治愈率的

- A. 术后规律化疗
- B. 根治性手术
- C. 早期诊断
- D. 术中淋巴结清除彻底

E. 术中注意无瘤化操作

20. 肠内营养并发症由于输注太快引起的是

- A. 感染
- B. 肠炎
- C. 误吸
- D. 腹胀、腹泻
- E. 糖代谢异常

添加老师微信: jyj qq666

21. 可导致脂肪肝的机制是

- A. 胆固醇过度沉积
- B. 甘油三酯过度沉积
- C. 2型糖尿病
- D. 低密度脂蛋白过度沉积
- E. 动脉粥样硬化

22. 院内感染无感染高危因素常见的细菌是

- A. 肺炎链球菌
- B. 克雷白杆菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 大肠埃希菌肺炎
- E. 铜绿假单胞菌

23. 关于吸入性肺脓肿,说法不正确的是

- A. 是指病原体经口、鼻、咽腔吸入致病
- B. 由于右主支气管较陡直,且管径较粗大,吸入物易进入右肺
- C. 仰卧位时,好发于上叶后段或下叶背段
- D. 坐位时,好发于下叶后基底段
- E. 右侧卧位时,则好发于右肺下叶

24. 下列哪项为我国胰腺炎最常见病因

- A. 胆道疾病
- B. 过量饮酒
- C. 暴饮暴食
- D. 高脂血症
- E. 十二指肠液反流

25. 用于肝细胞癌患者普查、诊断、判断疗效和预测复发的检查项目应首选添加老师微信:

j y j q q 6 6 6

- A. 肝脏MRI
- B. PET
- C. CEA
- D. 甲胎蛋白
- E. PSA

26. 鉴别水肿型和出血坏死型胰腺炎有价值的是

- A. 上腹剧痛向左腰背部放射
- B. 黄疸
- C. 发热

- D. Cullen征
E. 便血
27. 下列属于特异性感染的是
- A. 背部痛
B. 疖病
C. 急性淋巴结炎
D. 急性乳腺炎
E. 淋巴结结核
28. 下列关于痰液性质描述不对应的是
- A. 铜绿假单胞菌-黄绿色痰
B. 肺炎克雷伯菌-砖红色痰液
C. 肺吸虫病-黑色痰
D. 急性左心衰-粉红色泡沫痰
E. 大叶性肺炎-铁锈色痰
29. 下列关于根治性胃切除术描述正确的是
- A. 胃近端大部切除,胃切断线距离肿块至少6cm
B. 全胃切除需切除食管下段距离贲门4-5cm
C. 全胃切除需切除十二指肠近端至少要距幽门3-4cm
D. 尽可能多地保留小网膜
E. 大网膜连同胰腺被膜部分应尽可能保留
30. 不符合重症肺炎诊断标准的是
- A. 需要有创机械通气
B. 感染性休克需要血管收缩剂治疗
C. 氧合指数 $PaO_2/FiO_2 < 300$
D. 意识障碍
E. 呼吸频率 > 30 次/分
31. 下列对于胆囊的血管描述不正确的是
- A. 胆囊动脉正常时源自肝右动脉
B. 胆囊动脉可以来自肝固有动脉
C. 胆总管的血液供应主要来自胃十二指肠动脉
D. 胆囊静脉和肝外胆道静脉直接汇入门静脉
E. 胆总管的血液供应可以来自肝左动脉
32. 下列传染病可引起巨脾的是
- A. 囊尾蚴病
B. 菌痢
C. 疟疾
D. 流脑
E. 日本血吸虫病
33. 下列对细菌性肝脓肿描述错误的是
- A. 起病急骤,常伴有全身脓毒血症
B. 肝穿刺可为黄白色脓液
C. 右肋缘下常可触及肿大肝脏
D. B超常表现为孤立巨大脓肿
E. 寒战高热为最初症状
34. 危险三角区的疖发生在
- A. 背部
B. 胸部
C. 臀部
D. 颈部
E. 面部
35. 下列胆管癌临床表现描述不正确的是
- A. 胆管癌晚期可并发肝肾综合征
B. 不出现典型胆管炎表现
C. 上段胆管癌一般触及不到胆囊
D. 大便灰白添加老师微信: jyjqq666
E. 通常有进行性黄疸加重的表现
36. 下列哪项与小叶性肺炎不符
- A. 病变多不局限于某一小叶
B. 属于化脓性炎
C. 常是某些疾病的并发症
D. 病原体常见为肺炎链球菌、病毒等
E. 多见于青壮年
37. 胆管癌的主要表现是
- A. 厌食,恶心呕吐
B. 腹痛,黄疸
C. 腹痛,黄疸和寒战高热
D. 无痛性黄疸
E. 体重明显减轻
38. 我国抗结核化学治疗原则不正确的是
- A. 早期
B. 规律
C. 足量
D. 全程
E. 联合
39. 胰头癌最常见的临床表现是
- A. 上腹痛
B. 黄疸
C. 腹胀
D. 便秘
E. 腹泻
40. 下列甲型肝炎病程中,传染性最强的阶段是
- A. 潜伏期
B. 黄疸前期
C. 黄疸期
D. 恢复期
E. 慢性期
41. 下述不是溃疡性结肠炎常见并发症的是
- A. 中毒性巨结肠

- B. 直肠结肠出血
- C. 癌变
- D. 多发性瘘管
- E. 急性肠穿孔

42. 预后最差的肺癌类型是

- A. 鳞状细胞癌
- B. 小细胞肺癌
- C. 腺癌
- D. 大细胞癌
- E. 细支气管肺泡癌

43. 下列不是机械性肠梗阻原因的是

- A. 肿瘤

- B. 嵌顿疝
- C. 粪块阻塞
- D. 粘连带压迫
- E. 弥漫性腹膜炎

44. 下列传染病中可引起血细胞减少的是

- A. 流行性出血热
- B. 钩端螺旋体病
- C. 伤寒
- D. 细菌性痢疾
- E. 霍乱

A2型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

45. 女,28岁,右脚大拇指红肿5天,疼痛剧烈,伴有跳痛,下列治疗措施不正确的是

- A. 局部热敷、理疗
- B. 抬高患肢,给以止痛剂
- C. 应用抗生素
- D. 必须在局部出现波动感时方可切开引流
- E. 疼痛剧烈,指腹张力显著增高时,马上切开减压

46. 肺栓塞最常见的典型症状不包括[助理不做]

- A. 呼吸困难
- B. 胸痛
- C. 咯血
- D. 低血压
- E. 烦躁不安、濒死感

47. 男患,36岁.左下腹外伤后1天.入院时有全腹压痛、反跳痛、肌紧张,行剖腹探查术.术中见腹腔内有黄色脓液及粪便,降结肠下段有一0.5cm穿孔,有粪便溢出.最合适的术式是

- A. 穿孔处修补,横结肠造口
- B. 单纯结肠穿孔修补术
- C. 降结肠穿孔处切除,端端吻合术
- D. 左半结肠切除术
- E. 单纯腹腔引流术

48. 男,45岁.反复咳嗽、咳脓痰10年,加重5天入院.吸烟史20年.查体:左下肺可闻及持久固定湿啰音及少许哮鸣音,可见杵状指.胸部X线片示左下肺纹理增粗、紊乱.该患者应首先考虑的诊断是

- A. 慢性支气管炎
- B. 支气管肺癌
- C. 肺脓肿
- D. 支气管扩张
- E. 支气管哮喘

49. 男12岁.右手被生锈铁钉刺伤8天,四肢抽搐1天.发作时颈部强直,牙关紧闭,口唇青紫.该患者最严重的并发症是

- A. 窒息
- B. 心力衰竭
- C. 咀嚼无力
- D. 肺部感染
- E. 尿潴留

- A. 宫外孕破裂
- B. 肝破裂
- C. 肠穿孔
- D. 延迟性脾破裂

E. 肠梗阻添加老师微信: jyjqq666

51. 男,45岁.乏力、反复牙龈出血及皮肤出血点1年.乙型肝炎病史15余年.查体:左肋下可触及包块,边界清,质地韧,有切迹,随呼吸移动,无压痛,该包块可能是

- A. 左肾
- B. 胰腺癌
- C. 脾脏
- D. 胃癌

E. 肝脏左叶

52. 伤寒好发部位是在

- A. 回肠末端
- B. 升结肠
- C. 乙状结肠
- D. 肝、脾
- E. 心、脑

53. 女患, 59岁. 间断少尿、腹胀2年, 腹痛、低烧10天. 既往肝炎肝硬化病史20年. 查体: T37.6, P80次/分, R18次/分, BP 92/61mmHg. 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心律齐, 腹膨隆, 全腹轻压痛, 无反跳痛, 移动性浊音阳性. 腹水常规: 比重1.017, 蛋白28g/L, 细胞总数 $920 \times 10^6/L$, 白细胞数 $800 \times 10^6/L$, 多形核细胞0.80. 最可能的诊断是添加老师微信: jyjqq666

- A. 肝肾综合征
- B. 自发性腹膜炎
- C. 原发性肝癌
- D. 门静脉血栓形成
- E. 结核性腹膜炎

54. 一患者慢性咳嗽、咳痰20余年, 痰多呈白色黏液状, 有时为黄脓痰, 近半年来, 咳痰偶带血丝, 气急不能平卧, 桶状胸, 近日来腹部膨隆, 腹水征(+), 下肢出现水肿. 应诊断

- A. 慢性支气管炎
- B. 慢性支气管炎、肺气肿、肺心病
- C. 慢性支气管炎、支气管扩张、肺气肿、肺心病
- D. 慢性支气管炎、肺癌、肺气肿、肺心病
- E. 慢性支气管炎、肺炎、肺气肿、肺心病

55. 男, 45岁. 发热3天, 少尿1天, 于12月15日入院. 查体: 神志清, 球结膜充血、水肿, 双腋下出血点. 实验室检查: WBC $25 \times 10^9/L$, P1t $50 \times 10^9/L$, 尿蛋白(+++) 病原治疗首选药物是

- A. 四环素
- B. 环丙沙星
- C. 利巴韦林
- D. 金刚烷胺
- E. 青霉素

56. 男, 27岁. 肛门持续剧痛20小时. 查体: T36.6, P 83次/分, BP 121/80mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 服软, 无压痛, 未触及包块, 肛门口有直径1.0cm的肿物. 呈暗紫色、质硬, 触痛明显, 最可能的诊断是

- A. 内痔脱出
- B. 肛周脓肿

C. 肛裂

D. 直肠息肉

E. 血栓性外痔

57. 男患, 48岁. 肛门肿胀10天, 呈持续性痛, 逐渐加重, 排便和行走时出现剧痛, 伴里急后重感、排便困难, 伴发热, 全身不适. 查体: T39.5, 肛门左侧红肿, 有明显压痛, 直肠指诊: 直肠左侧饱满, 压痛(+), 有波动感. 血常规: Hb104g/L, WBC $20.0 \times 10^9/L$, N0.91, PLT $218 \times 10^9/L$. 决定立即行切开引流术, 最主要的依据是

- A. 排便有困难
- B. 局部饱满有波动感
- C. 高热, 全身症状
- D. 血白细胞增高
- E. 行走时出现剧痛

58. 流脑与其他类型的脑炎鉴别诊断最有意义的体征是

- A. 巴氏征阳性
- B. 克氏征阳性
- C. 颈抵抗
- D. 剧烈头痛
- E. 皮肤瘀点瘀斑

59. 男患, 32岁. 1天前饱餐后参加剧烈运动时突发腹痛、腹胀. 持续性, 伴阵发性绞痛, 并有频繁呕吐, 无肛门排气. 病情加重并昏倒. T 36.0, P 129次/分, BP 78/51mmHg, 急性病容, 四肢发绀, 全身冷汗. 全腹肌紧张, 有压痛和反跳痛, 肠鸣音消失. 腹穿抽出血性液体. 该患者所患疾病最主要的病理生理改变是

- A. 细胞外液容量迅速减少
- B. 心输出量低, 外周阻力高
- C. 左心室功能不全
- D. 短时大量出血
- E. 下腔静脉回流障碍

60. 男性, 60岁, 咳嗽5年, 呼吸困难加重7天, 桶状胸. X线示: 肺透过度增强, 肋间隙增宽, 横膈下降. RV/TLC=40%, MV占预计值50%, FEV1/FVC为55%, 该患者最恰当地诊断为

- A. 代偿性肺气肿
- B. 老年性肺气肿
- C. 阻塞性肺气肿
- D. 间质性肺气肿
- E. 房间隔性肺气肿

61. 女, 28岁, 反复便秘、腹痛8年. 便前腹痛、腹部不适, 便后缓解. 工作紧张时症状加重. 无便血及消瘦, 睡眠差. 最有可能的诊断是

- A. 肠易激综合征

- B. 克罗恩病
- C. 肠结核
- D. 结肠癌
- E. 溃疡性结肠炎

62. 流行性出血热实验室检查最特异的表现是

- A. 异型淋巴细胞
- B. 血常规
- C. 肥达反应
- D. 血培养
- E. 抗O试验

63. 女患, 50岁. 皮肤、巩膜黄染3个月. 大便颜色变浅, 无腹痛及发热. 查体: 皮肤、巩膜黄染, 右上腹触及囊性包块, 无压痛. 腹部B超示: 胆总管扩张, 胆囊大, 胰腺显示不清. 该患者最可能的诊断是

- A. 胆总管结石
- B. 胆囊癌
- C. 慢性胆囊炎
- D. 慢性胰腺炎
- E. 壶腹周围癌

64. 男性, 54岁, 慢性咳嗽、咳痰10年, 气急3年, 逐渐加重. X线胸片示肋间隙增宽, 两肺透亮度增加, 右上圆形透亮区, 两下肺纹理增粗紊乱, 诊断应先考虑

- A. 支气管哮喘
- B. 自发性气胸
- C. 支气管扩张
- D. 慢支、肺气肿
- E. 慢性支气管炎

65. 男, 50岁. 烦躁、昼睡夜醒2天. 肝炎肝硬化病史5年. 对明确意识障碍病因最有意义的实验室检查是

- A. 血糖
- B. ALT/AST
- C. 血清蛋白电泳
- D. 血氨
- E. 血电解质

66. 男性, 38岁, 慢性咳嗽12年, 活动后气急3年, 下列哪项对诊断阻塞性肺气肿最有价值

- A. PaO₂ 降低
- B. FEV₁/FVC < 80%
- C. MVV < 预计值80%
- D. FEV₁/FVC < 70%
- E. V-V_E 降低

67. 女, 40岁. 确诊为急性胰腺炎, 内科正规治疗2周后体温仍在38 ~ 39, 左上腹部压痛明显. 血淀粉酶256U/L, 血WBC 16 × 10⁹/L. 可能性最大的是

- A. 败血症
- B. 病情迁延未愈
- C. 合并急性胆囊炎
- D. 并发胰腺假性囊肿
- E. 并发胰腺脓肿

68. 女患, 62岁. 上腹胀、隐痛伴皮肤黄染、食欲不振、厌油腻饮食1个半月, 症状进行性加重, 体重共减轻6kg. 2周前开始大便颜色逐渐变浅, 近几天大便呈白陶土样. 查体: 巩膜明显黄染, 肝肋下未触及, 右肋缘下可触及肿大的胆囊底部, 无触痛. 实验室检查: 血总胆红素355mmol/L. 血AFP 5ng/ml. 最可能的诊断是

- A. 胆囊结石
- B. 肝门部胆管癌
- C. 肝癌
- D. 胆总管下段癌
- E. 胆总管结石

添加老师微信: j y j q q 6 6 6

69. 男性, 59岁, 有咳嗽史7年, 肺功能测定, 肺活量占预计值百分比为84%, FEV₁/FVC为54%, 最可能的诊断是

- A. 弥散功能障碍
- B. 限制性通气功能障碍
- C. 阻塞性通气功能障碍
- D. 混合性通气功能障碍
- E. 正常

70. 男, 18岁. 寒战、发热、咳嗽4天. 1周前脚趾曾划伤化脓感染, 经治疗后愈合. 听诊双肺可闻及湿啰音. 血常规WBC 17 × 10⁹/L, N0.92. 胸部X线片示两肺多发性团块状密度增高影. 部分有空洞形成. 最可能的诊断是(助理医师不要求)

- A. 肺囊肿继发感染
- B. 肺血管炎
- C. 肺结核
- D. 真菌性肺炎
- E. 肺脓肿

71. 男患, 49岁. 3天前餐后突发右上腹痛, 呈绞痛, 阵发加剧, 伴恶心, 尿色呈浓茶样, 以往有类似发作. 查体: 急性病容, 巩膜黄染, 腹部无肌紧张, 右上腹深压痛, 可能的诊断是

- A. 胆总管结石
- B. 胆道蛔虫病
- C. 胆总管囊肿
- D. 急性胰腺炎
- E. 急性胆囊炎

临床医师资格笔试各单元考试科目及分值

西医执业医师资格考试内容(仅供参考)

| | |
|------|-------------------------------|
| 第一单元 | 基础100、少部分其他临床部分 |
| 第二单元 | 循环45、泌尿35、血液25、运动20、内分泌20、风湿5 |
| 第三单元 | 消化80、呼吸40、其他15、传染15 |
| 第四单元 | 妇产70、儿科50、精神30 |

西医助理医师资格考试内容(仅供参考)

| | |
|------|---|
| 第一单元 | 消化40、循环23、精神22、呼吸20、 运动15、血液13、内分泌12、风湿5 |
| 第二单元 | 基础60、妇产30、儿科25、泌尿15、其他10、传染10 |

72. 女患, 45岁. 腹胀伴乏力半年. 嗜睡、言语混乱2天. 既往患乙型肝炎25年. 查体T: 36.4, P: 82次/分, R: 18次/分, BP: 122/84mmHg, 神志不清, 消瘦, 皮肤巩膜黄染. 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛, 移动性浊音(+). 诱发患者出现神经精神症状的因素中, 最不可能的是

- A. 应用苯二氮草类镇静剂
- B. 摄入大量蛋白质
- C. 摄入大剂量维生素
- D. 应用大剂量利尿剂
- E. 便秘

A3型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(73~74题共用题干)

男, 40岁. 间断发热1月, 伴寒战、大汗, 于8月10日就诊. 发病前半月曾去泰国旅游, 有蚊虫叮咬史. 查体: T40.0, P110次/分, 心肺未见异常, 肝脾肋下未触及. 实验室检查: 血WBC $7.5 \times 10^9/L$, L 0.30.

73. 该患者最可能的诊断是

- A. 流行性乙型脑炎
- B. 流行性感冒
- C. 钩端螺旋体病
- D. 败血症
- E. 疟疾

添加老师微信: jyjqq666

74. 该患者确诊的依据是

- A. 血培养
- B. 血常规
- C. 红细胞沉降率
- D. 血涂片找疟原虫
- E. 特异性抗体检测

(75~76题共用题干)

女, 29岁, 体重60kg. 烧伤后2小时入院. 查体: BP 86/63mmHg, 心率130次/分, 脉搏细弱, 面色苍白, 口渴明显, 颈部、双上肢(包括双前臂、双上臂、双手)及后背区布满大小不等的水疱, 小部分创面呈灰黄色, 无水疱。

75. 伤后8小时内补液应为

- A. 3600ml
- B. 3900ml
- C. 2900ml
- D. 2530ml
- E. 2300ml

76. 第二个24小时补液应为

- A. 3530ml
- B. 3900ml

- C. 2900ml
- D. 2600ml
- E. 2300ml

(77~79题共用题干)

男性, 62岁. 近3个月逐渐出现上腹部不适, 进食后饱胀, 暖气, 纤维胃镜发现大弯侧胃壁上1cm大小块状肿物. 与周围组织界限不清, 病理回报恶性

77. 该肿瘤Borrmann分型

- A. I型
- B. 型
- C. 型
- D. 型
- E. V型

78. 如行根治手术, 可以保留的淋巴结为

- A. 沿胃小弯淋巴结
- B. 肝总动脉周围淋巴结
- C. 幽门下区淋巴结
- D. 腹主动脉旁淋巴结
- E. 贲门左区淋巴结

79. 该疾病治疗最关键的是

- A. 彻底清除淋巴结
- B. 切除范围距肿瘤边缘6~8 cm
- C. 术后坚持化疗
- D. 早诊早治
- E. 设法保留部分胃底

(80~82题共用题干)

男, 43岁, 长期咳嗽, 经常咳脓痰15年, 发热、咳脓臭痰1周来诊. 查体: 左肺下背部呼吸音弱, 可闻湿啰音

80. 应考虑诊断可能为

- A. 急性肺脓肿
- B. 支气管扩张症, 继发感染
- C. 慢性支气管炎继发感染

- D. 支气管囊肿继发感染
- E. 左下肺炎

81. 治疗药物应选择下列哪项

- A. 青霉素
- B. 青霉素+复方甘草片
- C. 丁胺卡那
- D. 哌拉西林+甲硝唑
- E. 丁胺卡那+甲硝唑

82. 确诊首选下列哪项检查

- A. 胸X线片
- B. 胸CT
- C. 纤维支气管镜
- D. 痰细菌培养+药敏
- E. 以上都不必做

(83~85题共用题干)

男性, 47岁, 半年前开始出现餐后上腹疼痛. 经服用西咪替丁缓解, 1周前又出现此症状, 至医院就诊. 胃镜检查发现胃小弯侧溃疡性病变, 病理证实良性

83. 如行X线钡透. 有何结果

- A. 龛影
- B. 充盈缺损
- C. 胃黏膜紊乱, 壁僵直
- D. 胃黏膜纹理破坏, 中断
- E. 小弯侧指状压迹

84. 何种治疗方法为首选

- A. 内科治疗
- B. 毕I式胃大部切除
- C. 毕II式胃大部切除
- D. 迷走神经切断术
- E. 近端胃切除

85. 患者术后第6天. 胃管内流出咖啡色胃液300ml, 最可能是因为

- A. 吻合口感染
- B. 吻合口瘘
- C. 术后正常出血
- D. 吻合口部分黏膜坏死脱落
- E. 术中止血不确切

(86~88题共用题干)

女, 20岁. 发热, 腹痛、腹泻伴里急后重3天. 有不洁饮食史. 查体: T39.0, BP 120/70mmHg, 腹软, 脐周压痛(+), 反跳痛(-). 实验室检查: 血WBC $15 \times 10^9/L$, NO.80, LO.15. 粪便镜检WBC满视野, RBC 30个/HP.

86. 该患者最可能的诊断是

- A. 霍乱

- B. 急性阑尾炎
- C. 急性阿米巴痢疾
- D. 急性肠炎
- E. 急性细菌性痢疾

87. 该患者此病最可能的临床类型是

- A. 普通型
- B. 轻型
- C. 中毒型
- D. 混合型
- E. 休克型

88. 该患者首选的药物治疗是

- A. 链霉素
- B. 头孢菌素
- C. 青霉素
- D. 左氧氟沙星
- E. 红霉素

(89~91题共用题干)

男性, 32岁. 饱食后突感右上腹部剧痛. 迅速转移到右下腹和下腹部, 伴恶心. 呕吐不能减轻腹痛. 发病6小时来院急诊, 体检: 痛苦貌 血压12/8kPa, 脉搏120次/分, 全腹肌紧张、压痛. 反跳痛, 以上腹和右上腹部为著, 肠鸣音消失. 肝浊音界存在, 白细胞 $16 \times 10^9/L$, 中性0.9

89. 最可能的诊断是

- A. 肠扭转
- B. 十二指肠溃疡急性穿孔
- C. 急性胆囊炎伴穿孔
- D. 急性胰腺炎
- E. 阑尾炎穿孔致腹膜炎

90. 为明确诊断首先要进行

- A. 血清淀粉酶测定
- B. 急诊钡餐造影
- C. 急诊静脉胆道造影
- D. 腹部立位平片
- E. 血常规

91. 经检查决定剖腹手术. 术前准备中最关键的措施是

- A. 禁食
- B. 插胃管, 胃肠减压
- C. 半卧位
- D. 应用抗生素
- E. 补液, 输血

(92~93题共用题干)

初产妇,25岁,近几日出现左侧乳房红、肿、热、痛,伴发热、乏力,查体:T: 38.5、P: 88次/分,R: 20次/分,左侧腋窝淋巴结肿大、压痛.

92.首先考虑诊断是:

- A. 乳腺增生症
- B. 急性乳腺炎
- C. 乳房结核
- D. 导管内乳头状瘤
- E. 炎性乳腺癌

93.下列叙述错误的是

- A. 全身应用抗生素
- B. 饮食宜清淡,易消化,忌辛辣
- C. 停止患侧哺乳,以吸乳器吸出乳汁
- D. 炎症初期婴儿可以继续哺乳,若哺乳,喂奶前后应清洁乳头、婴儿的口腔及乳头周围
- E. 已形成脓肿,应切开排脓,切口应包绕乳头呈环状

(94~95题共用题干)

男性,40岁.近5个月来上腹胀痛.反酸,近3月反复呕吐,吐物为酸酵性宿食,按幽门梗阻内科治疗5天后缓解

94.幽门梗阻的原因可能为

- A. 黏膜炎症,水肿
- B. 溃疡愈合瘢痕形成
- C. 复合性溃疡
- D. 癌变
- E. 胃外压性梗阻

95.如内科治疗1周不见好转.应如何处理

- A. 继续胃肠减压,补液
- B. 手术治疗
- C. 抑酸治疗
- D. 抗生素治疗
- E. 口服胃黏膜保护剂

(96~98题共用题干)

女性,25岁,既往健康,突然咯血约500ml.查体:心肺未见异常,胸X线片双肺下野纹理增粗

96.你认为诊断应是

- A. 急性支气管炎
- B. 支气管扩张症
- C. 支气管内膜结核
- D. 支气管肺癌
- E. 急性肺梗死

97.为明确诊断可进一步做下列哪项检查

- A. 胸 CT
- B. 肺功能测定

- C. 痰细菌培养+药敏
- D. 痰抗酸杆菌涂片
- E. 纤维支气管镜检查

98.目前治疗的关键是

- A. 保持呼吸道通畅
- B. 应用垂体后叶素
- C. 高效广谱抗生素
- D. 尽快做胸 CT明确出血部位
- E. 纤维支气管镜直视下止血

(99~100题共用题干)

男性,32岁,胃溃疡史3年,今突上腹剧痛,面色苍白,大汗.查体:全腹压痛,腹肌紧张.似穿孔

添加老师微信: jyj qq666

99.胃溃疡穿孔在哪一部位多见

- A. 胃大弯
- B. 胃小弯
- C. 胃体
- D. 胃窦
- E. 胃底部

100.急性穿孔诊断后几小时内手术治疗效果最好

- A. 48小时
- B. 12小时
- C. 24小时
- D. 8小时内
- E. 10小时

(101~102题共用题干)

女,42岁,1周前无意间发现左乳外上象限4cm×3cm肿物,距乳头距离5cm,质硬,可推动,但病人双手叉腰时肿块活动度明显受限,左腋窝未扪及肿大淋巴结.

101.该患者最可能的诊断是

- A. 乳腺癌
- B. 乳房纤维腺瘤
- C. 乳房内瘤
- D. 乳腺炎
- E. 乳管内癌头状瘤

102.为明确肿物性质最适合的检查是

- A. 粗针穿刺活检
- B. 钼靶X线摄片
- C. 切取活检
- D. 近红外线扫描
- E. 细针穿刺细胞学

(103~104题共用题干)

男性,56岁,患胃溃疡15年.近3个月复发,经8周内科药物治疗无效,便隐血试验持续阳性

103. 该患者最可能的疾病是

- A. 胃溃疡活动
- B. 并十二指肠球部溃疡
- C. 胃溃疡癌变
- D. 慢性胃体炎
- E. 慢性胃炎

104. 该患者做哪项检查有助确诊

- A. 胃镜+活检
- B. 钡透
- C. 腹部平片
- D. 胸腹联透
- E. 胃液分析

(105~107题共用题干)

男性, 28岁. 十二指肠球部溃疡史5年, 突感上腹剧痛5小时. 继之全腹痛, 大汗淋漓. 查体: 全腹压痛及反跳痛. 似有溃疡穿孔可能

105. 哪项体征最有助于溃疡穿孔的诊断

- A. 腹肌紧张
- B. 腹叩诊呈鼓音
- C. 肝浊音界消失
- D. 腹部移动性浊音
- E. 肠鸣音消失

106. 急诊应做哪项检查

- A. 胃镜
- B. X线腹部视透
- C. X线胸透
- D. 钡透
- E. 腹腔试穿

107. 十二指肠穿孔哪一部位较多见

- A. 十二指肠球部小弯侧
- B. 十二指肠球部前壁
- C. 十二指肠球部后壁
- D. 十二指肠降部
- E. 十二指肠水平部

(108~110题共用题干)

男性, 16岁, 低热、咳嗽、咽部不适2周. 胸X线片示两肺下部网状及按小叶分布的斑片状浸润阴影, 血

WBC $10 \times 10^9/L$

108. 患者最可能的诊断是

- A. 支原体肺炎
- B. 病毒性肺炎
- C. 军团菌肺炎
- D. 肺炎球菌肺炎
- E. 浸润型肺结核

109. 首选哪项检查以确定诊断

- A. 痰细菌培养
- B. 痰真菌培养
- C. 冷凝集试验
- D. 血清抗体测定
- E. 痰抗酸杆菌涂片

110. 治疗药物首选

- A. 青霉素
- B. 红霉素
- C. 氟康唑
- D. 异烟肼+利福平
- E. 利巴韦林

(111~112题共用题干)

男, 56岁. 突发呕吐1小时. 呕吐量约500ml, 鲜红色, 可见血块, 伴大汗、心慌. 查体: $T38.5^\circ C$, $P112$ 次/分, $R26$ 次/分, $BP114/80$ mmHg. 巩膜轻度黄染, 肝掌(+), 胸壁可见蜘蛛痣, 心肺未见明显异常, 腹胀, 肝肋下未触及. 脾肋下3cm, 移动性浊音(+). 血常规: $Hb95g/L$, $WBC3.6 \times 10^9/L$, $Plt46 \times 10^9/L$, 半年前, 上消化道X线钡剂造影示食管虫蚀状改变, 可见蚯蚓状及串珠状影.

11. 该患者上述表现中最有诊断意义的临床特点是

- A. 呕吐及黑便
- B. 上消化道X线钡餐造影示食管串珠样表现
- C. 移动性浊音阳性
- D. 肝掌及蜘蛛痣
- E. 脾大、脾亢

112. 如该患者未及时治疗, 最易出现的并发症是

- A. 急性肾衰
- B. 急性肝脓肿
- C. 肝性脑病
- D. 急性心衰
- E. 局限性腹膜炎

(113~115题共用题干)

男性, 65岁. 进行性吞咽困难2个月, 现仅能进流质食物. 查体: 消瘦、锁骨上未触及肿大淋巴结. 食管X线钡餐透视显示: 食管中段黏膜破坏, 充盈缺损, 管腔狭窄

113. 进一步检查, 应首选

- A. 食管镜
- B. 食管拉网
- C. 放射性核素
- D. 胸部及纵隔CT
- E. 腹部超声波和肝功检查

14. 如病人出现声音嘶哑, 提示: 肿瘤已侵犯

- A. 声带
- B. 气管隆突
- C. 迷走神经
- D. 喉返神经
- E. 喉上神经

15. 腹部超声检查发现肝内有多发性转移瘤,提示,来自食管癌的

- A. 直接浸润
- B. 血行转移途径
- C. 淋巴转移途径
- D. 种植转移途径
- E. 消化道黏膜下浸润

(116~118题共用题干)

40岁农民,诊断左侧肺炎球菌肺炎,该患应用青霉素800万U,每日2次静点,3天后体温未明显下降,左胸痛加重

116. 可能为哪种情况

- A. 肺炎的诊断有误

- B. 肺炎并冠心病
- C. 出现肺外感染
- D. 用药不当
- E. 药品质量差

117. 应当立即做下列哪项工作

- A. 痰细菌培养+药敏,以确定诊断
- B. 急查心电图,确定是否冠心病
- C. 换用其他高档广谱抗生素
- D. 做胸B超、心脏B、超确定有否心包积液或胸腔积液
- E. 加用抗革兰阴性杆菌的药物

添加老师微信: jyj qq666

118. 治疗方面下列哪项有误

- A. 青霉素可继续应用
- B. 如能浆膜腔抽液,应做细菌培养
- C. 浆膜腔冲洗
- D. 加用头孢菌素类药物
- E. 抗生素疗程5~7天

B型题

答题要求

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案.请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号相应字母所属的方框涂黑,每个备选答案可能被选择一次、多次或者不被选择.

(119~120题共用备选选项)

- A. 外痔
- B. 内痔
- C. 混合痔
- D. 直肠脱垂
- E. 环形痔

119. 排便时脱出肛门,需手推才能还纳的圆形肿物是

120. 肿物呈梅花瓣样脱出肛门,同时肛门不松弛的是

(121~122题共用备选选项)

- A. PaO₂为70mmHg, PaCO₂为45mmHg
- B. PaO₂为70mmHg, PaCO₂为40mmHg
- C. PaO₂为55mmHg, PaCO₂为55mmHg
- D. PaO₂为50mmHg, PaCO₂为40mmHg
- E. PaO₂为65mmHg, PaCO₂为40mmHg

121. 符合I型呼吸衰竭的动脉血气标准是

122. 符合 II型呼吸衰竭的动脉血气标准是

(123~124题共用备选选项)

- A. 渐进加重的上腹部疼痛,向后背放射
- B. 周期性空腹及夜间上腹部疼痛,进餐后可缓解
- C. 反复上腹部胀痛,餐后加重伴暖气,饮食不节时加重

D. 周期性餐后上腹痛,至下一餐前缓解

E. 持续性上腹部疼痛,阵发性加重

123. 符合慢性胃炎临床表现的是

124. 典型的胃溃疡疼痛特点是

(125~127题共用备选选项)

- A. 吡喹酮
- B. 氯喹
- C. 青蒿素及其衍生物
- D. 伯氨喹
- E. 奎宁

125. 控制疟疾发作的首选药物是

126. 能抗疟疾复发和传播的药物是

127. 能杀灭红细胞内疟原虫裂殖体的药物是

(128~129题共用备选选项)

- A. 结肠脾曲
- B. 结肠肝曲
- C. 直肠和乙状结肠
- D. 回盲部
- E. 全结肠

128. 肠结核的好发部位是(助理医师不要求)

129. 溃疡性结肠炎的好发部位是
(130~131题共用备选选项)

- A. 麻痹性肠梗阻
- B. 低位肠梗阻
- C. 痉挛性肠梗阻
- D. 绞窄性肠梗阻
- E. 高位肠梗阻

130. 持续腹痛血便, 肠鸣音消失, 有腹膜刺激征的原因是

131. 呕吐粪样内容物, 腹部高度膨胀的原因是
(132~133题共用备选选项)

- A. 烂苹果味
- B. 大蒜味
- C. 腥臭味
- D. 酒味
- E. 苦杏仁味

132. 氰化物中毒时, 患者的呼吸气味可呈

133. 有机磷中毒时, 患者的呼吸气味可呈
(134~135题共用备选选项)

- A. 腹式呼吸基本消失
- B. 腹部压痛最显著的部位
- C. 腹肌强直呈板样
- D. 右下腹柔软无压痛
- E. 腹胀、肠鸣音消失

134. 消化性溃疡急性穿孔的典型体征是

135. 判断弥漫性腹膜炎病因时最有意义的是
(136~138题共用备选选项)

- A. 机械通气过度
- B. 慢性呼吸衰竭合并休克
- C. 大量利尿剂
- D. 慢阻肺合并呼吸道感染
- E. 应用强心剂

136. 可引起呼吸加重的是

137. 可引起代碱的是

138. 可引起呼酸合并代酸的是
(139~140题共用备选选项)

- A. 胆总管结石

- B. 胆囊结石
- C. 胰头部肿瘤
- D. 肝癌
- E. 肝门部肿瘤

139. 黄疸逐渐加深, 胆囊肿大, 但无压痛, 最可能的疾病是

140. 黄疸有深浅变化, 常伴腹痛和发热, 最可能的疾病是
是添加老师微信: jyjqq666
(141~144题共用备选选项)

- A. 急性脓胸, 脓汁稀薄
- B. 慢性局限性脓胸
- C. 慢性脓胸肺有纤维变性
- D. 急性脓胸并支气管胸膜瘘
- E. 肺脓肿

141. 应行穿刺治疗

142. 可行纤维板剥除术

143. 胸膜内胸廓成形术

144. 胸腔闭式引流术
(145~146题共用备选选项)

- A. 应用广谱抗生素
- B. 胸膜腔闭式引流
- C. 消除致病原因和脓腔
- D. 胸膜纤维板剥除手术
- E. 彻底排净脓液, 使肺早日复张

145. 急性脓胸的治疗原则

146. 慢性脓胸的治疗原则
(147~150题共用备选选项)

- A. 漏出液
- B. 渗出液
- C. 脓性胸液
- D. 血性胸液
- E. 乳糜性胸液

147. 充血性心力衰竭所产生的胸腔积液为

148. 系统性红斑狼疮所产生的胸腔积液为

149. 金黄色葡萄球菌肺炎并发的胸腔积液为

150. 胸导管阻塞或破裂所致的胸腔积液为

