

2022年临床医师资格执业押题

第四单元

A1型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列不属于临产后正常宫缩特点的是
A. 节律性
B. 规律性
C. 对称性
D. 极性
E. 缩复作用
2. 下列关于分娩的概念正确的是
A. 妊娠满37周至不满42足周分娩为足月产
B. 妊娠43周之后分娩为过期产
C. 妊娠满28周至不满31周分娩为早产
D. 妊娠28周及28周以内分娩为流产
E. 临产后胎儿死亡为死胎
3. 下列哪项为左侧脑干病变出现的症状
A. 左侧周围面瘫，右侧肢体中枢性瘫痪
B. 右侧周围面瘫，右侧肢体中枢性瘫痪
C. 左侧周围面瘫，左侧肢体中枢性瘫痪
D. 右侧周围面瘫，左侧肢体中枢性瘫痪
E. 全身中枢性瘫痪
4. 下列关于羊水的叙述，正确的是
A. 妊娠中期主要来源于胎盘
B. 母体与羊水的交换主要通过脐带
C. 胎儿吞咽可以使羊水量趋于平衡
D. 早期羊水主要来自胎儿尿液
E. 妊娠晚期胎儿的肝脏参与羊水的生成
5. 提示新生儿败血症较特殊的表现是
A. 精神欠佳
B. 体温不稳定
C. 哭声减弱
D. 黄疸退而复现
E. 食欲欠佳
6. 下列最易与陈旧性宫外孕相混淆的疾病是
A. 急性阑尾炎
B. 输卵管卵巢囊肿
C. 留流产
D. 卵巢黄体破裂
- E. 子宫穿孔
7. 下列与子痫发生无关的是
A. 双胎妊娠
B. 糖尿病
C. 羊水过多
D. 前置胎盘
E. 营养不良
8. 婴儿百白破的基础免疫时间为产后多长时间
A. 3、4、5个月
B. 4、5、6个月
C. 5、6、7个月
D. 2、3、4个月
E. 1、2、3个月
9. 有关小儿肠道菌群建立的论述，正确的是
A. 肠道菌群受食物成分影响
B. 母乳喂养者以大肠杆菌为主
C. 出生24小时后肠道开始出现细菌
D. 肠道菌群可帮助合成维生素D
E. 人工喂养者以双歧杆菌为主
10. 小脑出血的常见表现
A. 眩晕、频繁呕吐、头痛、病变侧共济失调
B. 意识丧失，双侧针尖样瞳孔、四肢瘫痪
C. 突发剧烈头痛、呕吐、脑膜刺激征，右侧偏瘫
D. 安静时发生偏瘫、偏身感觉障碍瘫痪，无意识障碍
E. 活动中急骤发生瘫痪、偏身感觉障碍，伴短暂意识障碍
11. 儿童风湿热的相关发病机制是
A. I型变态反应
B. 肠球菌的毒素作用
C. II型变态反应
D. III型变态反应
E. 链球菌直接损害
12. 心源性脑栓塞时，栓塞多发生在
A. 大脑前动脉
B. 大脑中动脉

- C. 大脑后动脉
D. 椎动脉
E. 基底动脉
13. 法洛四联症一般不会发生
A. 脑缺氧发作
B. 感染性心内膜炎
C. 肺炎
D. 脑栓塞
E. 脑脓肿
14. 儿童中枢神经系统白血病，最常见的是
A. 急性粒细胞白血病
B. 急性单核细胞白血病
C. 急性巨核细胞白血病
D. 急性淋巴细胞白血病
E. 急性红白血病
15. 急性脑综合症在临幊上最常见的表现是
A.嗜睡
B. 谛妄状态
C. 昏迷
D. 意识模糊
E. 昏睡
16. 正常枕先露分娩时，仰伸发生于
A. 胎头拨露时
B. 胎头着冠时
C. 胎头枕骨在耻骨弓后时
D. 胎头枕骨下部达耻骨联合下缘时
E. 胎头后囱在耻骨弓后时
17. 哪一项提示低血钾
A. 神经肌肉兴奋性增加
B. 肠鸣音消失，四肢肌力低下
C. 心音亢进，心率减慢
D. 呼吸深大
E. 肠鸣音亢进
18. 在孕妇腹壁上听诊与母体心率一致的是
A. 胎心音
B. 子宫杂音
C. 脐带杂音
D. 胎动音
E. 肠蠕动音
19. 造成子宫收缩乏力的主要原因，正确的是
A. 产妇疲劳过度或受到不良刺激可造成高涨型宫缩乏力
B. 过多地使用镇痛镇静剂，抑制子宫收缩
C. 妊娠期子宫肌纤维数目增长缓慢
D. 胎先露压迫宫颈时间过长
- E. 子宫肌肉对乙酰胆碱的敏感性增加
20. 正常足月儿的皮肤外观特点是
A. 肤色苍白，皮下脂肪丰满
B. 肤色稍黄，皮下脂肪少
C. 肤色红润，皮下脂肪少
D. 肤色红润，皮下脂肪丰满
E. 肤色稍黄，囊毛少
21. 关于人工流产吸宫术的并发症，正确的是
A. 空气栓塞为常见的并发症
B. 子宫穿孔是子宫位置及大小检查不清所致
C. 人工流产综合征是由于心脏病引起的
D. 术后闭经都是由于宫颈粘连所致
E. 术后持续阴道出血主要由于感染所致
22. 下列哪项正确（助理医师不要求）
A. 右三叉神经损害时张口下颌向右偏斜
B. 右面神经损害时露齿口角偏向右侧
C. 右舌下神经损害时舌尖左偏
D. 右展神经损害右眼球向内活动受限
E. 右视神经损害时右瞳孔缩小
23. 下列哪项因素与产后宫缩乏力性出血无关
A. 产程延长
B. 精神过度紧张
C. 羊水过多
D. 感染
E. 胎膜早破
- 添加老师微信： j y j q q 6 6 6
24. 与自发性蛛网膜下腔出血发病最不相关的因素是
A. 脑血管畸形范围
B. 性别
C. 血压上升的程度
D. 颅内压力的变化
E. 动脉瘤的大小
25. 幼儿期指的是
A. 生后28天~满2周岁
B. 生后1个月~满2周岁
C. 生后1周岁~满2周岁
D. 生后1周岁~满3周岁
E. 生后2周岁~满3周岁
26. 脊髓灰质炎疫苗初种的年龄应自什么时候开始
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 4个月
E. 5个月

27. 妊娠早期的海格征是指

- A. 子宫峡部极软，子宫颈和子宫体似不相连
- B. 子宫前后径变宽，略饱满呈球形
- C. 子宫增大变软
- D. 双合诊时感到子宫半侧较另半侧隆起
- E. 阴道和子宫颈呈紫蓝色

28. 营养性维生素D缺乏性手足搐搦症与佝偻病发病机理的不同点在于

- A. 钙吸收代谢障碍
- B. 磷吸收代谢障碍
- C. 甲状旁腺功能不足
- D. 维生素缺乏
- E. 神经系统兴奋性增高

29. 异位妊娠常见的着床部位是

- A. 卵巢
- B. 输卵管
- C. 子宫颈
- D. 子宫角
- E. 腹腔

30. 下述哪种情况可使用缩宫素

- A. 宫颈水肿
- B. 头盆不称
- C. 不协调性宫缩乏力
- D. 协调性宫缩乏力
- E. 子宫痉挛性狭窄环

31. 卧位腰椎穿刺，脑脊液压力正常值是

- A. 50~70mmH₂O
- B. 80~180mmH₂O
- C. 190~220mmH₂O
- D. 230~250mmH₂O
- E. 260~280mmH₂O

添加老师微信： j yj qq666

32. 下列哪项不是先兆子宫破裂的诊断依据

- A. 先露部下降受阻
- B. 血尿
- C. 病理性缩复环
- D. 血红蛋白下降
- E. 下腹剧痛拒按产程延长，先露下降受阻

33. 维生素D缺乏病可靠的早期诊断指标是

- A. 血钙降低
- B. 血磷降低
- C. 血镁降低
- D. 血1,25-(OH)D₂-D₃降低
- E. 血碱性磷酸酶增高

34. 各种流产的临床特点，哪项是正确的

- A. 先兆流产： 宫口闭，出血量少
- B. 完全流产： 腹痛，宫口松
- C. 难免流产： 出血少，未破水
- D. 不全流产： 宫口闭，出血减少
- E. 过期流产： 胚胎死亡达1个月以上尚未排出者

35. 周围性舌下神经麻痹的症状不包括(助理医师不要求)

- A. 一侧麻痹，伸舌时舌尖偏向麻痹侧
- B. 一侧麻痹，伸舌时舌尖偏向麻痹对侧
- C. 两侧麻痹，伸舌时受限或不能
- D. 舌肌萎缩及伴有肌束震颤
- E. 电检查有变性的反应

36. 在分娩机转中，肛提肌对分娩的作用不包括

- A. 协助胎头内旋转
- B. 协助胎盘娩出
- C. 使胎头俯屈
- D. 使胎头仰伸
- E. 使胎头复位外旋转

37. 下列哪个征象肯定进入第二产程

- A. 产妇屏气向下用力
- B. 胎头部分露于阴道
- C. 产妇排尿困难
- D. 子宫口开全
- E. 脐带脱出于阴道口外

38. 新生儿病理性黄疸的特点是

- A. 生后24小时内出现黄疸
- B. 足月儿2周内消退
- C. 早产儿3~4周内消退
- D. 血清胆红素80—100mg/L
- E. 血清结合胆红素10mg/L左右

39. 新生儿尤其是早产儿易发生寒冷伤综合征的病理生理中，错误的是

- A. 体温调节中枢发育不成熟
- B. 皮肤表面积相对较大
- C. 血流较丰富
- D. 棕色脂肪含量较多
- E. 体内能量储存少

40. 子宫峡部是

- A. 子宫颈阴道部
- B. 子宫颈阴道上部
- C. 子宫颈管最狭窄部分
- D. 子宫颈与子宫体之间最狭窄部分
- E. 子宫体最狭窄部分

41. 霍纳综合征的临床表现是

- A. 眼裂正常，瞳孔扩大，直接对光反射迟钝
B. 眼裂扩大，瞳孔缩小，直接对光反射正常
C. 眼裂变小，瞳孔缩小，直接对光反射正常
D. 眼裂变小，瞳孔正常，直接对光反射正常
E. 眼裂变小，瞳孔扩大，直接对光反射消失
42. 做全子宫及单侧附件切除术时，切断下列哪项最不易损伤输尿管
A. 骨盆漏斗韧带
B. 卵巢固有韧带
C. 子宫骶骨韧带
D. 子宫动脉
E. 主韧带
43. 苯丙酮尿症新生儿筛查采用的是
A. 尿有机酸分析
B. 血氨基酸分析
C. 尿蝶呤分析
D. 尿三氯化铁试验
E. Guthrie 细菌生长抑制试验
44. 关于皮下结节的描述以下哪项是错误的
A. 粟米或豌豆大小，圆形，质硬
B. 分布于肘、腕、踝、膝关节屈侧
C. 见于2%~16%的风湿热病人
D. 起病数周后出现
E. 2~4周自然消失
45. 对强迫症有特殊效果的是下列哪一种药物
A. 氯氮平
B. 多塞平
C. 阿普唑仑
D. 氯丙嗪
E. 氯米帕明
46. 关于输卵管各部，正确的是
A. 通入子宫壁内的为间质部
B. 间质部外侧的为壶腹部
C. 峡部比间质部的管腔窄
D. 漏斗部（伞部）为输卵管最宽大部分
E. 以上都不是
47. 以下表现可发生于化脓性脑膜炎新生儿，除了
A. 前囱隆起
B. 体温不升
C. 惊厥发作
D. 拒食吐奶，面色青紫
E. 剧烈头痛
48. 左侧卵巢动脉不同于右侧卵巢动脉，还可以来自
A. 髂外动脉
- B. 髂内动脉
C. 腹主动脉
D. 肾动脉
E. 以上都不是
49. 针对焦虑症下列哪一种说法是错误的
A. 焦虑症的发作者有遗传基础
B. 焦虑症患者运动后血中乳酸较对照组高
C. 焦虑症患者有去甲肾上腺素能活动增加
D. 焦虑症的发生可能与5-羟色胺功能增高有关
E. 焦虑症患者的发病与脑内病毒感染有关
50. 卵巢表面的组织为
A. 腹膜
B. 卵巢白膜
C. 卵巢皮质
D. 结缔组织
E. 生发上皮
51. 子宫动脉来自
A. 髂外动脉
B. 髂内动脉
C. 腹主动脉
D. 肾动脉
E. 膝动脉
52. 不属于神经衰弱常见症状的是
A. 易兴奋、易疲劳
B. 意志减退
C. 紧张性头痛
D. 情感脆弱
E. 缺乏睡眠感
53. 关于子宫韧带的解剖，正确的是
A. 圆韧带起于子宫角，止于腹股沟
B. 阔韧带富于肌纤维，与子宫体肌纤维相连
C. 卵巢固有韧带使子宫倾向后方
D. 主韧带横行子宫颈两侧和骨盆侧壁之间
E. 子宫动静脉从阔韧带上部穿过
54. 维持子宫正常位置是
A. 盆底肌肉及筋膜的支托作用
B. 膀胱和直肠的支托
C. 子宫韧带和盆底肌肉筋膜的支托
D. 子宫四对韧带的作用
E. 腹腔压力作用
55. 下述疾病中有哪项不属于心身疾病
A. 梅尼埃综合征
B. 原发性青光眼
C. 消化性溃疡

- D. 原发性高血压
E. 慢性酒中毒
56. 关于子宫的解剖, 下述哪项正确
A. 成年的子宫长7~8cm, 宽4~5cm, 厚2~3cm
B. 成年人子宫体与子宫颈的比例为1: 2
C. 子宫峡部的黏膜无周期性变化
D. 子宫颈主要由平滑肌构成
E. 成年妇女子宫颈管长4~5cm
57. 有关产褥感染下列哪项是正确的
A. 指产后生殖器官感染后, 引起局部和全身的炎性变化
B. 多为单种细菌感染
C. 凡产褥期体温升高均为生殖器感染所致
D. 产后未发生生产褥感染后, 宫腔内培养不出细菌
E. 以上都不是
58. 重症肌无力患者应避免应用的药物是
A. 万古霉素
B. 盐酸小檗碱
C. 头孢噻肟
D. 青霉素
E. 免疫球蛋白G
59. 下列所述哪项不是淋病的好发部位
A. 尿道
B. 尿道旁腺
C. 前庭大腺
D. 子宫颈管
E. 子宫内膜
60. 关于淋病的描述, 下列哪项是错误的
A. 淋病是当前发生率最高的STD
B. 淋病侵袭泌尿生殖道的黏膜和外阴皮肤
C. 淋球菌离体后在干燥条件下2小时即灭活
D. 一般消毒剂与肥皂均可使其迅速灭活
E. 淋病在潮湿环境中可生存较长时间
61. 精神症状常见于
A. 额叶肿瘤
B. 颞叶肿瘤
C. 顶叶肿瘤
- D. 枕叶肿瘤
E. 小脑肿瘤
62. 哪一项不是小脑幕裂孔疝常见的症状
A. 意识障碍
B. 一侧面部神经麻痹
C. 一侧动眼神经麻痹
D. 剧烈头痛, 频繁呕吐
E. 血压增高
63. 梅毒的实验室诊断, 下列哪项是正确的
A. 血清学试验敏感性高, 在感染后即为阳性
B. 性病研究室试验(VDRL) 可作定量、定性试验, 易于操作, 敏感性高, 结果快, 目前应用最广泛
C. 一期梅毒时硬下疳表面的渗出物中含大量梅毒螺旋体但到二期梅毒时肿大的淋巴结抽出液中已找不到螺旋体
D. 血清液试验在感染后出现阳性, 到二期时为阴性
E. 暗视野显微镜检查找梅毒螺旋体已废用
64. 下述哪项不符合震颤麻痹的症状
A. 面具脸
B. 慌张步态
C. 搓药丸样动作
D. 小写症
E. 动作时震颤加剧
65. 患者将一盏球形灯看成一张娃娃脸的画面, 此现象是
A. 视物变形
B. 幻视
C. 错视
D. 非真实感
E. 妄想
66. 关于梅毒, 下列哪项是正确的
A. 梅毒是一种全身病变的性传染病
B. 梅毒螺旋体抵抗力较强, 对化学消毒剂不敏感
C. 梅毒螺旋体不耐热, 加热到50~1分钟内死亡
D. 梅毒主要由性行为传播, 不能通过接触病人污染的衣物而间接传染
E. 梅毒可经产道传播, 而不能通过胎盘

A2型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

67. 1岁男孩, 多汗, 夜惊, 体检: 前囟门2cm×2cm, 方颅, 出牙2个, 串珠明显, 血钙2mmol/L(8mg/dl),

Ca×P=28, 伴有消化功能障碍, 并影响动作。采用哪项治疗

- A. 补充钙剂
B. 口服维生素D剂400IU/日及钙剂
C. 口服维生素D剂800IU/日及钙剂
D. 注射维生素D15万IU~30万IU,注射1次,1个月后改预防量
E. 注射维生素D330万IU1次肌注即可
68. 女,35岁.因月经过多且经期延长,贫血,血红蛋白仅56g/L,而决定行全子宫切除术.术前主刀医师在考虑手术各步注意事项时,下列哪项可不必顾虑
A. 推离膀胱腹膜反折时,避免损伤膀胱
B. 推离直肠子宫腹膜反折时,避免损伤直肠
C. 切断子宫骶骨韧带时,避免损伤输尿管
D. 切断圆韧带时,避免损伤输尿管
E. 切除子宫动脉时,注意勿损伤输尿管
69. 女,38岁.于高处取物时不慎摔下,呈骑跨式,伤及外阴部位,疼痛难忍,外阴血肿最易发生的部位是
A. 大阴唇
B. 小阴唇
C. 阴阜部
D. 阴蒂部
E. 会阴部
70. 男58岁.近半年工作压力大,经常出现差错,刚做过的事情就记不起来,性格变得古怪,喜怒无常,有时情绪低落,一次喝了50ml啤酒后,找不到家而露宿街头,最可能的诊断是(助理医师不要求)
A. 复发性抑郁症
B. 阿尔茨海默病
C. 躁狂症
D. 神游症
E. 急性酒精中毒
71. 女,50岁.月经周期紊乱两年,现停经40天,基础体温单相,宫颈黏液羊齿状结晶呈高度影响,此时下列何项为相应的子宫内膜表现
A. 增生期图像
B. 分泌期图像
C. 萎缩图像
D. 分泌早期图像
E. 增生过长图像
72. 男婴,足月,自然分娩,娩出时脐带绕颈1周,Apgar评分1分钟与5分钟分别为3分、7分.体检:小儿激惹,拥抱反射增强,肌张力高.最可能是
A. 新生儿低血钙
B. 新生儿低血糖
C. 新生儿脑膜炎
- D. 室管膜下出血
E. 新生儿缺氧缺血性脑病
73. 女,26岁.结婚3年未孕,月经周期素来规则而正常,作宫颈黏液涂片检查,见大量椭圆体结晶,判断此时应为月经周期的第几天
A. 第3~5天
B. 第10~12天
C. 第14~15天
D. 第18~20天
E. 第22~27天
74. 患者右侧角膜直接反射存在,间接反射消失,病变在
A. 右侧三叉神经
B. 左侧三叉神经
C. 右侧动眼神经
D. 左侧动眼神经
E. 左面神经
5. 女,27岁.结婚2年未孕(不分居,未避孕),作为了解卵巢功能的一个方法,决定作阴道组织学涂片检查,医生在考虑采样和分析结果时,下列何项考虑不对
A. 阴道黏膜受雌孕激素的变化而改变
B. 阴道黏膜的变化在阴道中1/3处最明显
C. 排卵前在雌激素作用下增生,角化
D. 排卵前阴道细胞富含糖原,并被阴道杆菌分解而呈酸性
E. 排卵后在孕激素作用下上皮细胞大量脱落
76. 男婴,足月顺产,22天.出生体重3100g,生后母乳喂养,第3天出现皮肤黄染,至今黄疸不退.胃纳好,体温正常.体检:体重3750g,除皮肤黄染外,无其他异常.血常规及尿常规均正常,血清胆红素 $204 \mu\text{mol/L}$.如何处理
A. 血培养
B. 测G-6PD活性
C. 暂停母乳喂养
D. 网织红细胞计数
E. 以上都不是
- 添加老师微信: jyj qq666
77. 患者一侧瞳孔散大,直接及间接反射均消失,病变在
A. 对侧视神经
B. 同侧视神经
C. 对侧动眼神经
D. 同侧动眼神经
E. 同侧视神经及动眼神经
78. 女性,26岁,已婚.月经规律,周期28天,末次月经4月1日,下列哪项正确

临床医师资格笔试各单元考试科目及分值

西医执业医师资格考试内容(仅供参考)

第一单元	基础100、少部分其他临床部分
第二单元	循环45、泌尿35、血液25、运动20、内分泌20、风湿5
第三单元	消化80、呼吸40、其他15、传染15
第四单元	妇产70、儿科50、精神30

西医助理医师资格考试内容(仅供参考)

第一单元	消化40、循环23、精神22、呼吸20、 运动15、血液13、内分泌12、风湿5
第二单元	基础60、妇产30、儿科25、泌尿15、其他10、传染10

A. 优势卵泡的选择发生在4月7日

B. 排卵期约在4月5日

C. B超下能观察到原始胎心搏动的时间约在6月1日

D. 若受孕，孕卵着床时间约在4月18日

E. 预产期约在次年1月8日

79. 病人男性，21岁。右侧肢体抽搐2年，突然昏迷1

小时。查体：神志浅昏迷，左侧肢体偏瘫。CT显示右额叶脑内血肿，临床诊断最可能是

A. 原发性癫痫

B. 脑动脉硬化

C. 脑动脉瘤

D. 脑血管畸形

E. 高血压脑出血

80. 一年轻妇女正常阴道分娩刚结束，检查胎盘和脐带时，

应注意符合下列哪种情况才是正常的

A. 1条动脉，1条静脉

B. 1条动脉，2条静脉

C. 2条动脉，1条静脉

D. 2条动脉，2条静脉

以上都不是

81. 男孩4岁，近日来咳嗽。少量痰液，昨夜突然出现呼

吸困难，大汗，面色发白，肢冷，脉搏120次/分，血

压90/60mmHg，肺普遍哮鸣音，心脏无杂音，口唇发绀，

胸片无异常。最可能的诊断

A. 急性左心衰竭

B. 支气管炎

C. 炎球菌肺炎

D. 支气管哮喘

E. 过敏性肺炎

82. 一患者需要大声唤醒，醒后可简单回答问题及勉强配

合检查，停止刺激后即入睡，这种意识状态是

A.嗜睡

B.昏睡

C.昏迷

D.谵妄

E. 意识模糊

83. 女，28岁。已婚，平时月经尚规则，现停经50天。

停经32天尿乳胶凝集抑制试验阴性，第33天，肌注黄

体酮5天，停药后无撤退性出血，基础体温维持在37

左右，已近5周，下列哪种诊断最可能

A. I度闭经

B. II度闭经

C.早孕

D. 多囊卵巢综合征

E. 高泌乳素血症

84. 男孩，8岁。眼睑水肿4天，伴茶色尿1天，2周前有发热、咽痛。查体：BP120/90mmHg。尿常规：蛋白(++)，尿沉渣镜检：RBC40-50/高倍视野，WBC8-10/高倍视野。最可能的临床诊断是

A. 急进性肾炎

B. 急性泌尿感染

C. IgA肾病

D. 急性肾小球肾炎

E. 肾炎型肾病

85. 女，31岁。婚后3年不孕。患者平素月经规律，妇科检查未发现异常，内分泌检查正常，造影示双侧输卵管堵塞。适宜的辅助生育技术是

A. 人工授精

B. 植入前遗传学诊断技术

C. 配子输卵管内移植

D. 胞浆内单精子注射

E. 体外受精与胚胎移植

86. 女，24岁，经产妇。阴道分娩后72小时，自觉乳房胀痛，发热，T37.5℃，下腹部阵发性疼痛伴阴道少许流血。正确的处理是

A. 应用抗生素

B. 口服镇痛剂

C. 局部理疗

D. 排空乳房

E. 静脉滴注缩宫素

87. 男性，41岁，近半年来，反复发生左上肢抽搐，每次半分钟左右自行缓解，应考虑

A. 单纯部分性癫痫发作

B. 肌阵挛发作

C. 自动症

D. 小舞蹈病

E. 低钙抽搐

88. 女婴，10个月，腹泻3天，加重2天。暗绿色水样便每日10余次，量多、腥臭，伴高热、呕吐、少尿。查体：精神萎靡，呈嗜睡状，前因眼窝凹陷，皮肤弹性差，心音较低钝，腹胀，肝脾不大。实验室检查：粪镜检有大量脓细胞，血钠135mmol/L，血钾3.5mmol/L。患儿最可能的诊断是

A. 轮状病毒肠炎

B. 金黄色葡萄球菌肠炎

C. 细菌性痢疾

D. 大肠埃希菌肠炎

E. 真菌性肠炎

添加老师微信: j yj qq666

89. 男, 11个月, 发热咳嗽3~4天, 食后呕吐, 腹泻5~6次/天, 蛋花汤样. T39.5°C, P140次/分, R60次/分, 神萎, 气促, 唇周青紫, 口唇干燥, 心音略低, 二肺底湿啰音, 腹部皮肤弹性减退. 其酸碱平衡紊乱; 血pH7.24, PaCO2 9.4kPa, SB 24mmol/L, BE: -6 mmol/L。应考虑

- A. 代谢性碱中毒, 代偿性
- B. 呼吸性酸中毒, 代偿性
- C. 呼吸性酸中毒, 失代偿性
- D. 代谢性酸中毒, 失代偿性
- E. 代谢性合并呼吸性酸中毒

90. 女, 18岁, 未婚. 月经规律, 无停经史. 突发下腹部疼痛伴恶心、呕吐8小时. 查体: P78次/分, BP100/70mmHg, 直肠-腹部诊: 子宫前位, 正常大小, 右侧附件区触及一个6cm × 5cm × 5cm囊实性包块, 边界清楚, 触痛明显. 最可能的诊断是

- A. 卵巢黄体破裂
- B. 输卵管妊娠破裂
- C. 急性阑尾炎
- D. 卵巢肿瘤蒂
- E. 浆膜下子宫肌瘤

91. 男性, 29岁, 突发四肢乏力不适1天, 下肢明显. 发病前有饮酒史, 既往曾发作2次, 每次发作腰穿检查脑脊液, 常规及生化无异常发现. 体检: 四肢肌力减低, 肌张力下降, 腱反射消失, 感觉正常. 最可能的诊断是

- A. 急性多发性神经根炎
- B. 脊髓肿瘤
- C. 急性脊髓炎
- D. 周期性瘫痪
- E. 颈椎病

92. 女, 31岁. 月经不规律3年, 闭经7个月, 溢乳2个月。对诊断最有价值的测定项目是

- A. 孕激素
- B. 雄激素
- C. 催乳素
- D. 促甲状腺素
- E. 雌激素

93. 8个月女孩, 发热、腹泻轻咳2天入院, 大便10余次/日, 蛋花汤样, 大便镜检: 白细胞2~3个/HP, 大便细菌培养阴性, 血常规: WBC为 $7.5 \times 10^9/L$, 除轻度脱水征外, 无其他异常. 最可能的诊断是

- A. 致病性大肠杆菌肠炎
- B. 细菌性痢疾

C. 病毒性肠炎

- D. 金葡菌肠炎
- E. 真菌性肠炎

94. 女, 31岁, G2P0. 停经85天, 阴道不规则流血10余天. 恶心、呕吐较重, 伴下腹隐痛, 无咳嗽、咯血. 妇科检查: 阴道黏膜未见异常, 宫颈光滑, 宫口可见血液流出, 宫底平脐, 质软, 未触及胎体, 未闻及胎心

hCG10000U/L应首先考虑的诊断是

- A. 侵蚀性葡萄胎
- B. 葡萄胎
- C. 绒癌
- D. 死胎
- E. 先兆流产

95. 女, 31岁. 产后2个月出现怕脏, 担心宝宝被细菌感染, 因而反复洗手、反复清洗奶瓶. 丈夫下班回来, 要求其必须换洗所有衣物. 有时出现把宝宝扔出窗外的冲动, 但从未真的实施. 患者明知这些想法和行为不合理, 也试图控制, 但没有效果, 内心非常痛苦. 该患者最可能的诊断为

- A. 抑郁症
- B. 恐惧症
- C. 疑病障碍
- D. 精神分裂症
- E. 强迫障碍

96. 一个2岁的男婴, 近4日来发热38~39°C, 烦躁不安, 精神不振, 喷射性呕吐, 2~3次/日. 体检: 精神萎靡, 目光凝视, 心音有力, 呼吸粗糙, 双扁桃体肿大. 充血, 肝、脾不大, 颈轻度抵抗, 克氏征(+), 巴氏征(+), 为确定诊断首先应做何种检查

- A. 血细胞计数+分类
- B. 盐水灌肠查大便
- C. 腰穿检查脑脊液
- D. 结核菌素试验
- E. 头颅CT

97. 女, 31岁, 初产妇. 妊娠40+2周, 临产后20小时分娩一女活婴, 胎儿娩出35分钟, 胎盘未娩出, 无阴道流血. 查体: P80次/分, BP130/80mmHg, 子宫轮廓不清. 此时不恰当的处理方法是

- A. 下压宫底并用力牵拉脐带
- B. 给予缩宫素
- C. 建立静脉通道
- D. 按摩子宫
- E. 探查宫腔和胎盘

98. 女, 35岁, G6P1. 月经量增多3年, 经期及周期正

常.妇科检查：子宫前位，饱满，活动差，无压痛。推荐该患者最佳的避孕方法是

- A.惰性宫内节育器
- B.避孕套
- C.体外排精
- D.紧急避孕药
- E.短效口服避孕药

99.女,40岁.10年前因胆结石行胆囊切除术,术后病情痊愈.2年前单位倒闭,患者被安排到另一单位看大门,觉得看大门很没面子,但为生活着想又不得不去上班。1年前患者出现胆囊区皮肤触摸疼痛、胃胀不适伴阵发性心悸、胸闷、失眠、心情不好。患者四处求医,反复做过腹部B超、胃镜、心电图、全套血液生化检查,结果均正常。服过一些药物,病情时好时坏。患者不相信任何检查结果及医师的解释,仍要继续医治。该患者的诊断是

- A.抑郁症
- B.焦虑症
- C.强迫症
- D.胆囊切除术后综合征
- E.躯体形式障碍

100.女,28岁.初孕妇,身高147cm.妊娠41周,规律宫缩12小时后孕妇紧张、乏力,BP140/90mmHg,胎心率140次分,枕左前位,先露S=-1,宫口开大9cm,羊水清亮,坐骨棘间径8cm.该患者正确的处理是

- A.徒手旋转胎头
- B.人工破膜加速胎头下降
- C.产钳助娩
- D.胎头吸引

E.剖宫产

101.女,40岁.瘢痕子宫,妊娠39周,规律宫缩8小时.宫口6cm,先露S=+1,突然腹痛加剧.查体:T37.5°C,P100次分,BP90/60mmHg,宫底4cm,先露S=2,胎心60次分,2分钟后胎心消失.最可能的诊断是

- A.子宫破裂
- B.羊水栓塞
- C.胎盘早剥
- D.腹腔感染
- E.先兆子宫破裂

102.女,40岁,眼睑下垂,全身无力3年.服用吡啶斯的明效果明显,但近两日感冒后突感胸闷,今日上午气促,口唇发绀,静脉注射腾喜龙后明显好转,下列处理中,哪项错误的是(助理医师不要求)

- A.保持呼吸道通畅
- B.立即停用抗胆碱酯酶药物
- C.肌注新斯的明
- D.气管切开,人工呼吸
- E.静脉补液,维持水,电解质平衡

103.女,28岁,初产妇.妊娠39周,规律宫缩10小时,查宫口扩张6cm,LOA,先露S=+1,胎心140次/分,胎儿监护NST有反应型。需要进一步的处理是

- A.催产素加强宫缩
- B.给予宫颈封闭
- C.肌注哌替啶
- D.严密观察产程
- E.超声评估胎儿大小

A3型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(104~106题共用题干)

10月男婴、经常出现夜惊不宁,近1周加重,多汗,烦躁,该患儿生后一直母乳不足,混合喂养,尚未添加辅食。此患儿到门诊就诊时

- 104.体格检查最易发现的阳性体征为
- A.皮肤弹性差
 - B.皮下脂肪明显减少
 - C.体检正常
 - D.方颅,前囱大,乳牙未萌出
 - E.双下肢淤点,瘀斑

105.该患儿最可能的诊断

- A.佝偻病
- B.营养不良
- C.正常儿
- D.上呼吸道感染
- E.消化不良

106.本病发生的病因,哪些不正确

- A.日光照射不足
- B.维生素D摄入不足
- C.维生素D的需要量增加

D. 食物中钙磷含量过低或比例不当

E. 甲状旁腺功能不足

(107~110题共用题干)

女,35岁,G1P0,孕39+6周,上午6时起宫缩32~37秒/4~5分钟.强度(++)~(+++),胎心率140次/分,L0A,上午8时入院,入院时肛查:宫口开1cm,先露S-1,于下午8时,宫缩20~25秒/7~8分,强度(++)~(+++),宫口开大8cm,胎心率155次/分,阴道检查:坐骨切迹<2指,骶凹平坦,坐骨结节间径7.5cm

107. 可能的诊断是

- A. 高龄初产
- B. 骨盆入口狭窄
- C. 骨盆入口和出口狭窄
- D. 出口狭窄
- E. 中骨盆和出口狭窄

108. 下列哪项处理不恰当

- A. 胎心监测(OCT)
- B. 吸氧
- C. 静滴催产素
- D. 重新估计胎儿体重
- E. 检查耻骨联合上方是否有压痛

109. 随产程时间延长,下列哪种体征不会出现

- A. OCT提示胎心率减速
- B. 羊水清亮
- C. 宫缩减弱
- D. 胎心突然消失
- E. 耻骨联合上方压痛

110. 尽快结束分娩的措施是

- A. 急诊剖宫产
- B. 胎头吸引术
- C. 产钳助产
- D. 静待自然分娩
- E. 待宫口开全后再讨论分娩方式

(11~113题共用题干)

女性,42岁,2个月来,情绪低落,兴趣索然,自觉"高兴不起来",生不如死,"自己的脑子不灵了","像是生了锈的机器",认为自己成了家庭和社会的累赘,"成了废物",有胸闷、心悸、心慌的症状,自认为有严重心脏病,不能治愈.主动性言语及活动明显减少,生活被动,愿独处.曾多次自杀未遂,睡眠不好,早醒

11. 该病人的精神症状不包括

- A. 情绪低落
- B. 思维迟缓

C. 自责自罪观念

D. 夸大妄想

E. 意志活动减退

112. 该病人的思维表现不包括

- A. 思维云集
- B. 思维迟缓
- C. 自杀企图
- D. 疑病观念
- E. 自责自罪观念

113. 该病人首要注意的问题是防止

- A. 活动少而引起的合并感染
- B. 拒食导致营养不良
- C. 自杀行为
- D. 冲动伤人
- E. 症状波动的规律

(114~116题共用题干)

女,45岁,既往月经正常,近1年来经期延长10~15天,量多,此次停经50天,后有阴道出血20天,血红蛋白80g/L,盆腔检查(-),基础体温单相

114. 为排除宫体癌应该进行下列何项辅助诊断

- A. CA125 测定
- B. 腹腔镜检查并作活检
- C. 分段诊刮并送病理
- D. 超声检查
- E. 子宫输卵管造影

115. 如通过检查排除宫体癌后,应考虑为

- A. 子宫黏膜下肌瘤
- B. 子宫内膜炎
- C. 子宫内膜息肉
- D. 无排卵性异常子宫出血
- E. 排卵性异常子宫出血

116. 对该病人最佳治疗方案是

- A. 雌激素周期疗法,以调整周期
- B. 雌一孕激素联合周期治疗
- C. 促排卵药以调整周期
- D. 雌一孕激素序贯疗法
- E. 月经周期后半期应用孕激素

(117~119题共用题干)

26岁,临产21小时,阴道有少量淡绿色液体流出,宫缩25秒/6~8分,胎心音150次/分.肛查宫口开大2+cm,宫颈轻度水肿.S-2

添加老师微信: jyj qq666

117. 下列哪项诊断正确

- A. 活跃期延长

- B. 潜伏期延长
- C. 原发性宫缩乏力
- D. 胎儿窘迫
- E. 头盆不称

118. 根据产妇病情, 不应进行哪项处理

- A. CST检查
- B. 给病人吸氧
- C. 静滴5%苏打水
- D. 静脉推注安定10mg
- E. 静滴催产素

119. CST 监护出现频繁的晚期减速, 胎心音160次/分, 此时应首选哪项处理

- A. 左侧卧位
- B. 静滴50%葡萄糖
- C. 剖宫产结束分娩
- D. 继续给氧
- E. 静滴小剂量催产素

(120~121题共用题干)

患儿, 4岁。智能运动发育落后, 两眼内侧距离宽, 鼻梁低平。双眼外侧上斜, 经常伸舌, 通贯手

120. 为确定诊断需做下述哪项检查

- A. 血清 TSH、T3、T4测定
- B. 尿三氯化铁试验
- C. 染色体核型分析
- D. 骨龄测定
- E. 尿蝶呤分析

121. 其最可能的诊断为

- A. 先天性甲状腺功能低下
- B. 21-三体综合征
- C. 苯丙酮尿症
- D. 18-三体综合征

黏多糖病

(122~125题共用题干)

男性, 26岁, 1个月来, 兴高采烈, 话多, 自觉思维敏捷"脑子特别灵", "自己有超人才能", 整日忙碌不停, 精力旺盛, 爱表现自己, 举止轻浮, 好接近异性, 食欲亢进, 体重减轻, 睡眠量减少, 无疲倦感

122. 其精神症状不包括哪项

- A. 心境高涨
- B. 思维奔逸
- C. 罪恶妄想
- D. 夸大妄想
- E. 活动增多

123. 该病主要表现为

- A. 一般无幻觉
- B. 明显的思维联想松散
- C. 紊乱性兴奋躁动
- D. 协调的精神运动性兴奋
- E. 行为轻浮

124. 该病人的典型症状不包括

- A. 情感高涨
- B. 思维形式障碍
- C. 思维内容障碍
- D. 活动增多
- E. 意志减退

125. 该病人治疗的首选药是

- A. 氯氮平
- B. 碳酸锂
- C. 氯丙嗪
- D. 氟哌啶醇
- E. 卡马西平

(126~127题共用题干)

产妇, 31岁。宫口已开全, 阴道检查胎头矢状缝与骨盆横径一致, 小囱门在3点, 大囟门在9点

126. 属于哪种胎位

- A. LOT
- B. ROT
- C. LOA
- D. ROA
- E. LOP

127. 胎头向哪个方向转动才能娩出

- A. 顺时针转90度
- B. 逆时针转90度
- C. 逆时针转 45度
- D. 顺时针转 45度
- E. 不需转动

(128~130题共用题干)

患儿, 女, 6岁。晚饭后突然出现喘憋, 大汗, 烦躁不安, 不能平卧, 患儿在幼年时曾两次患毛细支气管炎, 查体, 痛苦面容, 呼气性呼吸困难, 两肺闻及哮鸣音, 体温正常添加老师微信: jyj qq666

128. 该患儿的临床诊断最大可能是

- A. 肺结核
- B. 大叶性肺炎
- C. 气管异物
- D. 支气管哮喘
- E. 急性支气管炎

129. 下列检查哪一项对诊断有帮助

A. 胸部正侧位片

B. 气管镜检查

C. 肺功能检查

D. 胸部C.T检查

E. 外周血嗜酸粒细胞计数

130. 下列治疗措施,哪一项应慎用或禁用

A. 给予抗生素静点

B. 肾上腺皮质激素

C. 沙丁胺醇雾化吸入

D. 10%葡萄糖盐静滴

E. 苯巴比妥镇静

(131~132题共用题干)

男性,42岁,近1个月来,在刷牙时常出现右上牙部及右面部疼痛,每次持续5~6秒钟,神经系统检查无阳性体征(助理医师不要求)

131. 其首先考虑的诊断就是

A. 牙痛

B. 三叉神经痛(第二支)

C. 三叉神经痛(第三支)

D. 鼻窦炎

E. 单纯感觉性发作(癫痫)

132. 应首先做的辅助检查是

A. 头部X线片

B. 头部CT

C. 牙部X线片

D. 脑电图

E. 以上都不是

(133~135题共用题干)

初产妇,孕37周,清晨骤醒发现躺在血中,急诊入院,查血压12/8kPa(90/60mmHg),脉搏120次/分,神清,胎心音160次/分,阴道少量活动性流血

133. 其胎方位下述哪种可能性最小

A. LOT,胎头高浮

B. ROA,先露已衔接

C. 臀位

D. 横位

E. ROP,先露未入盆

134. 此时所需的检查不应包括哪一项

A. 血红蛋白+出凝血时间

B. 配血

C. OCT(催产素激惹试验)

D. B超

E. 普鲁卡因皮试

135. 你认为最恰当的处理是

A. 止血,输液,等待足月终止妊娠

B. 争取破膜后头皮钳牵引压迫止血

C. 输血补液,待血压心率稳定,胎心正常后行剖宫产术

D. 立即备血,急诊剖宫产术

E. 备血或输血情况下根据胎方位及胎产式决定分娩方式

B型题

答题要求

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案.请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号相应字母所属的方框涂黑,每个备选答案可能被选择一次、多次或者不被选择.

(136~138题共用备选选项)

- A.腔隙性脑梗死
- B.短暂性脑缺血发作
- C.高血压脑病
- D.壳核出血
- E.脑栓塞

136.58岁男性,晨起出现右侧偏瘫、言语不清,持续20分钟许,头CT检查正常

137.58岁男性,高血压病史,左偏身痛觉减退一周来诊,头CT右基底节小低密度灶(0.5cm)

138.64岁女性,右侧轻偏瘫两天,血压24/16kPa,头CT左基底节区小低密度灶。

(139~140题共用备选选项)

- A.21-三体综合征
- B.18-三体综合征
- C.先天性甲状腺功能减低症
- D.苯丙酮尿症
- E.黏多糖病

139.患儿1岁,表情呆滞,眼距宽,眼裂小,鼻梁低平,双眼外侧上斜,通贯手。

140.患儿1岁,表情呆滞,眼距宽,舌常伸出口外,鼻梁宽平,毛发稀少,面部黏液性水肿,皮肤粗糙,躯干长,四肢短。

(141~143题共用备选选项)

- A.9cm
- B.10cm
- C.11cm
- D.12cm
- E.13cm

141.坐骨棘间径平均是

142.后矢状径是

143.骨盆对角径是

(144~147题共用备选选项)

A.风疹

B.麻疹

C.幼儿急疹

D.猩红热

E.荨麻疹

144.患儿,7个月,发热4天,体温最高为39℃,当地医院诊断为"上感",静点3天头孢唑啉及利巴韦林,今晨热退,但见面部、颈及躯干皮肤有红色斑丘疹

145.患儿,2岁,4天前开始发热,流涕,打喷嚏,畏光,今日体温升高,且咳嗽,出现皮疹,急来就诊,体检:体温40.5℃,口腔黏膜粗糙,耳后、颈部沿发际边缘见红色斑丘疹,双肺呼吸音粗

146.患儿,9岁,发热,咽痛1日就诊、体检:体温38.9℃,咽部充血,双扁桃体肿大Ⅱ度,有脓性分泌物,舌红,乳头粗,颈部及躯干见红色鸡皮疹,压之退色,窝处明显,肺正常

147.患儿,3岁,上午开始流涕,发热,体温最高38.2℃,在家服用小儿退热药及双黄连口服液,吃晚饭时发现患儿面部有皮疹,体检:精神状态良好,耳后、枕部触及黄豆及花生大小淋巴结,有触痛,面、颈及躯干有红色斑丘疹

(148~150题共用备选选项)

- A.流产感染
- B.稽留流产
- C.先兆流产
- D.难免流产
- E.不全流产

148.停经3月余,子宫40天妊娠大小

149.停经11周,少量阴道流血3天,子宫符合孕月,宫口未开

150.停经3个月,下腹胀痛,伴中等量阴道流血1天,子宫大小如50天,宫口松,容1指,宫内似有组织可触及

