



## 2023 年中医专业入学测评

亲爱的医考“战友们”，欢迎加入金英杰“医考战队”，我们即将迎来一个紧张而又充实的备考之旅。新的征程开启新的荣耀，让我们拂去岁月之尘，重回知识的殿堂。面对人生新的起点你准备好了吗？以下入学测评题目是历年真题精选，希望通过以下测试能帮助您对自身专业水平有一个准确定位，测评结束后学管老师会给您进行测评结果分析及年度学习建议哦。

金英杰中医直播教研组 编

### 2023 年中医专业（执业和助理）入学测试题

#### 第一单元（150 题）

1. 关于中医学的学科属性，以下哪项更准确  
A. 科学  
B. 哲学  
C. 医学科学  
D. 自然科学  
E. 自然哲学
2. 中医学形成的时间最迟为  
A. 夏朝  
B. 商朝  
C. 春秋时期  
D. 战国至秦汉时期  
E. 东汉时期
3. 中医学理论体系的形成标志为

- A. 《五十二病方》
- B. 《黄帝内经》
- C. 《难经》
- D. 《伤寒杂病论》
- E. 《神农本草经》

4. 中医学理论体系的确立标志为

- A. 《五十二病方》《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》
- B. 《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》《神农本草经》
- C. 《五十二病方》《黄帝内经》《难经》《神农本草经》
- D. 《五十二病方》《黄帝内经》《伤寒杂病论》《神农本草经》
- E. 《五十二病方》《难经》《伤寒杂病论》《神农本草经》

5. 倡导以六经辨证和脏腑辨证等方法，为我国第一部临床医学专著的是

- A. 《五十二病方》
- B. 《黄帝内经》
- C. 《难经》
- D. 《伤寒杂病论》
- E. 《神农本草经》

6. 人体是一个有机整体，其“中心”是

- A. 脑
- B. 六腑
- C. 五脏
- D. 经络
- E. 奇恒之腑

7. 人体是一个有机整体，其“五脏六腑之大主”是

- A. 脑
- B. 心
- C. 五脏
- D. 经络
- E. 肾

8. 《素问·脉要精微论》中“四变之动，脉与之上下”所体现的是

- A. 恒动观念
- B. 辨证论治
- C. 形神一体观
- D. 整体观念
- E. 辨证观念

9. 《素问·金匱真言论》说所“善病洞泄寒中”的季节是

- A. 春季
- B. 仲夏

- C. 长夏
- D. 秋季
- E. 冬季

10. 《素问·金匱真言论》所说“善病风疟”的季节是

- A. 春季
- B. 仲夏
- C. 长夏
- D. 秋季
- E. 冬季

11. 《素问·脉要精微论》所说“泛泛乎万物有余”的脉象，其相应的时间是

- A. 春日
- B. 夏日
- C. 长夏
- D. 秋日
- E. 冬日

12. 《素问·脉要精微论》所说“蛰虫周密”的脉象出现的时间是

- A. 春日
- B. 夏日
- C. 长夏
- D. 秋日
- E. 冬日

13. 《灵枢·顺气一日分为四时》“夫百病者……多以旦慧”，其原因是

- A. 人气始生，病气衰
- B. 人气长，长则胜邪
- C. 人气始衰，邪气始生
- D. 人气入脏，邪气独居于身
- E. 人气抗邪，卫外为固

14. 《灵枢·顺气一日分为四时》所说疾病随昼夜时间节律而变化，其病“安”的时间是

- A. 旦
- B. 昼
- C. 夕
- D. 夜
- E. 晨

15. 采取同病异治方法的原因是

- A. 疾病相同
- B. 症状不同
- C. 阶段相同
- D. 证候不同

E. 体征不同

16. 寒凉派医家代表为

- A. 刘完素
- B. 张从正
- C. 李杲
- D. 朱震亨
- E. 张介宾

17. 下列选项，能够体现事物阴阳属性相对性的是

- A. 对立制约
- B. 互根互用
- C. 互为消长
- D. 平衡协调
- E. 互相转化

18. “阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也”，主要说明阴阳之间的关系是

- A. 对立制约
- B. 互根互用
- C. 互为消长
- D. 平衡协调
- E. 互相转化

19. “动极者镇之以静，阴亢者胜之以阳”，说明阴阳之间的关系是

- A. 阴阳互藏
- B. 阴阳互根
- C. 阴阳平衡
- D. 阴阳转化
- E. 阴阳制约

20. “阴平阳秘，精气乃治”，所体现的阴阳关系是

- A. 阴阳的对立制约
- B. 阴阳的对立消长
- C. 阴阳的互根互用
- D. 阴阳的消长平衡
- E. 阴阳的相互转化

21. “阴中求阳”的理论依据是

- A. 阴阳相互转化
- B. 阴阳互根互用
- C. 阴阳相互消长
- D. 阴阳对立制约
- E. 阴阳动态平衡

22. “热者寒之”治则，所体现的阴阳关系是
- A. 阴阳交感
  - B. 阴阳互根
  - C. 阴阳对立
  - D. 阴阳消长
  - E. 阴阳转化
23. “阳生阴长，阳杀阴藏”所体现的阴阳关系是
- A. 阴阳交感
  - B. 阴阳互根
  - C. 阴阳对立
  - D. 阴阳消长
  - E. 阴阳转化
24. 五脏分阴阳，则肺的阴阳属性是
- A. 阳中之阳
  - B. 阳中之阴
  - C. 阴中之阳
  - D. 阴中之阴
  - E. 阴中之至阴
25. 五行中，“金”的“所不胜”之行是
- A. 火
  - B. 水
  - C. 土
  - D. 木
  - E. 金
26. 肺主司一身之气的生成体现于
- A. 吸入清气
  - B. 呼出浊气
  - C. 生成宗气
  - D. 调节气机
  - E. 辅心行血
27. 《素问·上古天真论》“筋骨坚，发长极，身体盛壮”所指女子的年龄段是
- A. “二七”
  - B. “三七”
  - C. “四七”
  - D. “五七”
  - E. “六七”
28. “胃之关”指的是
- A. 贲门

- B. 幽门
- C. 阑门
- D. 大肠
- E. 肾

29. 与血液生成及运行关系密切的是

- A. 心与肺
- B. 心与肾
- C. 心与脾
- D. 脾与肝
- E. 肺与肝

30. 贯注于心肺之脉的气是

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 脏腑精气

31. 《灵枢·经脉》说，经脉十二者，伏行于何处

- A. 全身
- B. 分肉之间
- C. 四肢
- D. 躯干
- E. 头面

32. 手三阴经的走向规律是

- A. 从足走头
- B. 从头走足
- C. 从胸走手
- D. 从手走头
- E. 从足走腹

33. 足厥阴肝经分布于内踝尖八寸以上的

- A. 下肢内侧前缘
- B. 下肢外侧前缘
- C. 下肢内侧后缘
- D. 下肢外侧中线
- E. 下肢内侧中线

34. 手三阳经在躯干部的分布是

- A. 胸部
- B. 腹部
- C. 背部

- D. 肩胛部
- E. 体侧

35. 下述经脉在其循行过程中，经过气街的是

- A. 足少阴与足太阳
- B. 手少阳与足少阳
- C. 手阳明与足阳明
- D. 足厥阴与足太阳
- E. 足阳明与足少阳

36. 暑、火、燥三邪的共同致病特点是

- A. 扰神
- B. 炎热
- C. 伤津
- D. 动血
- E. 生风

37. 《素问·五脏生成》说“多食甘”则

- A. 脉凝泣而变色
- B. 皮槁而毛拔
- C. 筋急而抓枯
- D. 肉胝皱而唇揭
- E. 骨痛而发落

38. 《临证指南医案》说“内风”产生的机理是

- A. 体内气机之逆乱
- B. 身中阳气之变动
- C. 体内阴血之不足
- D. 体内筋脉之失养
- E. 体表络脉之失濡

39. 不属于反治的是

- A. 以寒治寒
- B. 热因热用
- C. 以通治通
- D. 以补开塞
- E. 寒者热之

40. 用寒远寒，用热远热属于

- A. 扶正祛邪
- B. 因地制宜
- C. 因人制宜
- D. 因时制宜
- E. 未病先防



41. 下列各项，不属于失神表现的是

- A. 神志昏迷
- B. 形羸色败
- C. 呼吸微弱
- D. 目无精彩
- E. 壮热面赤

42. 下列各项，不是精亏神衰失神表现的是

- A. 动作艰难
- B. 呼吸气微
- C. 肌肉瘦削
- D. 神昏谵语
- E. 面色无华

43. 根据《灵枢·五色》的分法，整个面部称为“藩”的部分是

- A. 鼻
- B. 耳门
- C. 眉间
- D. 颊侧
- E. 额

44. 脏腑在面部的分属，阙中所候脏腑是

- A. 心
- B. 肺
- C. 脾
- D. 肾
- E. 肝

45. 下列各项，是青色和黑色共同所主之病证的是

- A. 寒证
- B. 惊风
- C. 水饮
- D. 肾虚
- E. 气滞

46. 患者双侧瞳孔散大属

- A. 颅脑外伤
- B. 肝火上炎
- C. 颅内肿瘤
- D. 青风内障
- E. 有机磷中毒

47. 小儿食指络脉紫黑的临床意义是

- A. 实寒证
- B. 实热证
- C. 虚热证
- D. 血虚证
- E. 血络闭郁

48. 络舌本的经脉是

- A. 手少阴心经
- B. 足厥阴肝经
- C. 足少阴肾经
- D. 足太阴脾经
- E. 手太阴肺经

49. 无神之舌的表现是

- A. 裂纹舌
- B. 痿软舌
- C. 枯舌
- D. 肿胀舌
- E. 胖嫩舌

50. 舌绛少苔的临床意义是

- A. 血瘀
- B. 热盛
- C. 气虚
- D. 阴虚
- E. 痰火

51. 苔黑而滑润的临床意义是

- A. 阴虚火旺
- B. 湿热郁蒸
- C. 热盛伤津
- D. 痰火内蕴
- E. 阳虚寒盛

52. 邪闭、厥证、痛极的脉象是

- A. 牢脉
- B. 革脉
- C. 紧脉
- D. 伏脉
- E. 弦脉

53. 邪热内结的脉象是

- A. 革脉
- B. 濡脉

- C. 芤脉
- D. 紧脉
- E. 迟脉

54. 心阳虚证与心阳虚脱证临床表现相同的是

- A. 冷汗淋漓
- B. 神志模糊
- C. 面唇青紫
- D. 失眠多梦
- E. 胸痛暴作

55. 肝血虚证的临床表现是

- A. 两目干涩
- B. 视力减退
- C. 手足蠕动
- D. 头痛目赤
- E. 面部烘热

56. 下列各项，不属于心肾不交证临床表现的是

- A. 舌淡少苔
- B. 惊悸多梦
- C. 健忘
- D. 腰膝酸软
- E. 口干咽燥

57. 性能功效相类似的药物配合应用，可增强原有疗效的配伍关系是

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相畏
- D. 相杀
- E. 相恶

58. 一种药物的毒烈性，能被另一种药物消除的配伍关系是

- A. 相恶
- B. 相杀
- C. 相畏
- D. 相须
- E. 相反

59. 七情配伍中，可以降低药物功效的是

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相须
- D. 相使

E. 相恶

60. 下列各项说法错误的是

- A. 麻黄清表热
- B. 石膏清里热
- C. 秦艽清虚热
- D. 金银花透表热，清里热
- E. 牡丹皮清血热，退虚热

61. 治疗外感风寒，项背强痛而无汗，应选用的药组是

- A. 葛根、柴胡
- B. 葛根、升麻
- C. 葛根、麻黄
- D. 葛根、牛蒡子
- E. 葛根、白芷

62. 治疗胃火上炎的头痛、牙龈肿痛，应选用的药组是

- A. 玄参、黄芩
- B. 知母、贝母
- C. 石膏、升麻
- D. 龙胆、黄柏
- E. 紫苏、生姜

63. 具有清实热、退虚热功效的药物是

- A. 石膏
- B. 知母
- C. 黄芩
- D. 苦参
- E. 栀子

64. 上以清肺，中以凉胃，下泻肾火的物是

- A. 黄柏
- B. 栀子
- C. 知母
- D. 地骨皮
- E. 生地黄

65. 治疗热病心烦、郁闷、躁扰不宁，血热妄行之吐衄、尿血的药物是

- A. 石膏
- B. 知母
- C. 苦参
- D. 栀子
- E. 黄芩

66. 具有清热燥湿、泻火除蒸、解毒疗疮功效的药物是

- A. 银柴胡
- B. 苦参
- C. 黄芩
- D. 黄连
- E. 黄柏

67. 治疗湿热下注之足膝红肿热痛，应选用的药组是

- A. 羌活、独活
- B. 白芷、苍耳子
- C. 苦参、茯苓
- D. 黄柏、苍术
- E. 细辛、防风

68. 治疗湿热黄疸和肝经热盛，高热惊厥，手足抽搐，应选用的药物是

- A. 黄柏
- B. 黄连
- C. 黄芩
- D. 龙胆
- E. 防风

69. 具有峻下逐饮、杀虫疗疮、祛痰止咳功效的药物是

- A. 京大戟
- B. 大黄
- C. 巴豆霜
- D. 芫花
- E. 牵牛子

70. 治疗水肿胀满，大便秘结，小便不利，应首选的药物是

- A. 大黄
- B. 牵牛子
- C. 麻黄
- D. 巴豆霜
- E. 芒硝

71. 独活的功效是

- A. 利尿
- B. 清热解毒
- C. 治骨鲠
- D. 解表
- E. 安胎

72. 患者，女，61岁。患风湿痹痛多年，现腰膝酸痛，筋骨痿软无力，脉弦细。用药应首选的药物是

- A. 独活
- B. 秦艽
- C. 五加皮
- D. 木防己
- E. 桑叶

73. 患者，男，28岁。外出感寒，左下肢痛，遇风则疼痛加剧，舌苔薄白。用药应首选的药物是

- A. 独活
- B. 威灵仙
- C. 羌活
- D. 桑寄生
- E. 秦艽

74. 患者，女，50岁。2周前突发小腿肌肉抽筋(腓肠肌痉挛)，近来发作频繁，尤以夜间为重，每因天气寒冷或包裹不严而发作，用药应首选的药物是

- A. 羌活
- B. 木瓜
- C. 独活
- D. 桑寄生
- E. 秦艽

75. 患者，女，35岁，大便水泻，并见轻微发热，恶心欲吐，舌质淡，苔白腻，脉象濡滑，用药应首选的药物是

- A. 白术
- B. 苍术
- C. 车前子
- D. 茯苓
- E. 藿香

76. 飞滑石入煎剂的用法是

- A. 冲服
- B. 包煎
- C. 另煎
- D. 先煎
- E. 久煎

77. 治疗元气大亏，阳气暴脱，亡阳与气脱并见，应选用的药组是

- A. 附子、黄芪
- B. 附子、人参
- C. 白术、附子
- D. 附子、干姜
- E. 附子、肉桂

78. 具有散寒止痛、理气和胃功效的药物是

- A. 肉桂
- B. 干姜
- C. 高良姜
- D. 小茴香
- E. 花椒

79. 具有理气健脾、燥湿化痰功效的药物是

- A. 枳实
- B. 佛手
- C. 陈皮
- D. 薤白
- E. 川楝子

80. 治疗脏器下垂，应选用的药物是

- A. 陈皮
- B. 枳实
- C. 佛手
- D. 青皮
- E. 沉香

81. 具有凉血止血散瘀功效，尤善治尿血的药物是

- A. 白茅根
- B. 小蓟
- C. 血余炭
- D. 地榆
- E. 茜草

82. 具有凉血止血、解毒敛疮功效的药物是

- A. 侧柏叶
- B. 大蓟
- C. 艾叶
- D. 地榆
- E. 栀子

83. 百合除治疗肺热咳嗽、劳嗽咯血外，还能够治疗的病证是

- A. 肝肾阴虚、头晕目眩
- B. 胃阴不足、舌干口渴
- C. 脾胃虚弱、倦怠无力
- D. 虚烦惊悸、失眠多梦
- E. 老年津亏、肠燥便秘

84. 患者，女，54岁。面色㿔白，时自汗出，恶风，经常患感冒，脉浮无力。用药应首选药物是

- A. 党参
- B. 麻黄根
- C. 浮小麦
- D. 生黄芪
- E. 太子参

85. 乌梅的功效是

- A. 涩肠，止遗
- B. 止带，止遗
- C. 涩肠，生津
- D. 涩肠，止带
- E. 止带，止血

86. 银翘散组成的药物中，除银花、连翘、荆芥穗、淡豆豉、牛蒡子外，其余的药物是

- A. 竹叶杏仁桔梗甘草
- B. 苏叶桔梗芦根甘草
- C. 薄荷杏仁桔梗甘草
- D. 薄荷竹叶桔梗甘草
- E. 薄荷杏仁竹叶甘草

87. 止嗽散组成的药物中含有

- A. 苏梗
- B. 荆芥
- C. 百合
- D. 白芷
- E. 紫苏

88. 九味羌活汤的功用是

- A. 散寒解表，祛风除湿
- B. 发汗解表，疏风止痛
- C. 宣肺散寒，除湿止痛
- D. 发汗祛湿，兼清里热
- E. 散寒除湿，通痹止痛

89. 柴葛解肌汤的功用是

- A. 解肌发表
- B. 解肌透疹
- C. 解肌清热
- D. 解肌疏风
- E. 透疹解毒

90. 银翘散中配伍荆芥、淡豆豉的目的是

- A. 宣郁发表，疏风泄热
- B. 解郁除烦，疏散风热



- C. 辛散透邪，以助解表
- D. 疏散风热，宣肺止咳
- E. 疏散风邪，和营止痒

91. 桑菊饮证的主要临床表现是

- A. 头痛身热，微恶风寒，有汗不多，口渴咽干，舌尖红，脉浮数
- B. 咳嗽，身热不甚，口微渴，脉浮微数
- C. 头痛，发热，汗出恶风，苔薄白，脉浮缓
- D. 身热，咳逆，气急鼻塞，苔薄黄，脉滑数
- E. 咳嗽咽痒，微有恶寒发热，苔薄白，脉浮缓

92. 下列何药不是温脾汤组成的药物

- A. 大黄
- B. 甘草
- C. 附子
- D. 人参
- E. 厚朴

93. 功用为泻热逐水的方剂是

- A. 十枣汤
- B. 大承气汤
- C. 大陷胸汤
- D. 济川煎
- E. 大黄牡丹汤

94. 胃肠燥热，津液不足，大便硬而小便数者，治宜选用

- A. 济川煎
- B. 增液汤
- C. 五仁丸
- D. 麻子仁丸
- E. 小承气汤

95. 蒿芩清胆汤中配伍半夏的主要用意是

- A. 燥湿化痰，和胃降逆
- B. 散结除痞，降逆止呕
- C. 散肝舒脾，降逆止呕
- D. 下气宽中，除痰消痞
- E. 温中散寒，散结除痞

96. 由石膏、知母、粳米、甘草组成的方剂是

- A. 青蒿鳖甲汤
- B. 黄连解毒汤
- C. 蒿芩清胆汤
- D. 白虎汤

E. 竹叶石膏汤

97. 功用为清泻肺热，止咳平喘的方剂是

- A. 止嗽散
- B. 泻白散
- C. 麻黄汤
- D. 定喘汤
- E. 麻杏石膏汤

98. 四逆汤和理中丸组成中均含有的药物是

- A. 附子
- B. 人参
- C. 桂枝
- D. 干姜
- E. 白术

99. 吴茱萸汤的功用是

- A. 温中补虚，和里缓急
- B. 温中祛寒，益气健脾
- C. 温中补虚，降逆止呕
- D. 温肾暖脾，涩肠止泻
- E. 温中补虚，散寒止痛

100. 大柴胡汤的功用是

- A. 和解少阳，内泻热结
- B. 疏肝止痛，清热散结
- C. 透邪解郁，疏肝理脾
- D. 解肌疏表，清泻里实
- E. 疏肝解郁，健脾和营

101. 参苓白术散中除人参、茯苓、白术、甘草和桔梗外，还有

- A. 黄芪当归陈皮升麻柴胡
- B. 莲子肉薏苡仁砂仁白扁豆山药
- C. 莲子肉薏苡仁砂仁当归陈皮
- D. 黄芪当归砂仁白扁豆山药
- E. 黄芪当归陈皮白扁豆山药

102. 不属于补中益气汤组成药物的是

- A. 人参、黄芪
- B. 白术、炙甘草
- C. 茯苓、砂仁
- D. 当归、橘皮
- E. 升麻、柴胡

103. 左归丸的功用是

- A. 温补肾阳，填精补血
- B. 滋阴补肾，填精益髓
- C. 补益肝肾，强壮筋骨
- D. 滋阴补肾，涩精止遗
- E. 填精补髓，滋阴降火

104. 症见汗出恶风，面色㿔白，舌淡，苔薄白，脉浮虚者，宜选用

- A. 玉屏风散
- B. 桂枝汤
- C. 四君子汤
- D. 当归补血汤
- E. 八珍汤

105. 大补阴丸中除熟地黄、猪脊髓、白蜜外，还有

- A. 黄连贝母龟板
- B. 黄柏知母龟板
- C. 黄芩知母鳖甲
- D. 黄柏当归龟板
- E. 黄柏贝母鳖甲

106. 真人养脏汤的功用是

- A. 温中祛寒，补益脾胃
- B. 温中补虚，降逆止呕
- C. 益气健脾，缓急止痛
- D. 温补脾肾，涩肠止泻
- E. 涩肠固脱，温补脾肾

107. 治疗五更泄泻的首选方剂是

- A. 吴茱萸汤
- B. 理中丸
- C. 真人养脏汤
- D. 四神丸
- E. 金匱肾气丸

108. 酸枣仁汤组成的药物中含有

- A. 知母
- B. 茯神
- C. 远志
- D. 柏子仁
- E. 龙眼肉

109. 手足三阳经在四肢的分布规律是

- A. 太阳在前，少阳在中，阳明在后

- B. 太阳在前，阳明在中，少阳在后
- C. 阳明在前，太阳在中，少阳在后
- D. 阳明在前，少阳在中，太阳在后
- E. 少阳在前，阳明在中，太阳在后

110. 相表里的阴经与阳经的循行交接部位是

- A. 心中
- B. 胸中
- C. 腹中
- D. 头面部
- E. 手足末端

111. 手少阳三焦经与足少阳胆经的循行交接部位是

- A. 鼻旁
- B. 目外眦
- C. 目内眦
- D. 无名指端
- E. 足小趾端

112. 足少阴肾经与手厥阴心包经的循行交接部位是

- A. 肺内
- B. 腹中
- C. 胸中
- D. 心中
- E. 目旁

113. 下列各组经脉中，未按气血循行流注顺序排列的是

- A. 胆经、肝经、肺经
- B. 心经、小肠经、肾经
- C. 大肠经、胃经、脾经
- D. 肾经、心包经、三焦经
- E. 三焦经、胆经、肝经

114. 对奇经八脉的叙述中，错误的是

- A. 阳维脉总督六阳
- B. 阳跷脉调节肢体运动
- C. 冲脉涵蓄十二经气血
- D. 任脉总任六阴经
- E. 阴跷脉司眼睑开阖

115. 被称为“阳脉之海”的是

- A. 带脉
- B. 督脉
- C. 冲脉

- D. 阳维脉
- E. 阳跷脉

116. 属于十五络脉的是

- A. 带脉之络、冲脉之络、脾之大络
- B. 带脉之络、冲脉之络、胃之大络
- C. 任脉之络、督脉之络、脾之大络
- D. 任脉之络、督脉之络、胃之大络
- E. 任脉之络、督脉之络、冲脉之络

117. 根据十二经别循行分布特点排列的是

- A. 出、入、离、合
- B. 入、离、出、合
- C. 离、合、出、入
- D. 离、入、出、合
- E. 出、离、入、合

118. 属于脏，循行分布于上肢内侧和胸腹的是

- A. 奇经八脉
- B. 手三阴经
- C. 手三阳经
- D. 足三阴经
- E. 足三阳经

119. 足三阴经在内踝上 8 寸以下的分布规律是

- A. 厥阴在前，太阴在中，少阴在后
- B. 少阴在前，厥阴在中，太阴在后
- C. 厥阴在前，少阴在中，太阴在后
- D. 太阴在前，厥阴在中，少阴在后
- E. 太阴在前，少阴在中，厥阴在后

120. 手三阴经的循行走向规律是

- A. 从胸走手
- B. 从手走胸
- C. 从手走头
- D. 从头走足
- E. 从胸腹走足

121. 具有调节全身阴经经气作用的是

- A. 任脉
- B. 冲脉
- C. 带脉
- D. 阴跷脉
- E. 阴维脉

122. 带脉的功能是
- A. 调节全身阴经经气
  - B. 涵蓄十二经气血
  - C. 调节六阴经经气
  - D. 调节肢体运动
  - E. 约束纵行躯干的诸条经脉

123. 属于奇经的是
- A. 手少阳三焦经
  - B. 十二经筋
  - C. 十二皮部
  - D. 十五络脉
  - E. 阴维脉

124. 属于正经的是
- A. 手少阳三焦经
  - B. 十二经筋
  - C. 十二皮部
  - D. 十五络脉
  - E. 阴维脉

125. 任脉别络的分布部位是
- A. 从鸠尾分出散布于背部
  - B. 从鸠尾分出散布于腹部
  - C. 从鸠尾分出散布于胸部
  - D. 从长强分出散布于头部
  - E. 从长强分出散布于腹部

126. 督脉别络的分布部位是
- A. 从鸠尾分出散布于背部
  - B. 从鸠尾分出散布于腹部
  - C. 从鸠尾分出散布于胸部
  - D. 从长强分出散布于头部
  - E. 从长强分出散布于腹部

127. 经络按诊最常用的部位是
- A. 交会穴
  - B. 五输穴
  - C. 背俞穴
  - D. 八会穴
  - E. 八脉交会穴

128. 腧穴的分类是

- A. 十四经穴、奇穴、特定穴
- B. 十四经穴、奇穴、阿是穴
- C. 十二经穴、奇穴、特定穴
- D. 十二经穴、奇穴、阿是穴
- E. 十二经穴、奇穴、五输穴

129. 下列关于奇穴的描述，错误的是

- A. 有固定名称和位置
- B. 某些奇穴是多个穴点的组合
- C. 分布都不在十四经循行路线上
- D. 对某些病证有特殊疗效
- E. 是在“阿是穴”的基础上发展起来

130. 手阳明大肠经的主治特点是

- A. 后头、神志病
- B. 侧头、胁肋病
- C. 侧头、耳病，胁肋病
- D. 前头、鼻、口齿病
- E. 前头、咽喉病、胃肠病

131. 手厥阴心包经的主治特点是

- A. 心病
- B. 心、胃病
- C. 肺、喉病
- D. 肝病、脾胃病
- E. 肾、肺、咽喉病

132. 手少阳三焦经的主治特点是

- A. 前头、鼻、口齿病
- B. 前头、口齿、胃肠病
- C. 侧头、胁肋病
- D. 后头、肩胛病、神志病
- E. 后头、背腰痛

133. 足太阳膀胱经的主治特点是

- A. 后头、肩胛病，神志病
- B. 后头、背腰痛，脏腑病
- C. 侧头、耳病，胁肋病
- D. 前头、鼻、口齿病
- E. 前头、口齿、胃肠病

134. 下列特定穴中，不位于肘膝关节以下部位的是

- A. 原穴
- B. 十二经脉络穴

- C. 下合穴
- D. 五输穴
- E. 八会穴

135. 下列各项中，叙述不正确的是

- A. 所根为井
- B. 所溜为荥
- C. 所注为输
- D. 所行为经
- E. 所入为合

136. 合穴多位于

- A. 指、趾末端
- B. 肘膝关节附近
- C. 掌指、跖趾关节附近
- D. 掌指、跖趾关节之前
- E. 掌指、跖趾关节之后

137. 六阴经中，与原穴为同一腧穴的是

- A. 井穴
- B. 荥穴
- C. 输穴
- D. 经穴
- E. 合穴

138. 督脉之络穴位于

- A. 头项部
- B. 上腹部
- C. 下腹部
- D. 胸胁部
- E. 尾骶部

139. 脏腑之气汇聚于胸腹部的腧穴称为

- A. 原穴
- B. 络穴
- C. 募穴
- D. 五输穴
- E. 八会穴

140. 手阳明大肠经的络穴是

- A. 商阳
- B. 合谷
- C. 阳溪
- D. 偏历



E. 温溜

141. 大肠的下合穴是

- A. 合谷
- B. 曲池
- C. 天枢
- D. 上巨虚
- E. 下巨虚

142. 大肠的募穴是

- A. 下腕
- B. 中腕
- C. 梁门
- D. 水道
- E. 天枢

143. 治疗急性胃痛应首选的腧穴是(B)

- A. 梁门
- B. 梁丘
- C. 内庭
- D. 上巨虚
- E. 下巨虚

144. 解溪穴的特定穴属性是

- A. 原穴
- B. 输穴
- C. 经穴
- D. 郄穴
- E. 络穴

145. 不属于足阳明胃经五输穴的是

- A. 厉兑
- B. 解溪
- C. 内庭
- D. 陷谷
- E. 丰隆

146. 不属于足太阴脾经五输穴的是

- A. 大都
- B. 地机
- C. 商丘
- D. 太白
- E. 隐白

147. 既为脾经络穴又属于八脉交会穴的是

- A. 公孙
- B. 丰隆
- C. 后溪
- D. 列缺
- E. 阴陵泉

148. 表现为典型弛张热的疾病是

- A. 风湿热
- B. 渗出性胸膜炎
- C. 疟疾
- D. 布鲁杆菌病
- E. 肺炎球菌性肺炎

149. 体温上升期的临床表现是

- A. 皮肤潮红而灼热
- B. 畏寒或寒战，皮肤苍白无汗
- C. 呼吸加快、加强
- D. 心率减慢，脉搏有力
- E. 可有出汗，尿少色黄

150. 体温下降呈渐降形式的是

- A. 疟疾
- B. 输液反应
- C. 风湿热
- D. 肺炎球菌性肺炎
- E. 急性肾盂肾炎

## 第二单元（150题）

151. 脑出血引起发热的主要原因是

- A. 植物神经功能紊乱
- B. 体温调节中枢的功能失常
- C. 无菌性坏死物质的吸收
- D. 皮肤散热量的减少
- E. 感染性发热

152. 属感染性发热的疾病是

- A. 肝癌
- B. 斑疹伤寒
- C. 白血病
- D. 风湿热

E. 广泛性皮炎

153. 甲状腺功能亢进引起发热的主要原因是

- A. 产热过多
- B. 散热过少
- C. 抗原-抗体反应
- D. 坏死物质吸收
- E. 植物神经功能紊乱

154. 下列可引起反射性呕吐的是

- A. 晕动病
- B. 脑膜炎
- C. 幽门梗阻
- D. 休克
- E. 有机磷中毒

155. 引起心绞痛疼痛的原因是

- A. 挤压
- B. 出血
- C. 坏死
- D. 扩张
- E. 缺血

156. 下列可引起头痛伴剧烈眩晕的是

- A. 颅内高压症
- B. 小脑肿瘤
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 脑膜炎
- E. 中暑

157. 血管性头痛的特点多是

- A. 胀痛
- B. 电击痛
- C. 重压感
- D. 牵拉痛
- E. 紧箍感

158. 头痛常在夜间发作的是

- A. 颅内占位性病变所致头痛
- B. 高血压性头痛
- C. 丛集性头痛
- D. 眼源性头痛
- E. 副鼻窦炎所引起的头痛

159. 有关头痛的说法下列哪项不正确
- A. 小脑幕以下病变引起的头痛多位于后枕部
  - B. 三叉神经痛表现为颜面部发作性电击样疼痛
  - C. 紧张性头痛多在下午或傍晚出现
  - D. 舌咽神经痛的特点是咽后部发作性疼痛并向耳及枕部放射
  - E. 大脑半球的病变疼痛多位于病变的对侧，以颞部为多
160. 昏睡的主要临床表现是
- A. 呼唤和推动身体不能使其清醒
  - B. 对强烈疼痛刺激可唤醒
  - C. 角膜、对光反射消失
  - D. 腱反射消失
  - E. 能正确回答问题
161. 浅昏迷的主要临床特点是
- A. 对声、光刺激仍有反应
  - B. 对强烈疼痛刺激无反应
  - C. 对光反射存在
  - D. 角膜反射消失
  - E. 吞咽反射消失
162. 典型心绞痛的疼痛性质是
- A. 灼痛
  - B. 刺痛
  - C. 闷痛
  - D. 压榨样痛
  - E. 酸痛
163. 下列各项，可引起腹痛伴急性高热、寒战的是
- A. 急性化脓性胆管炎
  - B. 结缔组织病
  - C. 急性腹腔内出血
  - D. 肠梗阻
  - E. 结核性腹膜炎
164. 下列各项，可引起腹痛伴休克的是
- A. 溃疡性结肠炎
  - B. 肝破裂
  - C. 慢性胰腺炎
  - D. 胃癌
  - E. 急性阑尾炎
165. 可引起持续性广泛性剧烈腹痛的是
- A. 消化性溃疡

- B. 胆道蛔虫梗阻
- C. 肾结石
- D. 肠梗阻
- E. 急性弥漫性腹膜炎

166. 急性喉头水肿的主要临床表现是

- A. 体温 38℃ 以上
- B. 心率加快
- C. 烦躁不安
- D. 饮水呛咳
- E. 吸气时出现“三凹征”

167. 吗啡中毒引起呼吸困难的主要原因是

- A. 兴奋呼吸中枢
- B. 使支气管痉挛
- C. 使肺淤血
- D. 肺泡弹性减弱
- E. 呼吸中枢受抑制

168. 肺气肿时，呼吸困难的主要特点是

- A. 呼吸深快
- B. 吸气费力
- C. 呼吸深慢
- D. 呼气费力
- E. 吸气和呼气均感费力

169. 心源性哮喘最主要的临床表现是

- A. 气闷、气促
- B. 心率加快
- C. 发绀、出汗
- D. 端坐呼吸
- E. 两肺哮鸣音及湿啰音

170. 夜间阵发性呼吸困难，夜间发作的原因主要是

- A. 迷走神经兴奋性增高
- B. 呼吸中枢被抑制
- C. 代谢性酸中毒
- D. 压力感受器受刺激
- E. 肺通气、换气功能不良

171. 支气管哮喘发作时的主要临床表现是

- A. 胸闷、咳嗽
- B. 出汗、微绀
- C. 鼻痒、喷嚏

- D. 双肩耸起
- E. 呼气延长伴哮鸣音

172. 支气管扩张的典型症状是

- A. 发热、盗汗
- B. 消瘦、贫血
- C. 刺激性干咳
- D. 胸痛
- E. 慢性咳嗽、咯脓性痰

173. 可引起混合性呼吸困难的疾病是

- A. 肺气肿
- B. 支气管哮喘
- C. 急性喉炎
- D. 重症肺炎
- E. 支气管异物

174. 咳嗽伴杵状指的疾病是

- A. 支气管炎
- B. 支气管扩张症
- C. 肺结核
- D. 肺炎球菌性肺炎
- E. 胸膜炎

175. 引起痰分层现象的疾病是

- A. 慢性支气管炎
- B. 肺脓肿
- C. 肺结核
- D. 肺炎链球菌肺炎
- E. 心源性哮喘

176. 引起咯血最常见的疾病是

- A. 肺结核
- B. 肺淤血
- C. 肺部恶性肿瘤
- D. 肺炎球菌性肺炎
- E. 肺梗死

177. 咯血量较大而能骤然停止的疾病是

- A. 支气管扩张症
- B. 肺结核空洞
- C. 肺脓肿
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 肺炎球菌性肺炎

178. 符合溶血性黄疸表现的是

- A. 网织红细胞减少
- B. 尿中尿胆原减少
- C. 尿中有胆红素
- D. 大便色浅
- E. 结合胆红素与总胆红素比值 $<20\%$

179. 符合阻塞性黄疸表现的是

- A. 粪便颜色加深
- B. 尿中胆红素阴性
- C. 尿中尿胆原增加
- D. 心率增快
- E. 血清碱性磷酸酶明显增高

180. 可引起阻塞性黄疸的疾病是

- A. 原发性胆汁性肝硬化
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 毒蕈中毒
- D. 蚕豆病
- E. 病毒性肝炎

181. 先有体温升高后有意识障碍的疾病是

- A. 脑出血
- B. 病毒性脑炎
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 巴比妥中毒
- E. 冬眠灵中毒

182. 以夜间阵发性呼吸困难为突出表现的是

- A. 喉头水肿
- B. 左心衰竭
- C. 右心衰竭
- D. 支气管哮喘
- E. 胸腔积液

183. 心源性水肿最常见的病因是

- A. 左心衰竭
- B. 右心衰竭
- C. 渗出性心包炎
- D. 缩窄性心包炎
- E. 心绞痛

184. 可引起胆囊肿大、无压痛，伴显著黄疸的疾病是

- A. 胆囊炎
- B. 胆管炎
- C. 胰头癌
- D. 胆囊结石
- E. 胆总管结石

185. 正常肺泡呼吸音最明显的听诊部位在

- A. 喉部
- B. 胸骨角附近
- C. 右肺尖
- D. 肩胛下部
- E. 肩胛上部

186. 下列各项，可引起听觉语音增强的是

- A. 气管异物
- B. 阻塞性肺气肿
- C. 胸腔积液
- D. 肺实变
- E. 胸膜增厚粘连

187. 主动脉瓣狭窄，可出现的体征是

- A. 心尖部舒张期震颤
- B. 胸骨左缘第 2 肋间收缩期震颤
- C. 胸骨左缘第 2 肋间舒张期震颤
- D. 胸骨右缘第 2 肋间收缩期震颤
- E. 胸骨右缘第 2 肋间舒张期震颤

188. 引起中性粒细胞减少的疾病是

- A. 脾功能亢进
- B. 尿毒症
- C. 肺炎链球菌肺炎
- D. 急性心肌梗死
- E. 急性溶血

189. 下列各项，不引起淋巴细胞增多的疾病是

- A. 百日咳
- B. 流行性腮腺炎
- C. 肾综合征出血热
- D. 免疫缺陷性疾病
- E. 结核病

190. 前间壁心肌梗死特征性心电图改变出现的导联是

- A.  $V_1$ 、 $V_2$ 、 $V_3$
- B.  $V_1$ 、 $V_2$ 、 $V_3$ 、 $V_4$ 、 $V_5$



- C.  $V_3$ 、 $V_4$ 、 $V_5$
- D.  $V_5$ 、I、aVL
- E. II、III、aVF

191. QRS 波群代表的是

- A. 心室肌除极过程
- B. 心房肌除极过程
- C. 心室肌复极过程
- D. 心房肌复极过程
- E. 房室交界区的兴奋性

192. 下列关于心电图价值的描述，错误的是

- A. 能反映心功能
- B. 能确诊心律失常
- C. 诊断心肌梗死
- D. 辅助诊断房室肥大
- E. 辅助诊断电解质紊乱

193. 下列各项，不属室性早搏心电图特点的是

- A. 提前出现宽大的 QRS 波
- B. 宽大 QRS 波前无 P 波
- C. QRS 波时间  $>0.12s$
- D. 其 T 波方向与 QRS 主波方向相反
- E. 代偿间期不完全

194. 婴幼儿咳嗽、发烧，首选的 X 线检查方法是

- A. 摄胸片正位
- B. 摄胸片侧位
- C. 摄胸片正侧位
- D. 胸部透视
- E. 支气管造影

195. 支气管肺炎的基本病变是

- A. 渗出
- B. 增殖
- C. 纤维化
- D. 钙化
- E. 肺水肿

196. 最常见的支气管扩张类型是

- A. 囊状扩张
- B. 柱状扩张
- C. 囊状或柱状扩张混合存在
- D. 局限性梭形扩张

E. 球状扩张

197. 肺癌空洞常发生于

- A. 鳞状上皮癌
- B. 腺癌
- C. 大细胞未分化癌
- D. 小细胞未分化癌
- E. 细支气管-肺泡癌

198. 胃溃疡的主要 X 线表现是

- A. 黏膜破坏
- B. 黏膜中断
- C. 龛影
- D. 充盈缺损
- E. 痉挛性切迹

199. 传染病的基本特征为

- A. 有传染性、免疫性和病原体
- B. 有传染性、流行性、地方性和季节性
- C. 有传染性、病原体、免疫性和流行性
- D. 有传染性、传播途径和传染源
- E. 有传染性、免疫性和流行性

200. 下列各项，可降低人群易感性的是

- A. 新生儿增加
- B. 非流行区人口迁入
- C. 免疫人口死亡等
- D. 新的传染病出现或传入
- E. 接种疫苗

201. 潜伏期是指

- A. 自病原体侵入机体至典型症状出现
- B. 自病原体侵入机体至排出体外
- C. 自病原体侵入机体至临床症状开始出现
- D. 自接触传染源至患者开始出现症状
- E. 自接触传染源至典型症状出现

202. 再燃是指

- A. 在感染某种病原体基础上再次感染同一病原体
- B. 传染病患者进入恢复期后，已稳定退热一段时间，潜伏于组织内的病原体再度繁殖，使发热等初发症状再度出现
- C. 传染病患者在恢复期，体温未稳定下降至正常，又再度升高
- D. 人体同时感染两种或两种以上的病原体
- E. 传染病痊愈以后再次发病

203. 传染病与感染性疾病的主要区别是

- A. 有无病原体
- B. 有无感染后免疫
- C. 有无发热
- D. 有无传染性
- E. 有无皮疹

204. 病原体侵入人体后，局限在机体的某些部位，但机体免疫功能不足以将病原体清除，一旦机体免疫功能低下可发病。此种表现属于

- A. 病原携带状态
- B. 潜伏性感染
- C. 隐性感染
- D. 显性感染
- E. 机会性感染

205. 在感染过程中，最常见的表现形式是

- A. 病原体被消灭或排出体外
- B. 隐性感染
- C. 显性感染
- D. 病原携带状态
- E. 潜伏性感染

206. 传染病流行过程的基本条件是

- A. 散发、流行、暴发
- B. 病原体、人体、外环境
- C. 自然因素、社会因素
- D. 传染源、传播途径、易感人群
- E. 患者、病原携带者、受感染的动物

207. 确定传染病检疫期的依据是

- A. 隔离期
- B. 传染期
- C. 最长潜伏期
- D. 最短潜伏期
- E. 平均潜伏期

208. 下列传染病常见出疹时间，错误的是

- A. 水痘多在第 1 病日
- B. 猩红热多在第 2 病日
- C. 天花多在第 3 病日
- D. 麻疹多在第 4 病日
- E. 伤寒多在第 5 病日

209. 下列传染病，外周血白细胞正常或减少的是

- A. 流行性出血热
- B. 狂犬病
- C. 流行性脑脊髓膜炎
- D. 流行性乙型脑炎
- E. 伤寒

210. 下列各项，不属传染源的是

- A. 患者
- B. 病原携带者
- C. 隐性感染者
- D. 易感者
- E. 受感染的动物

211. 下列传染病，根据传染病防治法要求，不按甲类传染病管理的是

- A. AIDS
- B. SARS
- C. 肺炭疽
- D. 鼠疫
- E. 霍乱

212. 下列各项，与病原体致病作用无关的是

- A. 侵袭力
- B. 毒力
- C. 数量
- D. 大小
- E. 变异性

213. 下列感染中，没有传染性的是

- A. 隐性感染
- B. 显性感染的潜伏期
- C. 显性感染的症状明显期
- D. 病原携带状态
- E. 潜伏性感染

214. 传染病流行过程的三环节是

- A. 传染源、传播途径、易感人群
- B. 病原体、传播途径、易感人群
- C. 病原体、社会因素、环境因素
- D. 人体、病原体、外环境
- E. 人体、病原体、社会因素

215. 确定传染病隔离期的主要依据是

- A. 最短潜伏期
- B. 平均潜伏期
- C. 最长潜伏期
- D. 前驱期
- E. 传染期

216. 患者肺功能显示  $50\% > FEV_1 \geq 30\%$ ，COPD 严重程度分级是

- A. 不能分级
- B. I 级
- C. II 级
- D. III 级
- E. IV 级

217. COPD 典型的症状是

- A. 慢性咳嗽
- B. 咳痰
- C. 气短及呼吸困难
- D. 喘息和胸闷
- E. 食欲减退

218. COPD 急性加重期的重要治疗措施是

- A. 止咳、祛痰
- B. 解痉、平喘
- C. 控制感染
- D. 避免及减少各种诱因
- E. 抗过敏

219. 下列各项，有助于判断气流阻塞严重程度的是

- A. 病史
- B. 肺气肿体征
- C. X 线检查
- D. 肺功能检查
- E. 血气分析

220. 可以改善 COPD 患者生存率的治疗措施是

- A. 及时应用抗菌药物
- B. 支气管扩张药
- C. 长期家庭氧疗
- D. 康复治疗
- E. 肺减容手术

221. COPD 患者长期家庭氧疗的氧流量是

- A.  $0.5 \sim 1L/min$
- B.  $1 \sim 2L/min$

- C. 1.5~2.5L/min
- D. 2~3L/min
- E. 3.5~4.5L/min

222. COPD 急性加重期控制性氧疗应达到的满意的氧合水平是

- A.  $\text{PaO}_2 > 45\text{mmHg}$ ,  $\text{SaO}_2 > 75\%$
- B.  $\text{PaO}_2 > 50\text{mmHg}$ ,  $\text{SaO}_2 > 80\%$
- C.  $\text{PaO}_2 > 55\text{mmHg}$ ,  $\text{SaO}_2 > 85\%$
- D.  $\text{PaO}_2 > 60\text{mmHg}$ ,  $\text{SaO}_2 > 90\%$
- E.  $\text{PaO}_2 > 65\text{mmHg}$ ,  $\text{SaO}_2 > 95\%$

223. 慢性肺心病肺动脉高压形成的最主要机制是

- A. 血液黏滞度增加
- B. 急性缺氧反复发作
- C. 长期慢性缺氧
- D. 血流阻力增加
- E. 肺血管慢性炎症

224. 慢性肺心病最多见的并发症是

- A. 肺性脑病
- B. 心律失常
- C. 酸碱失衡
- D. 消化道出血
- E. 肾衰竭

225. 属慢性肺心病肺动脉高压 X 线检查表现的是

- A. 双肺纹理增多
- B. 右心室肥厚
- C. 右下肺动脉干扩张
- D. 双肺透亮度增高
- E. 右心房肥大

226. 治疗慢性肺心病心衰合并房性早搏应选用的药物是

- A. 利多卡因
- B. 美托洛尔
- C. 地高辛
- D. 阿托品
- E. 胺碘酮

227. 治疗慢性肺心病右心衰竭选用洋地黄制剂的原则是

- A. 速效类、常规剂量
- B. 速效类、常规剂量的 1/2~2/3
- C. 缓效类、小剂量
- D. 缓效类、常规剂量

E. 缓效类、常规剂量的 1/2~2/3

228. 提示 COPD 患者出现肺动脉高压的体征是

- A.  $P_2$  亢进
- B. 剑突下心脏搏动增强
- C. 颈静脉充盈
- D. 三尖瓣区收缩期杂音
- E. 三尖瓣区舒张期奔马律

229. 慢性肺心病急性加重期并发肺性脑病时应慎用的药物是

- A. 镇静剂
- B. 祛痰剂
- C. 解痉平喘药
- D. 呼吸兴奋剂
- E. 抗生素

230. 慢性肺心病早期诊断的主要依据是

- A. 肺气肿征象
- B. 肺动脉高压征象
- C. 右心衰竭体征
- D. 反复咳嗽、咳痰病史
- E. 心悸、气促症状

231. 慢性肺心病急性加重期，应用利尿剂不当常诱发的是

- A. 代谢性酸中毒
- B. 代谢性碱中毒
- C. 低血压
- D. 房性早搏
- E. 消化道出血

232. 社区获得性肺炎的主要致病菌是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 克雷白杆菌
- D. 肺炎链球菌
- E. 链球菌

233. 对放射治疗最敏感的肺癌组织学类型是

- A. 鳞状上皮癌
- B. 类癌
- C. 腺癌
- D. 小细胞肺癌
- E. 大细胞肺癌

234. 慢性左心衰竭患者的体征中，最不具有诊断价值的是

- A. 心音低钝
- B. 肺动脉瓣区第二心音亢进
- C. 心率减慢
- D. 心脏扩大
- E. 舒张期奔马律

235. 一度房室传导阻滞听诊心音时的表现是

- A. 第一心音增强
- B. 第一心音减弱
- C. 第二心音增强
- D. 第二心音减弱
- E. 闻及第三心音

236. 十二指肠溃疡的好发部位是

- A. 球部
- B. 乳头的近段降部
- C. 乳头的远段降部
- D. 十二指肠水平段
- E. 十二指肠升段

237. 不属类风湿关节炎临床特点的是

- A. 女性多见
- B. 起病隐匿
- C. 好发于 60 岁以上老年人
- D. 早期小关节受累
- E. 可致关节畸形与功能障碍

238. 王某，男，45 岁。发热 1 天，微恶风，汗少，肢体酸重，头昏重胀痛，咳嗽痰黏，鼻涕浊涕，心烦口渴，渴不多饮，胸闷脘痞，泛恶，腹胀便溏，舌苔薄黄而腻，脉濡数。其治疗应首选的方剂是

- A. 银翘散
- B. 加减葳蕤汤
- C. 荆防达表汤
- D. 新加香薷饮
- E. 参苏饮

239. 患者，男，56 岁。发热 1 天，微恶风寒，少汗，头昏，心烦，口干咽燥，干咳少痰，舌红少苔，脉细数。其证候诊断是

- A. 常人感冒风寒束表证
- B. 常人感冒暑湿伤表证
- C. 常人感冒风热犯表证
- D. 虚体感冒气虚感冒证
- E. 虚体感冒阴虚感冒证



240. 下列各项，不属咳嗽病因的是

- A. 外感六淫
- B. 痰湿痰热
- C. 肝郁化火
- D. 禀赋不足
- E. 肺阴亏虚

241. 咳嗽的基本病机是

- A. 风寒袭肺，肺气失宣
- B. 风热犯肺，肺失清肃
- C. 痰热壅肺，肺失肃降
- D. 肝郁化火，上逆侮肺
- E. 邪犯于肺，肺气上逆

242. 咳嗽，咯吐粉红色泡沫痰，咳而气喘，呼吸困难者，多属

- A. 肺阴不足
- B. 肺脾气虚
- C. 肺肾气虚
- D. 脾肾阳虚
- E. 心肺阳虚

243. 治疗咳嗽之肺阴亏耗证，应首选的方剂是

- A. 桑菊饮
- B. 生脉散合补肺汤
- C. 桑杏汤
- D. 生脉地黄汤
- E. 沙参麦冬汤

244. 患者，女，63岁。咳嗽反复发作半年，咳声重浊，痰多色白，痰出咳平，每于早晨咳甚痰多，胸闷脘痞，呕恶食少，舌苔白腻，脉濡滑。其证候诊断是

- A. 肝火犯肺证
- B. 痰湿蕴肺证
- C. 痰热郁肺证
- D. 肺阴亏耗证
- E. 风热犯肺证

245. 哮病发作时的基本病理变化是

- A. 肺失宣降
- B. 痰阻气闭
- C. 伏痰引触
- D. 肺气不清
- E. 肺气虚寒

246. 治疗哮喘发作期冷哮证，应首选的方剂是

- A. 定喘汤或越婢加半夏汤
- B. 小青龙加石膏汤
- C. 三子养亲汤
- D. 射干麻黄汤或小青龙汤
- E. 平喘固本汤

247. 治疗哮喘发作期风痰哮证，应首选的方剂是

- A. 定喘汤或越婢加半夏汤
- B. 厚朴麻黄汤
- C. 三子养亲汤
- D. 射干麻黄汤
- E. 平喘固本汤

248. 治疗哮喘缓解期肺肾两虚证，应首选的方剂是

- A. 平喘固本汤
- B. 六君子汤
- C. 定喘汤
- D. 三子养亲汤
- E. 生脉地黄汤合金水六君煎

249. 下列各项，对于鉴别哮喘与喘证无意义的是

- A. 是否幼年起病
- B. 是否反复发作
- C. 是否喉中哮鸣
- D. 气喘是否突发突止
- E. 是否伴有发热

250. 治疗实喘风寒壅肺证，首选的方剂是

- A. 麻杏石甘汤
- B. 荆防达表汤
- C. 麻黄汤合华盖散
- D. 桑白皮汤
- E. 麻黄连翘赤小豆汤

251. 患者，男，28岁。2天来，喘逆上气，息粗鼻扇，咳而不爽，痰吐稠黏，形寒身热，身痛无汗，口渴，苔薄黄，舌质红，脉浮数。治疗应首选的方剂是

- A. 麻黄汤
- B. 小青龙汤
- C. 麻杏石甘汤
- D. 桑白皮汤
- E. 三子养亲汤

252. 肺痈的特征性临床表现中，错误的是

- A. 咳嗽
- B. 胸痛
- C. 发热
- D. 咳吐腥臭脓痰
- E. 咯铁锈色痰

253. 肺痈成痈期的病机是

- A. 风热外袭，卫表不和，邪热壅肺，肺失清肃
- B. 邪毒渐去，肺体损伤，阴伤气耗
- C. 热毒蕴肺，蒸液成痰，热壅血瘀，蕴酿成痈
- D. 热壅血瘀，血败肉腐，痈肿内溃，脓液外泄
- E. 邪热蕴肺，蒸液成痰，痰热壅滞，肺失清肃

254. 肺痈患者的脓血痰吐入水中，结果是

- A. 痈脓浮在水上
- B. 痈脓悬浮在水中
- C. 痈脓沉入水底
- D. 痈脓溶解在水中
- E. 痰分成三层

255. 肺痈病情转归的关键期是

- A. 成痈期
- B. 初期
- C. 迁延期
- D. 恢复期
- E. 溃脓期

256. 治疗肺痈恢复期，首选的方剂是

- A. 银翘散
- B. 千金苇茎汤
- C. 加味桔梗汤
- D. 桔梗杏仁煎
- E. 如金解毒散

257. 关于肺痈溃脓期病情顺证与逆证的论述中，属于顺证表现的是

- A. 音嘎无力，脓血如败卤，腥臭异常
- B. 脓血稀而渐少，腥臭味转淡，热退
- C. 气喘，鼻扇，胸痛，坐卧不安
- D. 饮食少进，身热不退，颧红
- E. 爪甲青紫，脉短涩或弦急

258. 王某，男，25岁。咳吐大量脓痰，痰血相兼，腥臭异常，胸中烦满而痛，身热面赤，烦渴喜饮，舌苔黄腻，舌质红，脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A. 银翘散

- B. 《千金》苇茎汤
- C. 加味桔梗汤
- D. 桔梗杏仁煎
- E. 如金解毒散

259. 下列选项中，属于心悸病因的是

- A. 跌仆损伤
- B. 感受外邪
- C. 疫毒侵袭
- D. 先天遗传
- E. 久病入络

260. 胸痹的辨证，应首辨的要点是

- A. 标本虚实
- B. 病情轻重
- C. 寒热虚实
- D. 脉象变化
- E. 外感内伤

261. 下列各项，属于胁痛病因的是

- A. 体虚年老
- B. 外感湿热
- C. 虫毒感染
- D. 外感燥热
- E. 外感风湿

262. 胁痛病的病理因素是

- A. 气滞
- B. 痰饮
- C. 水湿
- D. 热毒
- E. 风热

263. 下列各项，不属于黄疸病因的是

- A. 外感疫毒
- B. 内伤饮食
- C. 外感湿热
- D. 病后续发
- E. 情志内伤

264. 治疗黄疸疫毒炽盛证，首选的方剂是

- A. 茵陈蒿汤
- B. 甘露消毒丹
- C. 《千金》犀角散

- D. 龙胆泻肝汤
- E. 大柴胡汤

265. 水肿风水相搏证，其病位在

- A. 心
- B. 肺
- C. 肝
- D. 脾
- E. 肾

266. 痹证日久病邪可累及脏腑，最常见的脏腑痹是

- A. 肺痹
- B. 心痹
- C. 肝痹
- D. 肾痹
- E. 脾痹

267. 益气托毒法的常用方剂是

- A. 透脓散
- B. 仙方活命饮
- C. 黄连解毒汤
- D. 托里消毒散
- E. 神功内托散

268. 温阳托毒法的代表方剂是

- A. 右归丸
- B. 托里消毒散
- C. 金匱肾气丸
- D. 神功内托散
- E. 四君子汤

269. 太乙膏的功效是

- A. 清热消肿，散瘀化痰
- B. 活血祛腐，解毒止痛
- C. 消肿止痛，提脓祛腐
- D. 消肿清火，解毒生肌
- E. 温经和阳，祛风散寒

270. 具有腐蚀性的膏药是

- A. 千捶膏
- B. 太乙膏
- C. 咬头膏
- D. 阳和解凝膏
- E. 红油膏

271. 下列各项中属于提脓祛腐药的是

- A. 九一丹
- B. 红灵丹
- C. 八宝丹
- D. 白降丹
- E. 金黄散

272. 性偏寒凉，能消肿、解毒、提脓、祛腐、止痛的药物是

- A. 咬头膏
- B. 金黄膏
- C. 千捶膏
- D. 冲和膏
- E. 玉露膏

273. 对升丹过敏者，提脓祛腐时宜选用的外用药是

- A. 红灵丹
- B. 八宝丹
- C. 平脐丹
- D. 黑虎丹
- E. 九一丹

274. 常用挂线法来治疗的疾病是

- A. 内痔
- B. 脱肛
- C. 瘰疬
- D. 肛漏
- E. 脱疽

275. 红丝疔砭镰法的操作要点是

- A. 沿红线两头，针刺出血
- B. 梅花针沿红线打刺，微微出血
- C. 用三棱针从中挑断红线，微令出血
- D. 梅花针沿红线打刺，并加神灯照法
- E. 用三棱针沿红线寸寸挑断，令微出血

276. 由于疮、疔引起的流注一般称

- A. 暑湿流注
- B. 髌窝流注
- C. 余毒流注
- D. 瘀血流注
- E. 湿痰流注

277. 乳痈热毒炽盛证最常用的方剂是

- A. 瓜蒌牛蒡汤加减
- B. 牛蒡解肌汤加减
- C. 透脓散加减
- D. 橘叶散加减
- E. 开郁散加减

278. 患者女性，45岁。结喉正中偏右有一半圆形包块，边界清楚，表面光滑，皮色如常，可随吞咽上下移动，其诊断是

- A. 气瘰
- B. 肉瘰
- C. 筋瘰
- D. 血瘰
- E. 石瘰

279. 关于圆癣的描述，哪项不正确

- A. 好发于长夏高温、潮湿季节
- B. 好发于面部、躯干及四肢近端
- C. 皮损为环形，边界清楚，中心消退
- D. 边缘处可见水疱、鳞屑、结痂
- E. 愈后常留有疤痕

280. 妇女终生不潮而能受孕者，称为

- A. 激经
- B. 暗经
- C. 季经
- D. 避年
- E. 居经

281. 对继发性痛经的患者，应注意询问的是

- A. 有无家族遗传史
- B. 有无盆腔炎史
- C. 居住环境
- D. 饮食嗜好
- E. 有无结核病史

282. 下列各项，不属于补益肾气法方剂的是

- A. 寿胎丸
- B. 济生肾气丸
- C. 归肾丸
- D. 肾气丸
- E. 补肾固冲丸

283. 下列各项，不属于月经病常见病因的是

- A. 寒热湿邪

- B. 跌仆损伤
- C. 内伤七情
- D. 房劳多产
- E. 饮食不节

284. 月经先期阴虚血热证的经血特点是

- A. 色淡红，质清稀
- B. 色深红，质稠
- C. 色淡暗，质清稀
- D. 色红，质黏稠
- E. 色深红，有血块

285. 治疗月经后期肾虚证，应首选的方剂是

- A. 大补元煎
- B. 当归地黄饮
- C. 补中益气汤
- D. 艾附暖宫丸
- E. 人参养荣汤

286. 患者月经周期延后，量少，色淡红，质清稀，小腹隐痛，喜暖喜按；腰酸无力，小便清长，大便稀溏；舌淡，苔白，脉沉迟或细弱。治疗应首选的方剂是

- A. 温经汤（《妇人大全良方》）
- B. 乌药汤
- C. 肾气丸
- D. 艾附暖宫丸
- E. 大补元煎

287. 月经先后无定期肝郁肾虚证的经血特点是

- A. 色红，质黏稠
- B. 色淡，质黏
- C. 色淡暗，质清稀
- D. 色淡暗，有血块
- E. 色红，有血块

288. 患者月经先后无定期，量少，色淡暗，质清；腰脊酸痛，头晕耳鸣，舌淡，苔白，脉细弱。治疗应首选的方剂是

- A. 肾气丸
- B. 六味地黄
- C. 大补元煎
- D. 固阴煎
- E. 归肾丸

289. 崩漏的常见病因是

- A. 脾虚、肾虚、肝郁、血热



- B. 湿热、肾虚、血热、血瘀
- C. 脾虚、肾虚、血热、血瘀
- D. 脾虚、肾虚、血热、气滞
- E. 气虚、肾虚、瘀热、血虚

290. 治疗闭经气滞血瘀证，应首选的方剂是

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 桃红四物汤
- C. 乌药汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 柴胡疏肝散

291. 胎儿期体重增长快的阶段是

- A. 妊娠早期 4 周
- B. 妊娠早期 12 周
- C. 妊娠中期 10 周
- D. 妊娠中期 15 周
- E. 妊娠晚期 13 周

292. 按公式计算，5 个月婴儿正常体重是

- A. 5kg
- B. 6.5kg
- C. 6.8kg
- D. 7kg
- E. 7.2kg

293. 按公式计算，5 岁小儿正常身高是

- A. 85cm
- B. 90cm
- C. 95cm
- D. 100cm
- E. 110cm

294. 患儿，12 个月。体重 8.5kg，身高 65cm，前囟闭合，乳牙 7 个，不会摆放积木。其中正常的是

- A. 体重
- B. 身高
- C. 前囟
- D. 乳牙萌出
- E. 精细运动

295. 热退疹出，疹细稠密如玫瑰红色者是

- A. 麻疹
- B. 风痧

- C. 奶麻
- D. 丹痧
- E. 瘾疹

296. 下列属于生理性黄疸的是

- A. 产后 24h 以内出现黄疸
- B. 黄疸持续时间足月儿 > 2 周
- C. 早产儿可延迟至 3~4 周消退
- D. 足月儿血清总胆红素 > 221 $\mu\text{mol/L}$ , 早产儿 > 257 $\mu\text{mol/L}$
- E. 血清总胆红素每日上升幅度 > 85.5 $\mu\text{mol/L}$  或每小时上升幅度 > 8.5 $\mu\text{mol/L}$

297. 患儿, 6 岁。喉核赤肿, 咽喉疼痛, 吞咽不利, 发热重, 鼻塞流涕, 头痛身痛, 舌红, 苔薄黄, 脉浮数。应首选的方剂是

- A. 银翘马勃散
- B. 牛蒡甘桔汤
- C. 养阴清肺汤
- D. 普济消毒饮
- E. 荆防败毒散

298. 麻疹好发的年龄是

- A. 1 个月
- B. 1~5 个月
- C. 6 个月~5 岁
- D. 6~7 岁
- E. 10~12 岁

299. 患儿, 3 岁。高热不退, 面色青灰, 烦躁不安, 咳嗽气促, 鼻翼扇动, 喉间痰鸣, 唇周发绀, 皮疹稠密, 疹色紫暗, 大便秘结, 小便短赤, 舌红苔黄, 脉数有力。治疗应首选的方剂是

- A. 定喘汤
- B. 二陈汤
- C. 大青龙汤
- D. 麻杏石甘汤
- E. 葶苈大枣泻肺汤

300. 患儿, 5 岁。壮热不退, 烦躁不安, 口渴欲饮, 面红目赤, 皮疹稠密, 疹色紫暗, 疱浆混浊, 可见出血性皮疹、紫癜, 大便干结, 小便短赤, 舌质红绛, 苔黄糙而干, 脉数有力。治疗应首选的方剂是

- A. 银翘散
- B. 白虎汤
- C. 清营汤
- D. 玉女煎
- E. 清胃解毒汤



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

医学培训知名品牌  
致力于建立完整的医学服务产业链



金鹰直播课



王牌直播课



王牌联盟班



上课提醒

医学优选,金英杰教育

全国免费咨询热线: 400-900-9392 客服及投诉电话: 400-606-1615

地址: 北京市海淀区学清路甲38号金码大厦B座22层