

- 1.一般来说,一个基本的统计表其标题、标目和线条的数量为(A)
  - A.1、2、3
  - B.2、1、3
- 2.胰腺炎的诊断
- 3.直疝/斜疝/股疝鉴别
- 4.腹膜炎
- 5.尖锐湿疣
- 6.上消化道溃疡穿孔表现
- 7.男,60岁,反酸烧心伴胸骨后疼痛3个月,疼痛为灼烧样痛,向背部放射,胃镜示食管下段多发纵行粘膜破损,相互融合,该患者不宜使用的药物为(D)
  - A.奥美拉唑
  - B.铝碳酸镁
  - C.雷尼替丁
  - D.山莨菪碱
  - E.多潘立酮
- 8.二期梅毒,淋巴结部位
- 9.食管癌,淋巴结部位
- 10.每次开处方,每张处方所包含的药品种类上限为(A):
  - A.5种
  - B.3种
  - C.6种
  - D.4种
  - E.7种
- 11.门静脉高压症主要临床表现是(D)
  - A.男性乳房发育
  - B.肝掌
  - C.肝病面容
  - D.腹水
  - E.蜘蛛痣
- 12.疟疾:预防复发伯氨喹,预防发病乙胺嘧啶
- 13.阴道口有菜花样赘生物(尖锐湿疣,人乳头瘤病毒 HPV)
- 14.双侧卵巢转移性浆液腺癌,问原发部位是哪(胃肠道)
- 15.提出的“救死扶伤,实行革命的人道主义”(C)
  - A.邓小平
  - B.刘少奇
  - C.毛泽东
  - D.朱德

- E.周恩来
- 16.挤压伤，高钾
- 17.高温作业，高渗性脱水
- 18.胎盘早剥，前置胎盘
- 19.中医：奇脉、滑脉，脾统血，相克治疗
- 20.推算预产期
- 21.烧伤，判断轻中重度
- 22.肺炎链球菌用药
23. 长期服用导致毒性反应 (A)
- A.维生素 A
- B.维生素 C
- C.维生素 B1
- D.维生素 B2
- E.叶酸
- 24.诊断重症胰腺炎最有价值的体征是 (D)
- A.Murhuy 征
- B.腹膜刺激征
- C.Courvoisier
- D.Grey-Turner 征
- E.tine 征
- 25.诊断消化性溃疡穿孔最有意义的体征是(B)
- A.Murhuy 征
- B.腹膜刺激征
- C.Courvoisier
- D.Grey-Turner 征
- E.tine 征
- 26.左腹股沟区半球形包块，平卧时包块消失，站立时包块出现，轻压痛，质地软，压迫内环口、咳嗽时仍有肿块突出，最可能的诊断是(B)
- A.腹股沟斜疝
- B.腹股沟直疝
- C.交通性鞘膜积液
- D.睾丸鞘膜积液
- E.股疝
- 27.右腹股沟韧带下方半球形突起，轻度压痛回纳后肿块不能完全消失。最可能的诊断是(E)
- A.腹股沟斜
- B.腹股沟直
- C.交通性膜积液

D.睾丸鞘膜积

E.股疝

28.某社区为了解结核流行病学情况，调查人数 40 万人，患病人数 80 人，下列哪项正确? (D)

A.患病率 20/10 万人

B.罹患率 20/10 万人

C.发病率 20/10 万人

D.感染率 20/10 万人

E.待补充

29: 男性，22 岁，腹部内脏损伤，右侧腹膜后血性肿胀，右肾挫裂伤，活动性出血，为治疗当前症状，首选治疗 (E)

A.纱布止血出血处

B.切开引流血肿

C.右肾部分切除术

D.右肾切除术

E.右肾修补术

30:患者进行 HRZE 抗结核治疗后发生视物模糊视力下降，下一步治疗宜 (A)

A.停用乙胺丁醇

B.停用异烟肼

C.停用利福平

D.停用链霉素

E.加用维生素 A

31.女，25 岁，转移性右下腹痛 10 小时，伴恶心、呕吐，呕吐物为胃内容物，查体:T38.6° C，p105 次 1 分，R20 次 1 分，Bp 110/162mmhg，神志清，皮肤黏膜无黄染。右下腹压痛、反跳痛，肌紧张。患者可能的诊断 (D)

A.急性肠梗阻

B.急性胰腺炎

C.急性胆囊炎

D.急性阑尾炎

E.十二指肠溃疡

32.女，25 岁，转移性右下腹痛 10 小时，伴恶心、呕吐，呕吐物为胃内容物，查体:T38.6° C，p105 次 1 分，R20 次 1 分，Bp 110/162mmhg，神志清，皮肤黏膜无黄染。右下腹压痛、反跳痛，肌紧张。患者最主要的治疗是(D)

A.补液治疗

B.抗生素

C.生长抑素

D.手术治疗

E.胃肠减压

33.男, 72 岁, 支气管哮喘病史 40 年, 近 5 年反复发作伴双下肢水肿, 间断使用利尿剂, 近 1 周喘息加重, 咳黄痰, 嗜睡, 根据患者目前情况首选的检查是 (E)

- A.超声心动图
- B.头颅 CT
- C.双下肢血管超声
- D.肺功能
- E.血气分析

34:男 62 岁, 上腹部隐痛 5 年, 进食后或情绪不佳时明显, 查体, 腹软上腹部轻压痛, 胃镜可见胃黏膜粗糙, 可见黏膜下血管网。该患者最可能的诊断是 (E)

- A.急性糜烂性胃炎
- B.消化性溃疡
- C.胃癌
- D.慢性萎缩性胃炎
- E.慢性非萎缩性胃炎

35: 女, 52 岁, 绝经 1 年半, 面色潮红, 烦躁, 失眠 1 年, 问血脂变化 (C)

- A.低密度脂蛋白高, 高密度脂蛋白低
- B.低密度脂蛋白高, 高密度脂蛋白高
- C.低密度脂蛋白低, 高密度脂蛋白低
- D.低密度脂蛋白低, 高密度脂蛋白高
- E.极低密度脂蛋白低, 高密度脂蛋白高

36.女性 65 岁, 乙肝肝硬化 4 年, 双下肢水肿三天, 尿量 500 毫升每天, 查体, 巩膜轻度黄染, 肝肋下未触及, 脾肋下四厘米, 移动性浊音阳性, 该患者首选的治疗(C)

- A.静滴抗生素
- B.应用保肝药物
- C.腹腔穿刺抽腹水
- D.密切观察
- E.手术

37. 患者女, 45 岁。多尿, 消瘦 1 月余, 空腹血糖 8.2mmol/L, 餐后 2 小时血糖 12mmol/L, 血胰岛素 15(正常 5-15), 控制饮食后血糖不佳, 首先哪种药物治疗(C)

- A.胰岛素
- B.西格列汀
- C.二甲双胍
- D.格列美
- E.阿卡波糖

38.男, 60 岁, 突发心前区压样疼痛, 急诊心电图病理性 Q 波, 广泛性 st 段抬高, 其心肌病理改变最可能是(A)

- A.凝固性坏死
- B.干酪样坏死
- C.坏疽
- D.液化性坏死

E.脂肪坏死

39.强制性思维/强迫思维

40.子宫阔韧带，防止子宫左右偏移，有子宫动静脉穿过  
骨盆漏斗韧带，将卵巢固定在骨盆上，卵巢动静脉从中通过

41.支原体感染治疗，大环内酯类（红霉素、阿奇霉素）

42.肺炎链球菌经验性用药支原体肺炎经验性用药

43.主动脉关闭不全，出现的杂音称 Austin-Flint 杂音

44.心衰 Killip 分级，II 级：肺啰音出现范围小于两肺野的 50%

45.急性左心衰竭，高度呼吸困难，烦躁不安时立即给予（C）

A.吸氧

B.安定肌肉注射

C.吗啡皮下注射

D.氨茶碱静脉注射

E.坐位，两腿下垂以减少静脉回流

金英杰医学教育